





12
11
2
27

~~XXIX 034~~

IX. A

K. XI. 15

D. MATTHÆI

CURTII PA-

PIENSIS ME-

DICORVM SVA

TEMPESTATE

FACILE PRIN-

CIPIS.



In Mundini Anatomien explicatio.

Nunc primum in lucem edita.

UNVM NIHIL, DVOS



PLVRIMVM POSSE.


EXCVDEBATVR

PAPIAE.

M. D. L.



Blasij Suchsij.



1870
MAY 10
O. W. L. B. M.
T. B. L. B. M.
T. B. L. B. M.

IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
JAMES M. L. B. M.

THE COURT OF PROBATE
FOR THE COUNTY OF
MIDDLESEX

IN TESTAMENTARY PROOF
OF THE WILL OF
JAMES M. L. B. M.



REVERENDISS. D.
D. IOANNI ANGELO
ARCIMBOLDO MEDIO-
LANENS. ECCL. AR-
CHIEPISCOPO, AC
CÆS. SENATORI
DIGNISS.

CAMILLVS BONVS
BRIXIANVS. S. D.



Reclarè mihi fecisse videtur ueteres, qui rerum inuentoribus, si non quas potuerunt, quas licuit tamen gratias reddidere. Cum maximis enim aucti essent beneficijs, quoniam dignitates, opulentias, cæteraque huiusmodi eorum meritis longe inferiora esse credebāt, in Deorum illos numerum referentes ostenderunt, quàm foret egregium, ac maximè laudabile, ita se comparare, ut in hominum genus quantam quisq; maximam possit, utilitatem conferat. Quæ res illorum animos adeo accendit, ut tanto proposito

præmio nihil nõ tentandum, uel intæ ipse
us dispendio, esse ducerent. Hinc factum
crediderim, ut tot deos coleret antiqui-
tas, atque ijs etiã plures, quot M. Var-
ro recenset. Sed quoniam præclarè no-
biscum actum est, ut unum tantum Deum
agnosceremus, eumque unum uenerare-
mur, præterea neminem, euertere statim o-
portuit ueterum Deorum cœlum, non qui-
dem à Gigantibus, sed pietate ipsa uictum.
Verum enim uero non ea de causa uir-
tutis etiam præmia cessare æquum fuerat.
Vbi enim uirtute præditi homines negli-
guntur, negligi ipsam quoque uirtutem ne-
cesse est. Quæ res quantum hominum ui-
tæ detrimētum afferat, multa, & noua, &
antiqua extant exempla, cum ex priuatis,
tum ex publicis rebus. Neque uerò dicen-
dum est ingenia hominũ in peius ruere, ac
deteriora in dies fieri, multa enim semper
extitere, atq; adeo etiam uigēt præclara

ingenia. Sed plurimos illud maximè de-
terrebat, quòd uiderèt aut uiuis nullū ha-
beri honorē, aut cū uita omnē illorū glo-
riam interire. Nam (ut omittā cæteros)
quē unquā tanti facere debuit, aut potuit
ætas nostrā, quā *Matthæum Curtiū*
acerrimi ingenij, ac iudicij uirum? cui uel
hoc solo nomine semper debebunt studiosi,
quòd magni *Galenī* doctrinam in re mē-
dica primus reuocauerit. Is tamen cum
eiusmodi scripta reliquerit, quibus (ne ma-
ius quid dicam) cū summa laude inter ho-
mines uersari posset, nescio quo malo fato
medijs obruitur tenebris. Enimuerò non
Curtius modò, & studiosi omnes maxima
afficiuntur iniuria, sed uniuersa res lite-
raria maximum capit detrimētum, si quæ
uir ille peperit nescio qua ratione suppri-
mantur. Nam, si ullus harum rerum de-
functis inest sensus, uehementer commoue-
ri & perturbari *Curtium* credendū est.

Quid uerò sperandū optimis uiris restat,
cum eam Curtio gloriam, quam sibi ipse
maximis laboribus, summis uigilijs compa-
rauerat, inuideri uideant? Atqui quid
hoc quæso aliud est, quàm optimum quen-
que à studijs literarum auertere? Quam
rem cum sepe numero mecum cogitas-
sem, in diēsque mihi grauior uideretur,
decreui huic malo, siquid ego quoque pos-
sem, remedium aliquod afferre. Itaque
ex eius uiri scriptis eam primitim partem
aggredi placuit, quæ in corporis huma-
ni dissectione uersatur: tum quòd ita rei
ordo postulare uideretur, tum quòd ea
pars minus foret elaborata, ac propterea
multum laboris, ac negotij studiosis affer-
re uideretur. neque .n. eam scripsit Cur-
tius ut ederetur: sed ex ipsius docentis uo-
ce ab optimis quibusq; & studiosis adole-
scentibus descriptam habemus. Quò ma-
gis mirari decet uiri illius insignem eru-

ditionem, ex eaque re coniecturam facere.
qualia nam sint, quæ ipse in Hippocra-
tis aphorismos, & Galeni τείχη eo consi-
lio conscripsit ut ederentur: quæ omnia
in studiosorum gratiam breui foras dabū-
tur, nactus enim sum Typographum cum
non minimi animi, tum maximo usum stu-
dio, & industria. Quid uero hac in re fe-
cerim, mihi non est usum hoc loco refer-
re, si cui autem id curæ fuerit, licebit hunc
impressum codicem cum manuscriptis con-
ferat. nullam enim sententiam demptam,
aut de nostro additā (ni fallor) reperiet.
Quòd si quis fortè non probabit, facili-
mūque esse existimet, quòd ipsius senten-
tias nostro more meliori dicendiratione
referre placuerit, quòd loca, quæ ex au-
ctoribus passim non rectè citabantur, ad
eum ordinem reduxerimus, ut perfacile
cuique sit, ea ex proprijs libris petere:
ignoscat quæso, atq; ipse quàm maximè

poteſt melioribus rē literariam augeat,
ac me fautore utatur. Hoc enim maximē
nobis propoſitum habuimus, ut omnem no-
ſtram operam, ſtudium, ac diligentiam in
communem utilitatem conferamus. Hoc
autem noſtro labore ita uelim fru-
antur ſtudioſi, ut ſi quid ex eo commodi per-
cepturi ſint, id tibi omne acceptum refe-
rant. Nam cum, ob tua ſingularia in hęc
Academiā florentiſſimā merita, ob
egregias animi uirtutes, ob inſignem quā-
dam humanitatem, qua eos omnes proſe-
queris, qui ſe literarum ſtudijs dediderūt,
te colere inſtituiſſem, optabam aliquod
ueluti pignus animi erga te mei conſtare.
Itaque ea de cauſa hanc opellam ſub tui
nominis auſpicijs emitto. Quam ſi nō om-
nino ingrata tibi, ac ſtudioſis eſſe ſenſero,
ad meliora, maiorāque accingar. Vale.

Ticini. XII. Calen. Septemb.

M. D. L.

INDEX EORVM, QVÆ IN HIS
CVRTII COMMENTARIIS NOTATV
DIGNA CONTINENTVR.

Abſceſſus quō fiat. <u>67.</u>	anatomia quo pacto cō modè fieri poſſit. <u>19.</u>
accidētia quæ operatio nem ſequuntur. <u>33.</u>	anatomia viuorū quō à Gal. fieret. <u>32.</u>
accidentia partes dici nō poſſunt. <u>15.</u>	anatomie initiū vnde ſu mendum. <u>37.</u>
accidētū inſeparabiliū cōſiderādē cauſe. <u>14.</u>	anatomie muſculorum vtilitas. <u>8.</u>
accidentiū, quæ neceſſa riō cōſequuntur, cauſas reddit Philoſophus, & medicus. <u>14.</u>	anatomia muſculorū vē tris difficilis. <u>37.</u>
adeps, & pinguedo. <u>48.</u>	anatomicorū error. <u>338.</u>
adiutorium os quod di catur. <u>373.</u>	angina. <u>307.</u>
ægritudo, & ſanitas in duplici nã cōſiſtūt. <u>32.</u>	ἀνδρομος. <u>28.</u>
æris in corpore elabo ratio. <u>262.</u>	ani anatomia. <u>204.</u>
alauis, & aloſos <u>offa. 366</u>	animalia homini ſimi lia. <u>8.</u>
Albertus rephēſus. <u>154.</u>	animalia ſerpentia. <u>21.</u>
Albugineus humor. <u>356.</u>	aorta, & arteria idem ſi gnificant. <u>259.</u>
alcharas. <u>120.</u>	apes, formicas, et eiufmo di carere arte. <u>28.</u>
anatomie definitio. <u>2.</u>	apofteſma ubi n̄ ſecaſ. <u>8.</u>
anatomie etymologia. <u>3.</u>	apofteſma, latinis abſceſ ſus. <u>67.</u>
in anatomia q̄ ſint confi deranda. <u>3. 17. 32.</u>	apoplecticæ veng. <u>274.</u>
anatomie ſcriptores. <u>4.</u>	apoplexia quō fiat. <u>335.</u>
anatomia oſſium prius uidenda. <u>7.</u>	aquam nō eſſe in tunica cordis viuente anima li. <u>249. 294.</u>
anatomie vtilitas. <u>7. 9.</u>	ἀραχιδὸς tunica. <u>356.</u>
anatomia q̄ ſit dignior. <u>7</u>	Ariſtoteles formā vnā pro

pro alia declarat. 14.
 Arist. defensio ab Auer.
 cōtra Galenū. 25.
 Arist. et Plato. error. 12.
 Arist. declaratus. 20. 29.
 Arist. defensio. 98. 133.
 Arist. à Gal. repræhen-
 sus. 165.
 Arist. error. 332.
 Arist. in libris de gener.
 aīal. efficiētē, & mate-
 rialē cām inquirīt. 14.
 ars quæ pprie dicat̃. 3.
 ars non vno mō semper
 procedit. 23.
 arteriæ etymologia. 259.
 arteria aspera. 266.
 arteriæ asperæ diuisio. 267.
 arteriæ asperæ cartilagi-
 num figura. 292.
 arteria aspera quare sit
 cartilaginosa. 290.
 arteriæ asperæ tegmē. 272.
 arteriæ capitis. 278.
 arteriæ duas habent tu-
 nicas. 8.
 arteriæ emulgētes. 151.
 arteria, & aorta idem
 significant. 259.
 arteriæ sectio. 372.
 arterias venire usque ad
 extremā vnguī. 13.
 arteria venalis. 257.
 arteria venalis vnā tan

tū habet tunicā. 258. 259
 Arteriæ venalis motus.
 ἀρτηροδιδῆς cartilaginis
 situs. 304.
 ἀσπείγλαρος pars pedis. 332.

C

Caliditas neruos facit
 duriōres. 21.
 calida vehemēter maio-
 ri egent nutrimentō. 73.
 calor humido mixt^o na-
 ture est gratus. 28.
 καυμείσιον. 336.
 capillorū gñatio. 314.
 capitis anatomia. 313.
 capitis figura. 314.
 capitis partes. ibi.
 caput eē pp oculos. 23.
 caput esse ppter oculos
 molles. 25.
 caput cur homini ma-
 gnum. 25. 313.
 caro quid significet. 10. 31
 carpi ossa. 374.
 κάρπος. ibid.
 cartilago costarū. 222.
 cartilago stōachalis. 40.
 cartilago ūbitalis. ibi.
 cataracta oculorū, eiusq̃
 curatio. 360.
 causam ex fine spectan-
 dam esse. 14.
 καύλοισ. 176.
 cephalica uena. 275. 370.
 cerebrū

Cerebrū esse principiū
 sensus, & motus. 35.
 cerebrū quō maius sit in
 homine, quā ceteris
 animalibus. 331.
 cerebri vsus. ibid.
 cerebrū non esse ad refri-
 gerandum cor. ibid.
 cerebri diuisio. 332.
 cerebri substantia. ibid.
 cerebri ventriculi. 333.
 cerebri ægri tudines. 335.
 cerebri $\epsilon\lambda\gamma\tau\acute{\iota}\alpha$, seu $\delta\iota\delta\upsilon$
 $\mu\iota\alpha$. 336.
 cerebri ventriculorū di-
 stantia. 337.
 cerebri vulnera an sana-
 ri queant. ibid.
 cerebri purgādi uig. 338.
 cerebri tertius ventricu-
 lus. 339.
 cerebrū, & dorsi medul-
 la quid differant. 336.
 cerebrū quibusdā aīali-
 bus esse in pectore. 24.
 $\kappa\epsilon\epsilon\kappa\iota\varsigma$. 274.
 $\chi\acute{\iota}\tau\omega\upsilon\ \pi\epsilon\epsilon\kappa\iota\chi\epsilon\delta\acute{\iota}\omega\varsigma$. 248.
 cholago. 42.
 cholera. 119.
 $\chi\omicron\nu\delta\epsilon\omicron\varsigma$. 40. 222.
 chorda ex neruis & liga-
 mentis constat. 385.
 chorda omnis implanta-
 tur ossi alicui. 983

Ciuilia animantia quæ
 dicantur. 28.
 clauis. 223.
 clysteris immittēdi rō. 92.
 $\kappa\upsilon\upsilon\mu\eta$. 383.
 coitus cur tanta sit dele-
 ctatio. 162.
 coli anato, & sit⁹. 88. 90.
 coli figura. 93.
 colici doloris à renali di-
 gnatio. 91.
 colici dolore cuius mo-
 di sint. 92.
 colon cur sit carnosum
 & cellulosum. 90.
 colores plurimū ad opa-
 tionem conferre. 33.
 comedendi ratio. 36.
 communis vena. 370.
 complexio quid sit. 32.
 compositarum partium
 ratio. 10.
 Compositio in quatuor
 diuiditur. 32.
 $\kappa\omega\nu\acute{\alpha}\rho\iota\omega\mu$. 336. 340. 349.
 cōceptus nō in corde sed
 in cerebro formant^r. 302
 contra Aristo. 22.
 coopertorium. 306.
 cor ex seipso non nutri-
 tur. 56.
 cor est principiū uig. 35.
 cor intercipiē a pleura. 226
 cor magnū qd dicit. 251
 cor

Cor neruū n̄ habet̄. 261.	Curis frontis. 46.
cor omnium mēbrorum nobilissimum. 37.	cutis genarum. 47.
cor q̄re in medio sit. 244.	cutis labiorum. ibidē.
cor q̄o humectat̄. 249.	cutis b̄st̄aria triplex. 45.
cordis anato. 244.	cutis utilitas. 48.
cordis aures. 250.	κυσίς. 140.
cordis figura, & quanti- tas. 246.	cystis fellis anatom. 140.
cordis motus. 248.	cystis fel. egritudīes. 144.
cordis os. 261.	cystis fell. colligatio. 140
cordis pinguedo. 250. 295	cystis fellis collum bi- ceps. ibid.
cordis substantia. 247.	in cysti fell. lapis aliquā do inuentus. 136.
cordis tunica. 248.	cystis fell. nutritio. 143.
cordis ventriculi. 252.	cystis fellis obstructio q̄o curetur. 144.
cordis ventriculorū sub- stantia. 258.	cystis fellis partes. 143.
corp̄is diuisio ex Ari. 35.	cystis fel. sanguinem nul- lum producit. 130.
corp̄oris toti ^o opatio. 19.	D
coste vere et nothe. 222.	Delectationis in coitu ratio. 165.
costarū distantia. ibid.	dentium anatomia. 282
κοτυλίδονες. 165.	dentes an sentiant. 283.
cranij anatomia. 318.	dentes q̄o sentiāt. 155.
cranij commissurę. 319.	dentium numerus. 282
cranij ossa. 321.	dētes uiuūt, & crescūt. 13
cranij passiones. 322.	deliriū ex diaphragma- te lēso. 236.
crystallinus humor. 255.	diabetica passio. 157.
crystallini hum. s̄ba. 356	diabetis causa. 158.
Curdus se à calumnia tuetur. 292.	διάρωμα. 234.
curim sentire. 48.	διάρωμα. 33.
curis differētię q̄tuor. 46	diaphragmatis utilitas & ope
curis duplex ne sit, an tri- plex. 45	

& operatio. 57.234.
 Diaphragmatis anatomi-
 mia. 233.
 diaphragmatis ægritu-
 dines. 236.
 diaphragmatis colliga-
 tio. 235.
 diaphragma, & phrenes
 idem sunt. 254.
 diaphragma non extēdi
 extra costas. 233.
 diaphragma quare ita
 sit dictum. 234.
 diaphragmatis s̄ba. 235
 didymi significatio. 186.
 didymorū anatom. 185.
 digiti pedis, & manus
 quid differant. 382.
 diuisio corporis ex Ari-
 stotele. 35.
 doloris fixi significa. 93.
 doloris pungentis signifi-
 catio. 228.
 dorsi anatomia. 365.
 dorsi ossa. ibidē
 duodeni intestini anatomi-
 mia. 99.
 duræ & piæ matris ana-
 tomia. 325.
 δυσχρία.

E

ἐ γκέ φελος. 24
 ἔ κφυσίς. 99
 ἐ πικ λώ τ τ ις quid sit, 286,

ἐ πικ λώ τ τ ις. 381
 ἐ πιδ ρε μ ις. 45.46.
 ἐ πιδ ιδ υ μ ις. 189.
 Epigastrium. 42.
 epilepsia, quō fiat. 338
 ἐ π ί π λ ο ο ρ. 73.
 exitura apud Auic. 67.
 ἔ χ ι ν ο δ ὲ ῦ ossa. 341
 expultrix potentia quā-
 uis valida præter tēpus
 non expellit. 192

F

Fæces obduratas iūternè
 molliendas esse. 80
 fæcibus duratis sæpe do-
 lores adueniūt. ibidem
 fauciuū ægritudines. 235.
 faucium usus. ibidē.
 fel quibus insit animali-
 bus. 148
 femur. 380
 focilia ossa quæ dican-
 tur. 374
 fluxus supflui ex infirma
 retentrice pueniūt. 192
 fœmina cur ex se genera-
 re nequeat. 163
 fœminæ lactātes non cō-
 cipiunt.
 fœminæ materiam cōse-
 rūt ad generationē. 179
 fœminæ quare, cū min-
 gunt, flectantur. 197
 fœtus imperfe cti. 179

Formalis cā ex finali p
batur. 13
furculæ. 208

G

Galenī & Arist. discor-
dia. 23. 150. 215. 217. 245.
252. 255.

Galenī & Auice. discor-
dia. 77. 101. 336.

Galenī & Auer. contro-
versia. 341.

Galenī contradictio. 48
79. 31. 269. 337.

Galenī locus expositus.
42. 250.

Gal. Arist. esse in anato-
mia præponendū. 6.

Galen. contra Arist. de
restibus. 102.

Galenus defensus contra
Auenzoar. 284

Γαργαρέου. 285

Γάλλου. 42

glandulosæ carnis vsus
in mesenterio. 101

glandulosæ carnis circa
collū vesicæ vsus. 199.

glandulosæ carnis circa
asperā arteriā vsus. 273

glādulose carnis i nā. 211.

γλαττία. 336

γλοβόζομος. 302

γλαττία. 302

γονορζόλια. 192

Gulę situs. 291

gulam esse partem sto-
machi. 115

gulosi & timidi maus
habēt iecur cæteris. 128

guiden. 274

gurgulio. 285

H

Habitus rectè agendi. 3.

hemorrhoides venę. 205

Hernia didymorū. 186.

hernia varicosa. 187

herniæ curatio. ibidem

hernia quomodo fiat. 53

hominē non esse calidissī-
mum. 20. 22. 73

hominis ps superior quō
leuis dicatur. 21

homo an infirmæ sit di-
gestionis. 73

hō cur careat cauda 29

homo cur sit rectus. 19

homo, & simia soli ex
omnibus animātib⁹ in
epiplocelā incidunt. 73

hō nullā à natura insitā
artem haber. 28

homo quō differat à cæ-
teris animalibus. 29

homo sol⁹ canescit. ibid.

humeralis vena. 372

hūores crassos, nisi prius
attenuētur, ex vena ca-
ua nō eē educēdos. 134.

humor

Humor albugine⁹, eius-
 q; vsus. 356.
 hūor crySTALLIN⁹. 355. 356
 humor, qui in coitu à fœ-
 mina emittit^r qd sit. 165
 humor vitreus. 357
 hydrops ascites. 67
 hydropis curatio. ibidē
 hypochondrium. 40
 hypochondrium Arist.
 quid sit. 41

I

Ianitor. 122
 icterici. 144
 In iecore an lapis possit
 generari. 135
 iecoris anatomia. 128
 in iecoris dolore qui lo-
 cus perungendus sit. 42
 iecoris colligatio, 139
 iecoris arteriæ. 131
 iecoris neruus paru⁹. ibi.
 iecoris nutritio. 122. 131
 iecoris partes. 128
 iecoris ppria affectio 135
 iecoris quæ pars sangui-
 nem generet. 130
 iecur esse principium nu-
 tritionis. 3
 iecur quid sit. 129
 iecur pulmōe nobili⁹. 37
 iecur quare homini ma-
 gnum sit. 128
 iecur quare venas hēat

ad sanguinem genera-
 dum. 129
 ieiuni intestini anat. 97
 ieiuni intest. etymolo-
 gia. ibidē
 ieiuni intest. vsus. 15
 ἰερόν magnum signifi-
 cat. 365
 Ilei intestini anat. 96.
 ileos morbus. 77. 96
 ilia. 40
 infantes in vtero quo-
 modo mingunt. 41
 infantium vrina vbi ser-
 uatur. ibi tē
 inguina. 40
 inguina nō esse inter par-
 tes vētris inferioris. 44
 inguinū apostemata. ib.
 intestina. 77
 intestina an oēs habeāt
 naturales virtutes. 78
 intestina crassa pingue-
 dinem habent. 83
 intestina crassiora hūt ali-
 qd digerētis uirtutes. 90
 intestina cur ita inuolu-
 ta sint. 77
 intestina duas habent tu-
 nicas. 8
 intestina glandulosis car-
 nibus, aut omento non
 humectantur. 99
 intestina solūm debent
 expel-

Māmillarū substātia. 211
 mammillarum vsus. 214
 man⁹ cur careat pilis. 46
 manus & pedis differen-
 tia. 381
 manus operatio. 11
 masculi foet⁹ gñatio. 164
 masculi gñandi rō. ibid.
 masne an foemina sit fo-
 tus cognitio. ibi.
 matricis anatomia. 174
 matricis egritudinū cau-
 sae. 182
 matricis cellulæ. 181
 matricis colligatio. 175
 matricis collum. 180
 matricis collū augeſ ob-
 frequētem coitum. 179
 matricis colli plicatio-
 nes. 180
 in matricis doloſ ubi sit
 perungendum. 42
 matricis, et māmiilarum
 communicatio. 167
 matricis læua ps dextra
 frigidior. 164
 matricis neruus. 177
 matricis partes. 179
 matricis quantitas. 178
 matricis situs. 174
 matricis substantia. 179
 matricis tunica. 181
 Matricis vasa gemina.
 176, 177

matricis vasorum vtili-
 litas. 176
 matricis vtilitas. 182
 matrix vnam tantum
 habet tunicam. 81
 media stin⁹ pānicul⁹. 226
 media stini substātia. 227
 medicū ex quocūq; re di-
 scēdi occasionem cape-
 re debere. 32
 melancholia. 119
 melancholia mirachia-
 lis. 101
 melācholia quid stoma-
 cho conferat. 121
 membra à nemine aīad-
 uersa. 286. 304. 336
 membra continentia cō-
 trahunt circa rem con-
 tentam. 110
 mēbra gñationis in uiris,
 & foeminis conuenire.
 (163. 180. 293.)
 membra interiora homi-
 num, & brutorum. 9
 membrana. 45
 mēbranę σιγμοειδ. 255
 mēbranę πικρωχίτης. ibi.
 mēbra nobiliora nō ne-
 cessariō superiorem lo-
 cum tenent. 37
 mēbra nutritionis in tres
 partes. 58
 mēbra oīa cōposita. 10
 * * mem

Membra primaria. 347
 membra quę sunt eiusdę
 substantię eisdę habent
 operationes. 247
 membrorum ventris in-
 ferioris vsus. 206
 μένινγες. 323
 meninx dura, et rēuis. 224
 meringis durę vsus. ibi.
 meningis vtriusq; vsus.
 ibidem.
 menstrui sanguinis gene-
 ratio. 163
 mēstruū sine fœtus incō-
 modo exire pōt. 177
 menstruū clausa etiam
 matrice emitti pōt. ibi.
 meri. 42
 μέσος. 381.
 mesenterij anatom. 100
 mesenterij etymologia. 10
 mesenterij substantia. 100
 mesenterij cur factū sit. 101
 metacarpi ossa. 374
 μικρόκοσμος. 27
 monoculū intestinū cur
 ita dictum. 77
 morb⁹ pilaris in māmīl-
 lis ex Aristot. 216
 motus ex loco non fit si-
 ne musculis. 47
 motus cordis. 248
 motus genera. 383
 motus musculorū. 248

motus voluntarius mus-
 culos. 309. 319
 Mundini defectus. 19. 75
 96. 130. 150. 175. 201. 226.
 248 282
 Mundinus defensus. 216
 Mundini error. 16. 20. 22
 23. 27. 28. 31. 33. 37. 38. 41
 44. 49. 52. 57. 61. 68. 75
 78. 83. 89. 90. 92. 93. 97
 108. 110. 121. 129. 151. 164
 166. 179. 181. 182. 204
 213. 227. 235. 246. 249
 254. 258. 259. 277. 285
 286. 290. 291. 301. 316. 334
 339. 359. 375.
 musculi æqualiter cōpri-
 munt ex omni parte. 58
 musculi à veteribus o-
 missi. 6
 musculi carnosī cur ita
 dicti. 51
 musculi mesopleurij. 218
 musculi obliqui. 51. 67
 musculi vētris octo. 56
 musculi pectoris
 musculi quomodo cōtra-
 huntur. 390
 musculi quō procedāt. 51
 musculi recti. 51. 57
 musculi transuersi. 51. 57
 musculi substantia. 386
 musculi vbi ligantur. 51
 musculor; anatom. 383
 muscu

Musculorū motus 248, 386
 musculorum munus, 56
 musculorum ventris inferioris situs, 52, 52
 musculorum utilitas, 56
 musculos nunquam à dextro infini strum transire, 53
 musculus ani, 58-83
 musculus quid sit, 51, 385
 musculus quomodo cum nervo iungitur, 385
 musculus vnus tantum vnum habet motum, 381

μύκη, ος, 381
 N
 Narium ossa, 341
 narium usus, 338
 naturalis spiritus an deest, 132
 nervi ex caliditate duriores fiunt, 21
 nervi linguae, 310
 nervi oculorum, 348
 nervi optici, 345
 nervi quò à cerebro recedunt eò magis siccantur, 333
 nervi reuersiui, 275
 nervi sensum dant, 12
 nervi sensum dantes dant etiam motum, 240, 301
 nervorum diuisio, et usus 348
 nervorum ortus, 347
 nervos non esse simplices 31
 nigra vena, 370

notitia duplex, 4
 νόμφη, 294

O

Obstructiones in Iecore facile fieri, 134
 oculorum anatomia, 355
 oculorum egritudines, 359
 oculorum humores, 355
 oculorum tunicæ, 356
 oculus cur fiat niger, ibi,
 odoratiōnis organa, 341
 omenti anatomia, 73
 omenti coniunctio, 75
 omenti situs, 73
 omenti substantia, 74
 omentum conferre ad digestionem, 33, 74
 omentum cur factum sit, 50
 omentum si procidat quò reponendum, 69
 omentum vbi generatur, 75
 ὠμοπλάτι, 373
 operatio, et utilitas quid differant, 11, 33
 operatio manus, 11
 operationem primam facientia, & sequentia, 15
 optici nervi, 346
 ordo doctrinæ, et notitiæ confusæ an idem sit, 19
 oris anatomia, 282
 in crisi stomachi dolore vbi sit vngendum. 42
 os anchæ, 380
 * * 2 os ba-

os basilare, 349
 ὄσθιον. 136
 os coxæ, 380
 os pxydis, ibid.
 os pubis, ibidem
 ossa cranij, 321
 os sacrum, 365
 ossa trib⁹ modis iūgi 34
 ossium manus vsus, 11
 ossiū pedis numerus, 382
 oues cur ex renū pingue
 dine moriatur, 154
 οὐρῆς, 42

P

παγκρεάς, 110
 Palati os an sit perfora-
 rum, 338
 palati vsus, 283
 panniculi carnosī 44, 49
 pānicul⁹ sub musculis 60
 παράστα, 190
 παρεγκέφαλις 332
 pars adnata 11
 pars adnexa, ibidē
 pars oborta, 10
 pars nulla corporis va-
 cat operatione, 14
 partes corporis quomō
 omnes conueniant, 12
 partes omnes suā habe-
 re functionem, 14
 partes q̄ operationē p̄fi-
 ciāt, & q̄ adiuuent, 11
 partes organica, 12

Partes simplices etiā p̄se-
 ctionē cognoscuntur, 32
 partium diuisio, 10
 pecten, 40
 pectoris anatomia, 217
 pectoris materia parua
 p̄ sputum educēda, 268
 pectoris motus 217, 219
 pectoris operatio, 217
 pectoris ossium anat., 221
 pectoris operatio, 217
 pectoris saniei cura, 238
 πηχυσ, 374
 πηχίου pars pedis, 381
 pedis figura, ibidem
 pedis ossa, 382
 pericranium 316
 peritonij appellationem
 propriā Latini non ha-
 bent, 60
 peritonij partes, 62
 peritonij substātia, ibidē
 peritonij vsus, 60, 62
 pes à manu quod diffe-
 rat, 382
 πρεόν, 383
 phlegmon, 227
 phlegmone stante ī pleu-
 ritide an sit pulsatilis
 dolor, 228
 φρένες & diaphragma
 idem sunt, 234
 φρένες unde dictæ, ibid.
 phrenitis 335
 phreni-

phrenum vena vulnera
ta sequit̄ statim mors. 130
pilor̄ i renib⁹ gñatio 158
pinguedis differētia, 47
pinguedo an sit calida aut
humida, aut frigida, 48
pinguedo circa cor. 250
pinguedo circa renes 154
pinguedo, & adeps, 48
pinguedinē liquefactam
esse calidā, concretam
verò frigidam. 74

pinnarum pulmonis v-
fus. 266, 268
Plato. & Arist. error, 12
pleura & mediastin⁹ idē
sunt. 226
pleuritidis cognitio. 227
pleuritidis signa. 228
pleuritis duplex, 227
in pleuritide quo loco
vena sit secāda, 269, 276

Q

Quæ primā operationē
exhibeant. 15
quæstio, an caput sit ocu-
lor̄, an cerebri gr̄a, 23
quæstio de motu liguē, 309
quæstio de sensu coi, 334
quæstio de sensu dentiu, 283
quæstio d̄ r̄ucis oclor̄, 357
quæ hō sit rectē statur, 14
quare nerui optici iungā-
tur. 346

quare q̄ excernūt anhe-
litum retinent. 57

R

exarolōnis tunica, 356
rafeta dicit̄ καίρος. 374
Rasis reprehensus, 97
regula ad inueniendū q̄
partes operationē p̄fici-
ant, & quæ adiuuent, 11
renes quō trahant, 151
renum ægritudines, 157
renum operatio, 150
renum pinguedo. 154
renum situs, 149
retē mirabile. 348
retentricem potentia tr̄i-
plicem esse, 79
retentrix potentia quāuis
valida præter tempus
non retinet. 192
retina tunica. 357
risus causa. 235
risus duplex. ibid.
risus sardonius. 236

S

Saliuæ generatio. 212
sanguinē quōq; expui etiā
silia fracta nulla sit v̄ca,
sanguinis cōcoctio (267
in Iecore. 139
sanguinis generatio in q̄
parte Iecoris fiat. ibi.
sanguinis mictus, 152, 159
sanguis i dura menige. 332

✱ ✱ 3 san-

sanguis in venis nō ca- ret spiritibus,	257	Iam incidunt.	73
sanies in pectore quō p- ege stiōes excernat,	230	similes partes septem,	10
sanitas, & egritudo in du- plici natura cōsistūt.	32	similitudo artificialium, & naturalium.	12
saphæna uena,	379	incipit infantis cur mol- le sit.	21
σικκῶσιδῆς, os pedis.	282	siphac.	60
σκέλος Latinum nomen non habet,	381	sit ^o , ordo, colligatio, et fi- gura pendent ex finali causa.	13
σκέλος operatio,	ibid.	somnus quomō fiat.	349
σκληρετῆς tunica.	357	σφικτιδῆς venæ.	274
sciatica vena,	380	σφιγτῆρ.	83.205
σκιωλοιδῆς.	336	σφύρα.	383
scoptula aperta.	373	spiritus naturalis.	132
secantis munus.	4	splen arterias habet.	122
sectionem nō esse de ana- tomix ratione,	2	splenem ex iecore attra- here posse.	123
secundina tunica.	357	splenis anatomia.	119
semē mulieris in matricē ne, an extra mittat.	165	splēis colligatio, figura, & cōstituta, & situs. ibid.	
semen substantiā testiu ingreditur.	190	in splenis dolore vbi sit perungendum.	42
seminaliū uasorum ana- tomia.	163	splenis munus.	122
seminalium uasorum ge- neratio.	164	splenis nutritio,	
seminis fluxus.	192	splenis uulnitates.	133
semis fluxus curatio,	193	splē sāguinē n̄ gignit.	123
sensus communis.	334	σπυγοιδῆς ossa,	341
septum transuersum.	234	spondyli.	221
σικμοιδῆς membranæ,	255	spondylorum dorso nu- merus.	365
simia & hō solū ex oib ^o animalib ^o in epiploce		squinantia, quæ sic	307
		σπῆνικῆ συρρα.	320.
		σῆνιγ.	208.222.
			sternu-

sternutatio. 333
 stiptica quare i fluxu ap-
 plicentur. 80
 stomachi anatomia. 107
 stomachi colligatio, &
 figura. 108
 stomachi, & linguæ idē
 est sapor & sensus. 282
 stōachi fluctuationes. 109
 stōachi ore affecto añri
 ores pres ungedas eē. 43
 stōachi orificia, et os. 114
 stomachi partes. 110
 stomachi quāritas. 109
 stomachi situs. 107
 stomachi substantia. 115
 stōachi tēperamētū. ibi.
 stomachi tunicæ. 116
 stomachi turbatiōes cur
 inter egerēdū cessent. 89
 stomachi vsus. 115
 στόμαχος. 42
 stomachus circa cibū cō-
 trahitur. 109
 stōach⁹ dorso alligat⁹. 42
 stomachus duas habet
 tunicas. 81
 stomachus melācholico
 sanguine nutritur. 122
 stomachus oīa villorū
 genera habet. 58
 stōachus quō nutritat. 115
 στεγνός. 198
 strictor musculus. 183

lumen. 40
 lumen Auice. significat
 vmbilicum. 41
 futuræ cranij. 320
 fursū et deorsū i polis 27
 syncope cur accidat i su-
 mendo medicamēto. 89

T

Tali. 383
 τῆρος, pars pelis. 381
 testes cur homini extra
 pendeant. 185
 testes esse necessarios ad
 generationem. 191
 testiculi mulieris. 167
 testiculus sinister, frigidī-
 or est dextro. 164
 testium substantia. 191
 thoracis magnitudo. 221
 thoracis ossa. 223
 thorax qd significet. 207
 timidi, et gulosi mai⁹ ha-
 bē t iecur cæteris homi-
 nibus. 128
 timiditatis causa. 251
 τῆραξία arteria. 266
 τριγλώχινης mēbranę. 255
 tumor præter naturā. 67
 tunica ἀραχιδῆος 356
 tunicę oculi quot sint. 357
 tunicę stomachi quomō
 differunt. 111
 tunica εἰσποδῆος. 356
 tunica retina. 357

* * 4 tunica-

tunicarū stomachi sub
 stantia. 110
 tunica σκληρῆς. 357
 tunica secundina. ibid.
 V
 Vasa seminalia an aperi-
 riantur. 198
 uasa seminalia m̄s̄e. 165
 vasorū seminaliū usus. 191
 vena arterialis. 256
 vena basilica. 275. 370
 vena cephalica. 275. 370
 venę apoplecticę, seu ve-
 nę somni. 274
 venę brachij. 370
 venę capitis. 278
 venę caue anat. 149. 275
 uenę caue p̄cess^o ois. 275
 venę emulgentes. 150
 venę in Iecore. 128
 an uenę iugant̄, q̄ à uena
 caua, et porta egrediun-
 tur. 133
 venę portę rami. 120
 venę sectio in pleuriti-
 de. 269
 venę σφυγίτιδος, seu iu-
 gulares. 274
 venę vnā tm̄ hñt tunicā.
 venā nō cē ex opposito
 loci affecti feriēdā. 346
 vena poplitis. 380
 vena porta. 128
 venas nō esse ex mesen-

terij substantia. 100
 venter inferior carne us-
 totus. 36
 venter inferior cur eo lo-
 co sit positus. 37
 venter medius ex ossib⁹
 & carne constar. 36
 venter superior totus os-
 seus. ibid.
 ventriculus tertius cere-
 bri quid sit. 339
 ventris medij anat. 287
 vētris triplex effect⁹. 67
 vermem non esse de ce-
 rebri substantia. 338
 vermium in intestinis ge-
 neratio. 95
 vermis cerebri tracta-
 tus. 383
 vertebrum, os. 381
 vesicę anatomia. 198
 vesicę ægritudines. 198
 vesicę fluxus. 198
 vesicę lapis. 199
 vesicę meatus. 198
 vesicę musculus. ibid.
 vesicę nerui. 198
 vesica nō trahit urinā. 151
 vesica vnā tantum ha-
 bet tunicam. 81
 vidēdi primū orgāū. 355
 villi obliqui. 57.
 villi omnes retinēdi po-
 tentiam habent. 78
 villi

D. MATTHÆI
CVRTII PAPIEN-
SIS MEDICORVM

SVA TEMPESTATE
FACILE PRINCIPIS,

IN MUNDINI ANATOMEN.

PROOEMIUM.



ONSVEVI quidem aliàs in ini-
tio statim explicandæ Anatomie, de
clarare sermonẽ de Anatomia esse
Sacrum, & uerũ hymnum, ut Gal.
auctor est tertio de usu par. cap. de
cimo, & decimoseptimo cap. primo,
Verũ quia uos ad altiora accensos conspicio, Ideo
his omiſſis, uidebimus Primò quid sit Anatomia ipsa,
Deinde quantum perfectam nostra hac tempestate ha-
beamus, & qui Gale. libri de ea extent. Tertio loco,
qui ordo seruandus sit dum eam aggredimur. Quarto,
quæ animalia homini similia adeò sint ut in ipsis com-
modè possit exerceri. Quinto, uidenda erit quæ ex
Anatomia utilitas proficiſcatur. Postremò, traditis an-
tea quibusdam regulis haudquaquam inutilibus, ad
Mundini expositionem ueniemus, Qui omnia ferè ab
Aristot. & Gal. accepit, atq; adnotabo loca unde sum-
psit, quæ uerò Mundinus addidit ea ferè omnia sal-
sa esse conuincam. Illud præterea polliceor, ostensurũ

2
me uobis duo membra, quæ hæcenus cæteros omnes la-
tuerunt, quæ ante me nemo usquam ostendit, Quæ ma-
nifestas habent operationes functiones ue, in quibus
alij decepti fuere, Igitur quid sit Anatomia est Gal.
descriptio in eo libro qui Definitiones medicæ inscribi-
tur, estq; suspectus an sit Gal. quo in loco ita scriptum
est. Anatomia est speculatio eorum quæ sunt abscondi-
ta. Commētat. autem Alexā. in librum de sectis comen-
11. apertissimè dicit, Anatomia est diuisio eorum quæ
sunt absconlita, Verùm in introductorio, qui & ipse
uocatur in dubium an Galeni sit, inquit (quisquis ille
auctor fuerit) Anatomie uocabulū præter usum usur-
patur pro exteriorum corporis partium enarratione,
Est enim explicatio per sermonem partium interiorū,
cum naturali earum situ, ordine, & usu. Primò dicit
Anatomia est explicatio partium interiorum, ex qui-
bus uerbis manifestè apparet, non esse de ratione ana-
tomie sectionem, licet id translationes omnes uideantur
sentire: nam, ubicunq; est anatomia in græco codice,
Leonicenus transfert artem secandi, ut in fine tertij
Artis medic. & de locis affectis libr. primo cap. 1. &
lib. quarto cap. 4. & lib. quinto cap. 7. & Therap. li.
sexto cap. 4. At uerò Galen. in lib. de anatomia uena-
rum nihil tradit de ratione, aut arte secandi, similiter
in lib. de anatomia neruorum, & tertio Artis medic.
cum libros suos in ordinē redigit, ita inquit. Sed, quia
quæ per anatomiam ostenduntur maximè conferunt
oportet eum exerceri in anatomicis libris, inter quos
præcipuè utilis est liber de anatomia ossium, proximè
de anatomia uenarum. Quibus uerbis uidetur Galen.
definitionem illam probare, quam ex introductorio re-
tulinus

talimus, Quòd scilicet anatomia sit explicatio per sermo- ³ *disfo' Anato*
 mouem partium interiorum corporis humani. Pro qua
 sententia illud præcipue stare uidetur, quòd Gale. cum
 librum ediderit in quo de modo ac ratione secandi tra-
 ctat, non illum De anatomia librum appellauit, sed po-
 tius de anatomicis aggressibus. Neque significatio uer-
 bi contra hanc sententiam facere uidetur, nam τμήν idē
 est quod sectio, ἀνά uerò, ut plurimum significat Rur-
 sum, uel re, est igitur ἀνατομή quasi quædam iterata
 sectio, quæ sit post realem sectionem, ut si quis de par-
 tibus incisus & diuisis sermonem habeat illud sit ἀνα-
 τέμνειν .i. refecare. cum etiam auctor introductorij di-
 cat ἀνατομήν .i. resectionem, uel refecare esse explica-
 re partes corporis humani, Atq; ideò Galen. uidetur
 uti hac uoce ἀνατομήν pro explicatione partium hu-
 mani corporis quo ad situm, ordinem, & usum, Qua
 propter, cum in primo de anatom. aggress. cap. 2. ad
 anatomie cognitionem, cohortaretur ita inquit, oportet
 ipsis oculis accerrimū spectatorem esse eorum quæ
 tunc temporis Alexandriae tradebantur. Quare ter- *Anatomia*
 minus iste anatomia à Galeno accipitur pro explica- *disfo' su-*
 tione partium corporis humani, quæ quædoque fit per
 inspectionem, quædoq; per sermonē. Ceterum quatuor *q. sit in*
 sunt in anatomia diligenter consideranda Ac primò *Anatomi-*
 modus, ratioq; secandi, pro quo illud est perspicuum, *seruanda*
 quòd qui tractatus nos edocet sectionem corporis hu-
 mani, illi artis nomen maxime conuenit, appellaturq;
 habitus recta ratione agendi, Nam in quacunque actio-
 ne possumus rectè, & secus agere, datur habitus, qui
 docet rectè facere, atque hæc est maxime proprie ars.
 Hanc artē Galeno acceptam referimus, qui de ea quin-

decim reliquit libros, quorum nouem tantum extant, nihil habemus ex Auer. Paucula quædam scripsit Mundinus, qui plerunque opposito modo docet secare, quæ faciat Galen. Deinde consideranda est resectio ipsa, atque incisio, illiusque qui incisionem docet munus est ut etiam secet, ad philosophum enim aut medicum istud non spectat. Tum, corporis humani partium notitia, Quæ duplex est, altera quæ sensu comprehenditur nempe uisu, & tactu, atque ista necessaria est medico, & philosopho, hanc enim accipiunt ab arte anatomie, & à sensu, Aristoteles quoque in libris de partibus animal. anatomiam est aggressus, supposita arte quæ diuidere docet, eademque ipsa diuidit, Altera est quæ per sensus quidem habetur potest tamen ratione nihilominus confirmari, per anatomiam quæ fit in uiuis, quod inferius declarabitur, atque hoc philosophi munus est, quemadmodum fecit Aristo. in libris, de partibus animalium, itemque in libris de generatione animalium, Hoc idem, quò ad humani corporis partes, latissime tractauit Galen. decem & septem libris de usu partium, non tamen possunt libri illi Tractatus anatomie nuncupari, si quidem est tractatus anatomie ille nuncupandus in quo de anatomia differitur quæ sensu percipitur, notitia autem partium quæ per causas acquiritur, tractatur per libros de usu Part. & primo de locis affect. cap. 1. Et tertio artis medic. in fine. Liber autem de usu partium, est philosophie liber, sequiturque librum de anatomicis aggressib. Verum hoc dicet quispiam, quomodo ad philosophum spectat, cum illum Galenum ediderit? Cui ita responsum uolo. Galenum in re medica eam tantum philosophie partem

tem tractare quæ medico est utilis, nam primo de usu par. cap. 3. asserit neminem ante se perfectè de partibus corporis humani, neque Aristotelem, aut Platonē ipsum, ut de neruis uocis, de motu pectoris, de membrorum principatu, Qua etiam causa se impulsus fuisse ait, ut libros de usu part. componeret: ex his perspicuū esse censeo, quòd tractare de operationibus, atque usu partium corporis humani munus sit philosophi, nō medici, quod fecit Gale. in lib. De motu musculorum, De motu pectoris & pulmonis, De uoce, De reliquis autem, & de membrorum principatu tractauit in libris De Hippocr. & Plat. placitis.

Videamus nunc quomodo perfecta sit anatomia. Nam Auer. collectorum. libro secundo, cap. I. & 19. dicit, neque Aristote. neque sua ætate perfectam fuisse anatomiam, præcipuè de diaphragmatis motu, siquidem Aristotelis ætas nouit tantum diaphragma diuidere superiora mēbra ab inferioribus, quod posteriùs Gale. tempestate compertum est uoci opem ferre. Nec uerò propterea dicendum est Aristoteli Galenum contradicere, complent enim potiùs quæ in Aristotele desiderantur, Idem Auer. in paraphrasi de animalium part. cap. de cerebro. & secundo de anima cōm. 108. negat tempore Aristotelis cognitum fuisse neruos à ligamentis distinctos esse. Nunquam autem perfectè adeò habita fuit anatomie cognitio, ac Galeni temporibus: nā nostra hac tempestate imperfectiorem esse arbitror quàm fuerit Aristotelis aut Auer. temporibus, nec iniuria, nullus. n. extat auctor qui recta ratione secare doceat, præter unum Galenū, qui de anatom. aggress. quindecim libros conscripsit, ex quibus nouem tantum

extant, reliquos nobis temporis iniuria surripuit: non est igitur quòd quisquam miretur, si in huiusmodi doctrina Galenum Aristoteli præponendum censeam, secutus Auerois ipsius sententiam, Galenus etiam libro de usu part. secundo, cap. 3. asserit ueteres anatomicos errasse, nam musculos omiserunt, & Paulò inferiùs, Quicunque, inquit, naturæ opèrù inspector fieri uult non eum oportet anatomicis libris fidem adhibere, sed proprijs oculis, aut ad nos accedere, quàm plurimos autem conscripsit Galenus de anatomia, quemadmodùm testatur ipse in libello quem De proprijs libris edidit, dicens, Primum est libellus De ossibus, quem introducendis scripsimus: tum De uenarum, & artèriarum sectione, De neruorum sectione, De musculorù sectione. Postea sunt libri De anatom. aggress. In quibus exactè tradit omnem artem anatomie, ad quos, habita ossium anatomia, procedemus. In quorum primo libro tractat de musculis omnibus: tum brachij, tum manus, Altero, de pedum musculis & ligamentis. Tertio, de intestinorum neruis, & uasis. Quarto, de musculis genas & labra mouentibus, & his qui mento subiacent, Præterea etiam de his, qui caput, collum, & scapulas mouët. Quinto de musculis thoracis, & de ijs qui sub uentre, lumbis, & femoribus sunt. Sexto de organis nutritiuis. Septimo de corde & pulmone. Octauo de pectore. Nono de anatomia cerebri, deficit enim reliqua pars spinalis medullæ. Decimo, oculorum, lingue, orificij, & consinium partium. Vndecimo de instrumentis uocis. Duodecimo de uenis & artèrijs, quæ sunt in reliquis partibus. Tertiodecimo de neruis è cerebro descendentibus. Quartodecimo, de neruis à medulla

spinæ

spinæ ortum trahentibus, Quintodecimo tandem de membris generationis. Ex quibus perspicuum esse potest, uniuersam anatomiam fuisse à Galeno pertractatam, nō solum de modo ac ratione secandi, uerū etiam de partibus secandis. Quòd si omnes eos libros haberemus, nihil esset in anatomia desiderandum.

Nunc est uidendum, quo ordine in anatomia procedendum sit. Igitur Galenus Primo de anat. aggress. cap. 2. Oportere, inquit, prius ossium anatomiam inspicere, nam sicut ligna in tentorijs, parietesq; in domibus, ita se habent ossa in animalibus, ut si craneum rotundum est, tale esse cerebrum necesse sit, & quibus genæ parue sint, ij & faciem totam rotundiorē, & musculos etiam paruos habeant necesse est. Post ossium autem, ad musculorum anatomiam est accedendum, ita enim ordo postulat. Deinde uenarum, arteriarum, & neruorum promiscuè. Succedit demum interiorum membrorum anatomia, atque hæc est postremo loco relinquenda. Positis autem quatuor sectionum generibus, quæri solet quòdnam dignius sit, & utilius. quod ut cognoscatur distinctio est opus, nam, ut Galen. auctor est & medico & philosopho utilis ac necessaria est anatomie inspectio, si quis igitur rursum sciscitetur quæ nam sit philosopho utilis, huic ego responderem philosopho ut philosophus est æquè conferre omnem anatomiam, tametsi magis ei cōueniat ea quæ principum est membrorum. neque uerò omnis anatomia idem munus sortita est, siquidem ea quæ est de omnibus membris docet naturam nil frustra fecisse, ad cognoscendum autem singulorum membrorum usum, diuisim uniuscuiusque membri anatomia est exercenda,

præcipuè uerò medico utilis est musculorum anatome, hæc siquidem modum tradit & rationem operandi: quòd si uolueris ferream, plumbeam uel pilam, aut sagittã, siue eiusmodi aliud extrahere, apostemã uel incidere, uenarũ, arteriarum, neruorum, & musculorum habenda est integra anatomie cognitio, neq; enim in corde aut hepate apostemata refecantur, quia partes illæ sectionem non ferunt. Illud uerò permirum accidit nostrates medicos hanc anatomen nihili penlere, atq; ideò etiam dum hæc contemnitur haud facile uidere cõtinget ne mediocrem quidem Chirurgum.

In animalibus autem, quæ homini similia sint ut in illis exerceri possit anatomia, huiusmodi ordinem statuit Galenus ipse libro de anatom. aggress. sexto, initio statim, Sunt autem animalium sex tãquam gradus, quæ similitudinem membrorum hominis obtinent. Primum enim Simia maximè proximè ad hominis figuram accedit, deinde Cynocephali, tum Ursus, deinceps quibus dentes ferrati sunt, ut canes, mures, & sues, postea quæ solidas habent unguulas, ut equi. Postremò animalia ea quæ ruminantur, ut boues. In his igitur omnibus possumus sectionem aggredi. Et si enim, cum ad exteriorem formam respicias, homini longè dissimilia uideantur, habent nihilominus interiora membra interioribus hominis adeò similia, ut commodè possit in eis exerceri anatome, quinimo Arist. auctor est primo de histor. animal. 16. longè meliùs inspici posse in bruto, quàm in homine. Galen. in super, quo loco docet anatomiam in cerebro bouis. Cerebrum, inquit, bouis simile est hominis cerebro, præterquam quòd intellectu, & cogitatione caret. octauo etiam de usu part. cap. 6. nõ

a. mo=

admodum differre ait cerebrum bruti animantis, ab hominis cerebro tamet si complexione differant, idem etiam de corde bouis & stomacho sentiendum est. cuius rei causam tradit Aristot. libro de histor. animal. primo, cap. 16. Quia scilicet interiora membra materiam generant pro exterioribus, Quibus uerbis hoc sentire Aristotelem existimo, quòd exteriora membra in hominibus & brutis differant, propterea quòd nò eundem usum habeant exteriora membra hominis, & brutorum, interiorũ uerò functiones in homine cum brutis conueniant exemplo est pulmo cuius munus tam in homine quàm in brutis est dilatare, astringere, aërẽ que attrahere, Hepar quoq; in utrisq; sanguinem generat. Qua propter in interioribus membris, conuenit homo cum brutis, in exterioribus non item: Hinc colligitur falli eos, qui, cum in interiorum anatomia tantum intenti sunt, exteriora negligunt.

Nunc explicemus quod quinto loco propositum fuerat, utilitatem scilicet anatomie. Galen. igitur decimo septimo de usu part. cap. 1. & 2. Et de locis affectis li. primo cap. 1. & lib. quarto, cap. 4. & lib. quinto, cap. 7. Et Metho. lib. quarto, Auic, quoque quarta primi, cap. 26. in hoc conueniunt, anatomiam non solum medicis, uerum etiam philosophis utilem esse, qui enim absque ea poterit scrutari causas humani corporis? Iam uerò & Theologis confert plurimum, nam si consideret quàm sublimis fuerit in Aristotelis & Platonis tam sordida materia, quantum existimare debet esse diuinum intellectum? Illud præterea cõmodi affert anatomia, quòd Sophistis audenter resistere possimus, qui credunt humani corporis partes casu esse factas, Diui

nūmque Hippocr. irrident, quòd naturæ operationem medico expectandam esse affirmet. Confert postremò ad cognoscendam partem in humano corpore affectam, prænoscendumq; & curandum illā partem, ut si forte opus fuerit apostema incidere, sagittam, huiusmodi extrahere.

Restat ut quasdam regulas declarem, quæ his quæ dicentur lumen non mediocriter afferent, uolui autem eas hoc loco præmittere, ne cogar sæpius repetere, institutumq; aliquando sermonem interturbare. Cùm igitur nobis propositum sit tradere notitiā omnium partium, quot, & quales sint, Primò animaduertendum est inter partes corporis humani septem esse simplices tantum, id est quòd totum & pars sunt eiusdem rationis, eæ autem sunt, Os, Cartilago, Ligamentum, Villi, Panniculi, Caro, & Pinguedo, quas similes nostri uocāt: quod cum alijs in locis, tum in lib. de part. artis medicatiuæ doctrina secunda, cap. i. docet Galen. quo in loco dicit, Septem tantum simplices partes esse in nobis: alias uerò ex ijs constare. Nam Stomachus, Vesica, & huiusmodi ex illis composita sunt, ex uillis scilicet, & propria substantia, ut auctor est Galenus decimo Methodi. capit. decimo. Carnem uerò appello substantiam propriam membri, cum igitur membra omnia sint composita, Quis erit componendi modus? pro qua re oportet diligenter perpendere dictum Galeni in secundo De anatom. aggress. prope finem. Quòd partes corporis nostri quædam adnatæ sunt nonnullæ annexæ, aliæ abortiæ. Pars igitur abortiæ eiusdem est substantiæ atque illa, à qua ortum trahit, Quo modo paruæ arteriæ, à magnis ortæ dicuntur

tur, & nerui à cerebro. illa uerò pars adnata dicitur, quæ alteri parti ita iuncta est, ut ab ea sine sectione diuelli minimè possit, Quæ autè pars ita coheret alteri parti, ut uel solis digitis seiungi possit ea à nexa uocatur. Præterea sicuti res, quæ ab arte ueniūt, ut inquit Galen. iunguntur inter se uarijs modis, ut luto, glutino, ferro, funibus, & insertionibus, ita natura in colligendis partibus corporis humani usa est cartilagine loco glutini, carne utitur tanquam luto ad inserendas uenas, neruosq;, Insertione, ut in connectendis dentibus cum gingiuis, & suturis capitis. Chordis præterea, ut in iungendis musculis. omnium igitur harum partium, tam simplicium, quam compositarum, declaranda nobis est substantia, situs, causa, operatio, & utilitas. Quæ ut rectius cognoscantur, nosse oportet discrimen inter utilitatem, & operationem, quod notat Galen. De usu part. libro decimo septimo, cap. 1. Manus, quæ est membrum organicum, operatio est apprehendere, cuius partes quædam operationem perficiunt, ut musculi qui manum contrahunt, & mouent, quædam iuuant, ut ossa, quæ non mouent, sed ipsa à musculis mouentur, profunt tamen, quia ob sui mollietiem manus sine ossibus nihil posset retinere. quare aliud est operatio distinctum ab utilitate. Proposita igitur parte organica, declarandum est quæ partes operationem perficiant, & adiuuent: pro qua Galen. primo de usu part. cap. 9. tradens regulam, reprehendensq; Ariscotelè & Platonem de unguibus, ita inquit, operæ pretium me facturum existimaui, si earum partium operationem, in quibus manifesta est, explorarè, quod prius quam faciam, exponendum est Hippocr. sermone

nem:

nem: quo in loco dicit. Particulæ corporis omnes mutuo compatiuntur, consentiuntq; idest in famulatum, & subsidium unius operationis omnes conspirant. Vt ad legendi munus partes omnes corporis concurrunt, Pedes ad ueniendum, lingua ad loquendum, manus ad reuoluenda folia libri, & ad gestum, oculus ad uidendum. hæc uerò partes maiores, quæ & organice dicuntur, suas habent particulas, quæ ad totius organi sui actionem referuntur: Vt oculus uidendi organum est, multis constans particulis, quas omnes ad unam operationem, uisionem nempe, obtinet, Quare in unoquoque membro pars est quæ operationem perficit, reliquæ uerò deseruiunt atq; opem ferunt. sunt igitur partes sine quibus perfici non potest operatio, ut in manu muscoli, aliæ quæ prosunt, ut ossa, quædã etiam ut melius apprehendat, ut ungues: nonnullæ ad totius conseruationem, & salutem, ut sunt arteriæ: Nerui uerò sensum præbent. cū igitur de parte aliqua considerandū fuerit, primū aduertere opus fuerit principem operationem, tum in eam reliqua referenda erunt: atque hac ratione uniuscuiusq; partis usus reperietur. Quod si quanta sit huius regulæ uis nosse cupiat quispiam aduertant animum in quàm facili re decepti fuerint & Plato, & Aristoteles. Non est propterea quod mireremur si nonnulli magni nominis uiri causam ignorat, ob quam natura cor homini indiderit, cū operatione eius nesciant: Illud uerò præcipuè, maximam huic regulæ uim inesse, Indicio est, quod propterea decepti fuerunt Plato & Aristoteles, quia eam ignorarunt, nam eam ob causam retulit factos esse ungues, quia reliqua etiam omnia animalia eos habeant, Aristot. autē, quar

to libro de part. animal. cap. 10. ut digitorum extrema
 tuerentur. Quòd si diligentius considerassent, inquit
 Galenus, uidissent profectò eos ad manus operationē
 institutos à natura fuisse, ut. s. fortiùs manus appre-
 hensas res retineret: neq; enim tuerentur manum à fri-
 gido, aut calido: tametsi Aueroës in paraphrasi de ani-
 mal. Aristotelem defendere conetur dicens factos esse
 ungues, & ad tuēdas extremas digitorum partes, &
 ad apprehendendum, uerùm non potest Aristot. Tex-
 tus illud innuere. Ungues præterea uiuunt, sentiunt,
 & nutriuntur ex Galeni secundo lib. de anatom. ag-
 gress. Contra illos qui ex secundo artis medic. affirmāt
 unguium, & pilorum nullum esse regimen, sed solam
 generationem, unguesq; non sentire: arteriæ præterea
 ueniunt usq; ad extrema unguiū, licet per eas non dis-
 seminentur, ut in alijs fit, crescunt uerò ungues per
 subnascētiā, non quòd quælibet pars augeatur, na-
 tura uerò instituit, ut continuè succrescant, quoniam
 semper atteruntur, materia autem unguiū est sanguis
 per uenas demissus, non fumosa materies, quemadmo-
 dum in Pilis. Dentes quoq; ex secundo de comp. medi-
 cam. secundum locos uiuunt, & augentur continuè p
 subnascētiā, cuius rei signum est, quòd qui dēs den-
 tem oppositū non habet, quo atteratur, lōgior fit alijs
 dentibus. Harum quoq; partium causas reddit Aristo.
 in libris de animal. part. in quibus ut cōmentat. in pa-
 raphrasi declarat, inquirit formalem causam, & fi-
 nalem: efficientem autem, & materialē in libris de ani-
 mal. generat. Quare quæcunq; in membris sunt ex si-
 tu, ordine, colligatione, & figura, omnia ex causa fina-
 li pendent, per quam formalis etiam probatur. Galen.

Jacobus For-
 mensis a li-
 bert in expo-
 sitione in
 medicinalis
 lib. 2.º cap. 9.
 c. 1.º in cap. 1.
 ubi agit de si-
 gnificatione
 feminis par-
 tium

quoque in libris de partiū usu cū formam inquirit, situm, figuram, continuū, & superficiem, nulla alia cā utitur quā finali: Interroganti igitur quāobrem homo rectus incedat, Galenus respondebit, quia aptus est ad omnes artes exercendas, Arist. autem formali causa uteretur, quod scilicet superiorem partem leuiorē inferiore habeat, quod in alijs animalibus est opposito modo: quibus uerbis manifestum esse potest Aristotelē unam formam pro alia declarare, ut formā totius per formam partis, atq; eius inferioris. In libris autem de generatione animal. causam efficientem & materialē inquirit, ut uirtutem informantem, sanguinem menstruum, & semen. Ego igitur causam ex fine spectandam esse censeo. Illud etiam ex decimosextimo de usu part. cap. 1. & libro de constitutione art. medic. ca. 3. debet considerari, quod posset quis in animum inducere, partes quasdam non tantum frustra in nobis esse, uerum etiam ut laedant, tantum abesse ut prosint, huic ita responsum uult Galen. quamcunq; partem suam functionem habere, quod si aliqua esset iners prorsusque operatione careret, illa potius esset abscindenda: quare omnes nostri corporis partes sunt ad operationem aliquam utilem ac bonam institutae. Postremo, quoniā in uno quoq; membro partem esse dixi quae principem habeat operationem, reliquas uerò opem ferre: addendum est: uel quod partem illam cōsequitur necessariō, ut in unguibus est color albus: in musculis sapor, & rubor, & similia. igitur horum omnium accidentiarum causas reddet philosophus ac medicus, eorum inquam quae sunt in nobis, & quae id necessariō consequuntur, quod à natura institutum est ad operationem ob-

eundam.

eundam. ideoque ungues non sunt duræ, aut molles: quò comodiùs manui deseruiant. Quemadmodum etiã intestinum ieiunum, ut docet Galen. de usu part. quinto, cap. 3. non ob usum aliquem proprium est, sed ut ea, quæ per se usum præstant consequatur. Quæcunque igitur principem operationem exhibent sunt Substantia, Numerus, Figura, Situs, Ordo, & Via, quæ uerò subsequuntur sunt ueluti sapor, color, & huiusmodi. Itaque quælibet pars aut operationem perficit, aut optulatur, aut eiusmodi est, ut sine ea commodè operatio perfici non possit, aut à noxijs mēbrum tutatur, aut necessariò consequitur, ut sapor, color, & odor, & similia, licet hæc partes appellari nequeant.

INCIPIT ANATOMIA
MUNDINI.



QUIA Dixit Galenus septimo therapeuticę methodi auctoritate Platonis: opus in aliqua scientia vel arte traditur tribus de causis. Primo, ut quis satisfaciat amicis. Secūdo, ut exercitetur uti-
 lissimo exercitio quod est p̄ intellectu. Tertio, ut remediatur obliuioni: quæ est ex senectute. Hinc est q̄ his tribus de causis promotus proposui meis scholaribus in medicina quoddam opus componere. Et quia cognitio partiũ subiecti in medicina quod est cor-

hoc est iudicium apud Aristotē p̄ p̄ in p̄

pus

pus humanum quę partes loca dispositionū appellātur est vna partium scientiæ medicīne: vt dicit Auer. I. collectorū cap. de diffinitione medicīne. Hinc est q̄ inter cętera nobis cognita cognitionē corporis humani, & partium eius, quę ex anatomia insurgit p̄posui tradere, non hic obseruans stilum altum: sed secūdam manualem operationem vobis magis tradam notitiam.

CVRTII.



ROPONIT Mundinus se tractaturū primò de anatomia totius, tum partium. adducitq; Galeni sententiam in septimo Methodi in initio: quòd tres sunt causę quę nos ad scribendū impellār, quibus se quoque motum ait. Qui si errare in ijs quę ex Galeno adducitprehenditur, quid de ijs sperandum est quę ex suis adiecit, & quoniam multò grauiora in eo reprehendere est animus, nō grauabor primū hęc leuia attingere, quò dictis meis, veritatēq; ipsi maior fides adhibeatur. statim enim Galeni sententiam non commode adducit neq; enim ijs tantū de causis fieri libros dicit, quoniam & alię sunt, ut Imperium Principis, glorię cupiditas, verūm ob aliquam trium harum causarum, Platonemq; ad hoc tantū aduocat, ut ostendat fieri libros, quò senectuti opem feramus. peccauit etiam Mundinus, cum inquit se fecisse anatomiam

miam totius: nam anatomia, explicatio est occul-
 tarum partium, non exteriorum. Quod uerò dicit
 Senolle uti alto stilo sed per manualem operatio-
 nem, perridiculum est: Docui enim in anatomia *quatuor in*
 quatuor esse spectanda, artem secandi, rectam se- *anatomia*
 ctionem, cognitionem partiū sensu, & per causas: *sunt spectanda*
 Iste igitur inquit se nolle uti stilo alto (ita. n. appel-
 lat) sed reddere causas partiū ut facit Aristoteles
 in lib. de part. aīal. & Galen. in libris de usu part.
 Sed quæso quid aliud in hac re dici potest, quàm
 rem totam tractare rationibus ex Arist. & Gale-
 no sumptis?

MUNDINI.

Situato itaque corpore vel homine mor-
 stuo per decollationem vel suspensionem
 supino. Primo, notitiam totius debemus ha-
 bere. Secundo, partium. nam cū omnis no-
 stra notitia incipiat a notioribus nobis: & q̄
 sunt confusa sunt notiora: & totū cōfusius sit
 ptibus a cognitione totius debemus incipe.

Circa totum autem quod debemus co-
 gnoscere est id, in quo homo differētiam ha-
 bet ab alijs animalibus. Habet autem diffe-
 rentiā in tribus, scilicet in figura vel situ par-
 tium: & in moribus siue artibus: & in parti-
 bus quibusdam. In figura namq̄ homo est
 staturæ rectæ: & hāc habuit, ppter quatuor
 causas: nam corpus humanū habet inter cæ-
 tera animalia materiam leuissimā spirituo-

sam et aereã Et ideo ad superiora eleuabilẽ.
 Secũdo, inter cætera animalia eiusdem quã
 titatis calorem habet ampliozem, cuius est
 semp ad superiora eleuare. Tertio, formam
 habet perfectissimã q̄ cū angelis & intelligẽ
 tijs, q̄ totũ vniuersum regũt. cõmunicat: et iõ
 sursũ eius secundũ sursũ vniuersi esse debet.
 Quarto, ratione finis sui fuit eiusdem statu
 ræ & figuræ rectę: quia ipse finaliter ordina
 tur ad intelligere ad quod deseruiũt sensus
 & maxime sensus visus: vt apparet in proce
 mio metaphysicę: & ideo in ipso debuit ui
 sus situari, & cerebrum: & per consequens
 caput situ tali vt possit omnia vlt̄ diuersa sen
 sibilía apprehẽdere. Et quia ad plura visibi
 lia se extendit quando situatur in alto, q̄ ap
 paret quia custodiẽtes ciuitates, vt possint a
 longe bene videre, statuũt sua spectacula in
 loco alto: vt in turribus & huiusmodi, vt di
 cit Gale. 9. de iuuamen. membro. cap. 2. Et
 ppter hoc ipse ibi dicit. & Auic. auc. Gale.
 3. can. in principio. q̄ intentio in creando ca
 put superius in homine non fuit propter ce
 rebrum, nec propter aures, nec propter os,
 nec propter nares, sed propter oculos pro
 pter cãm dictã. Et sic apparet ex parte omni
 um quattuor cãrũ q̄ hõ fuit staturæ rectæ.

TA M E T S I passim anatomia exerceatur in homine, qui laqueo uitam finierit, aut cui caput fuerit amputatum, commodius tamen fieri affirmauerim de homine, qui in aquis perierit, propter colli partes, quæ in illis probe inspicere nequeunt. Cum uerò dicat Mundinus debere nos à notioribus initium sumere: atq; ideo à toto incipendum esse, quia totum confusius est, cõfusa uerò magis notiora sunt, uideretur uelle ordinem doctrinæ, eundem esse, qui sit notitiæ confusæ, cum tamen distincti sint, atq; ideo ratio hæc non ualet. uerum quidem est, cognoscendum esse hac in re totum prius, loquimur enim de notitia quæ sensu percipitur, in qua totum primò occurrit: Ad totius autem notitiã considerandũ proponit, quibus in rebus maximè à ceteris animalibus homo differat: ac primùm, quia rectæ est staturæ: cuius rei causas quatuor recenset: ad quam rem plurimùm proderit regula superius à nobis tradita, ex qua liquidò apparebit Mundini defectus, & ratio Aristotelis, Dicitur enim mēbra omnia in famulatu esse operationis totius corporis: uideamus itaq; quid prosit homini rectæ staturæ esse, ex illius enim usu apparebit quare homo eam figurã habeat. Totius igitur corporis opatio est multas exerceat artes, quòd si rectæ staturæ non esset, quæ artes exerceat omnes etenim artes aut stando, aut sedendo fiunt: ex Galeno, tertio de usu part. cap. 3. Arist. aut quarto de part. animal. cap. 10. inquit, Quia homo est prudentissimus, debuit habuisse manus, quas ut exercere posset oportuit fuisse rectæ staturæ: quã causam, quæ uerior est, omisit Mūdinus, propterea qd re-

gulam illā ignorauit; refert uerò quatuor causas, quarum duæ sunt Aristot. tertia licet sit Arist. ma-
 lè tamen ab ipso adducitur: reliqua, quam ipse ad-
 iecit falsa est. Imprimis dicit ideo hominē esse re-
 ctæ staturæ, quia sit calidissimus. hoc autē falsum
 esse uidetur: Galen. enim in Primo de Temperā.
 cap. 5. Leonem & canem esse homine calidiorem
 asseuerat. Auic. quoq; prima primi, hominem me-
 diæ esse temperaturæ, ait, inter omnia animalia,
 cui etiam Auer. assentitur. Notandum tamen est,
 Aristotelem, primo de part. animal. 7. uideri hanc
 referre rationē, quòd hō sit rectæ staturæ quia sit
 calidissimus: inquit. n. quia habet loca pulmonis
 & cordis calidissima. Et quarta part. probl. 6. hō,
 inquit, est omnium animalium maxime calidus &
 humidus. Verum eo in loco Arist. non dicit homi-
 nē esse calidissimum, sed calidū & humidū simul,
 & ideo si qua animalia sunt calidiora homine sunt
 etiam sicciora, ut leo & canis. homo uerò est cali-
 dus cum humiditate. Quam sententiā uidetur idē
 confirmare secundo de part. animal. quo in loco
 dicit, hominem esse calidissimū & refertissimum
 sanguine secundum loca pulmonis, ergo uult esse
 humidissimum, vel dicendum est quòd homo est
 calidiss. extensiuè (ut usitatis uerbis utar) quia pl⁹
 habet de spiritibus, non autem quòd sit calidior in-
 tensiuè. Sed in idem redit, quoniam spiritibus a b⁹
 dare & humidissimum esse, re idem sunt, nomi-
 bus tantum differunt, spiritus. n sunt calidi, & humi-
 di: Neq; uerò secundum Aueroem rationē ita for-
 mat Arist. ut dicat homo est calidissimus, ergo sta-
 tum rectæ staturæ. Verum hanc rationem colligit
 Auer.

Auer. homo cum nascitur non potest erigi: quia cerebrū habet cæteris omnibus humidius, cuius rei signum illud est quod sinciput per annū & eo amplius in homine molle permanet: atque ideò propter humiditatē, neruorūq; mollitiem non pōt erigi: sed procedente tempore exiccata illa parte ob caliditatem, euenit ut fiat rectæ staturæ, caliditas enim neruos illos duriores reddit. Solus igitur hō, cū primūm rectus non esset, propter abūdantiam exiccātis caliditatis fit postea rectæ staturæ. Potest tamen & alio mō ratio hæc secundū Auer. intelligi, ex quarto de part. animal. 10. quomō secūdam etiam Mundini rōnem intelligit, cū inquit, homo materiam habet leuissimā, ideò potuit esse rectæ staturæ. non tamen asseueranter inquit ob id esse rectæ staturæ. Dixi autem Aristotelē quādoq; unam formā per aliam pbare, Nam esse staturæ rectæ, & esse leue nō sunt eiūsdē formæ, probantur autem. Si homo debet esse staturæ rectæ, partem superiorem leuē esse oportet (intelligo autem per superiorem partem uniuersum truncū usq; ad coxas & anum) ergo oportuit istum truncum comparatum inferiori partī, coxis, s. & tibijs, esse leuiorem & calidiorē: ergo partē superiorē habet leuem, & calidam: ergo eum rectæ staturæ eē oportuit, atque ideo Aristo. quarto de part. anim. 10. declarat, quò animalia frigidiora sint, hoc magis serpere: ut serpentes, lacerti, & huiusmodi. Colligitur ergo quòd eadē ratione procedunt animalia in calidū & siccum, qua habēt staturā rectam: Atq; ex his habetur quo mō duæ illę rationes sint intelligendæ: neque enim, ut Mund. ita etiam dicit



Aristoteles hominem habere materiã leuissimã, sed leuem: neque absolutè calidissimam, sed calidissimã eo modo quo exposuimus. Tertia Mūdini ratio, quã non magis aptè adducit, est, Quòd homo idcirco rectæ staturę est quia cõmunicat cum intelligentijs propterea debuit habere superiora, & inferiora, ut mundus habet in arctico, & antarctico polo. Verũ vide quid consequatur: hominẽ .s. eo mō habere superiora & inferiora, quo poli. Sed Arist. quarto de part. animal. cap. 10. hanc habet sententiam. Hominẽ esse omnium animãtium prudentissimum, idcõq; illi manus esse datas ad exercendas omnes artes, quod facere nō potuisset nisi rectæ staturæ fuisset: quæ causa secundũ assignatam regulam uerissima est. Sed obijciat mihi fortasse aliquis aues licet duos tantũ habeãt pedes, pronas tamen incedere. neque eò confugiendũ est, quòd prone ob id incedant quia superiora grauiora habeant: quandoquidem duobus sustinẽtur pedibus quemadmodũ homo. quare non ualet cõsequẽs, pars superior leuis est & calida, ergo est rectæ staturæ. quoniam tametsi aues superiorẽ partem leuem habeant & calidam, non tamen idcirco sunt non pronæ. Ex his quæ dicta sunt uidẽtur Arist. rationes ex hac tertia pondus non habere. quoniam non sunt secundũ regulam. Crediderim ego causam illam tertiam potiore esse, ut quæ p̄ finalem rationẽ procedat, ex finẽque deducatur. ut concedamus alias quoq; rationes eo mō procedere quo interpretatur Auer. Propterea quòd homo leuis est & calidus, esse potest staturæ rectæ, nō tamen quia sit leuis tantũ. Affert etiã aliã causam
Arist.

Arist. Quia, s. bruta animalia partes habeant inferiores minoris quantitatis quàm superiores, idè prona esset in hoïe inferiora non sunt adè parua respectu superiorum, ut in brutis, atq; ideo conferunt plurimū ad figurā rectam, non tamen hæc necessariò concludit Quare sola tertia causa que ex fine & operatione totius sumitur necessariò cõcludet. Quarram cãm addit Mundinus falsõ omnino, cum hõ sit ad intelligendū institutus, intellectui aut sensus, & præcipuè uisus deseruiat: idè debuit esse rectæ staturæ, ut oculi ex alto minus suū obirent, nam totū caput propter oculos factū est teste Galeno, & Auic. Quæ rō manifestè falsa esse apparet, nam Galenus & Auic. cū probant caput esse propter oculos, id non de homine tantum affirmāt, sed de vniuersis animalibus, q̄re ex hac ratione deduceretur cūcta animalia rectæ esse staturæ, qñ etiam ipsis propter oculos caput est datū. Forte dicet quispiam, quibus oculi altiori loco siti sunt, ñ sunt prudentiores. ridicula ratio, rāquam ex oculis metiri soleamus prudētiā, malè enim ageretur cum exigui corporis hominibus, quos tñ vastis corporibus illis sæpius prudentiores esse usupcipimus, quare nihil affert p̄babile Mundinus hac sua ratione. Verum obiter admonuit locus ut non nulla adducamus, que faciunt ad quæstionē illam Oculorū ne an cerebri gratia caput sit à manibus à natura datum. Nam Arist. quarto de part. animal. lib. cap. 10. omnia animalia sanguinea, inquit, habent caput, quod est cerebri causa. Galen. autem de usu part. octauo, cap. 1. & cap. 5. docet, ad cognoscendum propter quā partem membrū ali-

quod factum sit, cum plures sint, enumerandas esse singulas partes, vt videas quæ pars posito mēbro cōsequatur, & ablato itidem auferatur. animalia, inquit, quæ carent collo, carent pulmone: & quæ collum habent, iisdem inest etiā pulmo, nā in animalibus carentibus collo inuenies quidē uenas, & arterias, non tamē asperā arteriam: quare propter hanc collum est factū. Vidēdū nunc est rationes Aristote. In habentibus caput, inquit, est cerebrū, in non habentibus non itē, nam ἐγκέφαλος .i. cerebrum ita nuncupatur eò, quòd sit ἐν τῷ κεφαλῷ, hoc est in capite. Sed dicat forte aliquis, in animalibus quibusdam carentibus capite principium in est sensus, & motus, quare etiā cerebrū inest necesse est: illud dicit Arist. non esse cerebrum, sed quandam ad cerebrū proportionem habere. Galenus uerò octauo de usu part. cap. 4. deceptū fuisse Aristotelem ait ex uocabuli nuncupatione: nā ἐγκέφαλος apud Græcos non significat substantiā rei, quemadmodū Latinis cerebrū, idcirco cum Plato substantiam eius innuere ac significare uellet, cerebrum medullam nomina bat. Sed, inquit Galenus, des mihi nomen substantiale cerebri: Si igitur substantia cerebri sit in pectore, quid prohibet cerebrum, ppter ea quòd sit in pectore, quominus suū retineat substantiam: igitur & si sit in partibus thoracis in animalibus quæ carent capite, non proportionale quoddam sed idipsum cerebrū appellabimus: quod ut manifestius appareat, Latini nō à positione, aut aliquo alio accidente appellarunt, sed ipsam rei substantiam significantes Cerebrū dixerunt, quòd nihil scilicet prohibeat hominibus quidem

dem in capite, cancris aut̄ in pectore cerebrum appellare. neque uerò ob id quòd nō est in capite eò minus in cancris $\epsilon\gamma\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron$ vocari debet: nā isdē & si oculi non sint in capite, nihilominus tñ oculi nominantur, idem est de cerebro dicendū, quod, ee si positione uarietur, non tamen idcirco substantiale nomen debet amittere, cūm, in quacūque parte est principium motus & sensus, in ea sit cerebrum. Soluamus igitur totam quæstionem secuti Galeni sententiā octauo de usu part. cap. 5. Methodus in uentionis hæc esto, de qua superius quoq; locuti sumus. Videndum est qua particula, earum scilicet quæ sunt in capite, careant pectora animalium nō habentium caput, quā ubi inuenerimus, nō dubiè dicendum erit illius causa caput esse factū. In omnibus igitur acephalis animalibus oculi super ceruices sunt, atq; ij duri, & quodammō ossi: ob id nempe quòd nō habent, quo tegantur. at in ijs, quæ caput habent oculi sunt molles, quos caput ipsum tuetur: nimirum igitur caput propter oculos molles factum est. Verū illud obijcitur, quòd ad oculorum conseruationem non opus fuerat tã grandī capite. Respondetur de Galeni sententiā, caput ideò magnum esse ut cerebrū etiam contineret propinquum oculis, ij enim sunt molles, atque ut conseruentur opus fuit molli cerebro, præterea egent spiritibus, qui à cerebro proueniunt. Aristotelis uerò sententiā tuetur Aueroës in paraphr. de animal. partibus, inquit enim. Animalia quædā esse exanguia, quædam sanguinea: in animalibus igitur frigidis non debuit cerebrum à corde longiùs distare, atque ideò in pectore est situm. Galenum uerò,

b s inquit

inquit, illud deceptit, quod existimauit Aristotele
uoluisse caput esse gratia cerebri, Verum hæc nō
est Aristot. mens, quinimo uult caput esse ut cere
brum distet à corde, hoc que in animalibus sangui
neis tantum contingit. Quare posito capite sequi
tur cerebrum distare à corde, atq; illo remoto hoc
etiam aufertur. Verum, pace Auero. ratio hæc nil
uirium habet, nam fieri pōt ut quedā animalia ha
beant caput, quibus tñ cerebrum est propè cor: ut
est in piscibus, in quibus cor capiti, in quo est cere
brum, propinquum est. Ex his patere existimo ex
data regula, Gal. rōnē noriorem esse, q̄ q̄ est Arist.

MUNDINI.

Propter quod vocatur antropos vel pla
tenus, id est planta reuersa: & microcosmus,
id est minor mundus: quia sursum & deor
sum habet sicut mundus & uniuersum. Et
hæc est prima differentia.

Secunda est ex moribus vel ex arte. Mo
res enim inter cætera animalia magis habet
mansuetos: nā est animal politicū & ciuile.
Arte omni a natura caret: nō enim habet ar
tem insitam a natura, ut aranea, apes, & hu
iusmodi, ad hoc ut percipiat omnē artē: si. n.
hēret aliq̄ insitā a natura, omnia alia careret
arte, ut dicit Gal. primo de iuuamē. mēbro.

Differt etiam ab alijs in partibus: nā non
habet partes multas, quas hñt alia anima
lia, extrinsecas: nam nō habet partes q̄ sunt
a na-

a natura datæ: vt arma ad defendendum: sicut sunt cornua, rostra, vngues lōgæ: & istis caret quia habet organū organorū quod est manus, quibus sibi pōt parare omne genus armorum ad defendendū: vt etiā dicit Gal. primo de iuuamentis. & ideo caruit a natura illis, vt omnia possit habere. Caruit etiam partibus quæ pilosæ, pennosæ, & squāmosæ sunt propter eandē cām: & etiā quia non habet materiam multū superfluā nec terrestrem, quæ materia est illarū partiū. Caruit etiam cauda extrinseca propter eandē cām etiam, quia cū sit stature rectæ quietē operatur sedendo: cauda enim extrinseca sessionē phibet: & hæc sufficiāt de anatomia totius.

CVRTII.

Expositis quatuor causis rectæ stature hominis; subdit Mundinus, propter illā uocari hominē ἀνθερωπον, & μικροκόσμον, quorum primū significare ait plantam reuersam, alterū minorē mundū quod scilicet sursum habeat & deorsum ueluti mūdus, hac autē in re fallitur, nam Aristoteles octauo physic. 17. & Galenus tertio de usu part. lib. cap. 10. aliam rōrē afferunt qua homo minor mundus est, quā Mundinus. si enim mundum accipiat pro uniuerso orbe, errat: sursum. n. & deorsum est in polis. Galenus autem inquit hominē minorē mundū appellari, quoniā tāra ars in hominis, & aliorū animalīū cōpositione exigitur, quāta in mūdo: vnde etiam in homine est oculus quod maximè solē refert.

refert. Aristoteles autem & Aueroës appellāt hominem & cætera animalia minorē mundum eo, quod ex se moueantur quemadmodū cælestia corpora. Illud quoq; quod dicit ἀνθρώπου significare plantam ituersam falsum est, & perridiculū; nam ἀνθρώπος, siquidē Platoni credimus, dictus est, quæ si ἀναθρόμῃ ἢ ὀπισθοποδῇ, id est contēplans quæ uidit̃ uel, ut alij uolunt, quasi ἀνω ἔπιπυ. i. sursum uergens: per rectam igitur staturam inquit primū hominem à brutis differre. Secundū autē discrimen sumit ex moribus, & arte, quòd scilicet homo animal sit politicū, nullāque à natura insitam artē habeat, sicut apes & huiusmodi. Quod ad mores attinet, fallitur Mundinus, qui uult hominē solum politicum ac ciuilem appellari, etenim Aristoteles libro, & cap. primo. inter ciuiles animantes connumerat, præter hominem, apem, uespā, formicā, grucem, & quæ labori cōmunicant idē, quarum opus cōmuni efficitur opera. quòd uerò dicit hominem non habere artem insitā, id quidem uerū est, sed ea in re decipitur quod credit animalia, quæ in operationē conueniunt, arte munus suū obire: Nam Gal. primo de usu part. cap. 3. Aristot. que & Auer. secundo physic. 80. uolūt quod hæc animalia, ut apes quæ fingunt alucolos, formicæ quæ thesauros fabricant, non arte, sed impetu quodam naturali opera sua perficere: quoniam ars non vno modo semper procedit, at ista nunquam nō simili rōne agūt, illud tñ uerum esse fatemur nullā artem homini à natura insitam esse: est enim hæc Galeni sententiā primo de usu part. cap. 4. Homo, inquit, sicuti corpus nudum, ita & animā omnibus artibus destitu-

tam

ram habet. Reliquam differentiam sumit Mundinus ex partibus quibusdā, quę non sunt homini cū cæteris animalibus cōmunes, de qua re latius agit Galen⁹, in initio primi de part. usū. Quod uerò hō careat cauda, refertur causa ab Aristot. quartō de partibus animal. cap. 10. Crura, inquit, homini, femore, surę que carnulenta sunt, cuius cā est, quòd homo solus animalium erectus: ut igitur facile superiora posset sustinere, natura corpulentia partī superiori dempsit, inferiori addidit, itaq; nates carnosas fecit, & femora, & suras, sed nates ad corporis requiem utiles reddidit, hō igitur nates & crura carnosā habet, ob eam quam diximus cām: & cauda ob eam rē uacat, alimentū. n. quod caudā adit, in hæc ipsa absumitur, ususque caudæ necessarius defuit, quoniam nates sua corpulentia satis operiunt. Atque hæc sunt differentię quibus Mundinus ait hominem a cæteris animantibus discerni. Sed plures alię sunt, ut quod unus omniū homo crura habeat carnulenta, & partē superiorem minorem, si cum inferiore conferatur: solus etiā hō habet mamas in pectore, ex Aristot. secūdo de Hist. animal. cap. 1. quod tñ ita exponit. Albertus ut intelligat, hoc esse etiā in animalibus homini similib⁹, ut si mijs. præterea solus homo canescit, ex Aristotele Sectione decima, problem. 62. Verum in quinto de generat. animal. cap. 5. inquit equos canescere: dicimus equum parum canescere, hominem uero plurimum.

De Anatomia ventris inferioris, qui
continet membra naturalia,

DE

DE partibus namq̄ licet sint duplices, sci-
 licet simplices & compositæ: de simpli-
 cibus nō ponā distinctā anatomiā: quia earū
 anatomia nō apparet p̄fecte in corpore deci-
 so, sed magis in liquefacto in gurgitibus aq̄
 rū. Sed ponendo anatomiā mēbrorū orga-
 nicorū de cōsimilibus loquar secundū q̄ cō-
 simile aliquod in aliquo membro organico
 dominatur vt de carne in anatomia coxæ &
 de ossibus in anatomia dorli & pedū & de
 neruis in anatomia cerebri & nuchæ.

De membris aut̄ officialibus sciendū est,
 q̄ in quāpluribus ipsorum quantū ad anato-
 miam factam in mortuis ad minus sex sunt
 videnda, vt dicit Cōmētator Alexandrinus
 in cōmento libri sectarum, scilicet quæ ipso-
 rum sit positio: quæ sit eorum substantia: &
 per cōsequens cōplexio: & quæ sit eorū quā-
 titas, numerus, figura, & cōtinuitas eorum.

Sed quantum ad anatomiam ipsorum fa-
 ctam in viuīs sunt consideranda duo, quæ
 etiam in mortuis vel mortuorum anatomia
 possunt quodammō apparere. primum est
 quæ sint iuuamenta ipsius & operationes. se-
 cundum est quæ sint ægritudines quæ in ip-
 so possunt contingere: & si curam aliquam
 appropriatā habent quæ sit illa ostendatur.

Distinguens Mundinus partes corporis humani in simplices & cōpositas, ait partes quasdam esse simplices, alias cōpositas. subdit deinde simpliciū partium anatomiam cōmodius exerceri in corporibus aqua liquefactis & absumptis. Quod uerò inter simplices partes neruos etiā recenser, fallitur, nam septem tantum sunt. C. s. Carulago, Ligamenta, Villi, Panniculi, Caro, & Pinguedo, per carnē autem substātiā mēbri intelligo. Nerui uerò cōponuntur ex villis, & sua substantia, nō igitur sunt simplices. atq; hęc habentur in libro de partibus artis medicatiuę. Illud autem quod uult simpliciū partium anatomiam nō posse fieri nisi in corpore in aquis absumpto, & ut ipse ait, liquefacto, est cōtra Galeni sententiā, qui docuit p sectionē eam fieri, de qua etiam libros conscripsit. Quinimo fieri id nullo mō pōt, ut in animali, in aquis dissoluto, & consumpto simpliciū partiū anatomia exerceatur. Galenus certē de quodam corpore aquis delato meminit in primo de anatomicis aggress. non quod ad simpliciū partiū, sed ossium anatomē utile esset. quī enim fieri pōt ut musculi, & nerui etiā ipsi, qui molli cōstant substātia, ut qui ex cerebro originem ducant, in aquis nō corrumpantur? atq; ideo non possum intelligere qua rōne uelit Mundinus huiusmodi anatomiam fieri in cadauere aquis absumpto. Quod uerò ad membra cōposita attinet, sex uidentia ponit, ex auctoritate comment. Alexan. in lib. de sectis cap. 11. quam tñ si quis diligentius animaduertat non rectē à Mundino citatā cognoscer: Verū quoniam in uiuis, & mortuis anatomicen fieri cōstat, non est credendum Galenū

Mundini
error.

partes
sunt septem

malum
dinus
non pōt
anatomic
melius
de corp
in aqua
pto.

vnquam viuum hominem dissecuisse, sed in brutis tantum viuis hanc anatomiam exercuisse: nisi forte casu contingeret in aliquo uulnere curando intersecandum inspicere, oportet. n. medicum ex qua cum que re discendi occasione aucupari: ut refert Galenus tertio de Potentibus naturalibus. cap. 4. cum inquit se in viuente adhuc animali diuidentem peritonium vidisse intestina omnia arte circumplectentia, que intus continebantur, & reliqua que studiosus lector per se videre poterit. Pro anatomia autem mortuorum, sciendum est, apud medicos in duplici natura consistere, sanitatem egritudinemque, in compositione scilicet, eaque, quam complexionem uocant, ex sectione igitur mortui corporis cognoscitur complexio, que nil aliud est quam substantia. cuiuslibet ergo membri est propria substantia ac complexio. ex Galeni sententia li. primo de usu part. cap. 9. Compositio uero in quatuor partiri solet, Quantitate, Numerum, Positionem, & Plasma, ut refert Auicenna. cap. de complex. sub Plasmate comprehenduntur Figura, Superficies, & Continuum, in mortuorum igitur dissectione hæc considerata sunt, Substantia, Quantitas, Numerus, Situs, Figura, Superficies, & Continuum. Sed dicet aliquis, rogabitque quare faciam, ut septem commemorem, cum commentator ipse sex tantum recenset: Dico ipsum adnumerare etiam Plasma quod sub se tria comprehendit. connumeratque tantum quinque, quibus addit membrorum communionem. Verum ego non hæc tantum spectanda censeo: nam, ut eodem in loco testatur Galenus, illa consequuntur color, sapor, mollities, durities, necessario: que quidem & ipsa sunt medico

dico consideranda, cum plurimum ad operationes conferant, ut oculo maximum usum prebet quod greci *ὀφθαλμὸς*, nos pellucidum appellare possumus. sunt igitur consideranda etiam hec accidentia que temperaturam sequuntur: modo faciant ad membrorum operationem. Quod uero dicit Mundinus in dissectione uiuorum duo spectanda esse, primo utilitatem, & operationes, deinde varias egritudines, errat: siquidem comment. Alexandr. duo quidem & ipse consideranda ait, sed ea esse, primo utilitatem, deinde operationem. Mundinus hec ita coniunxit tanquam idem sint, cum tamen multum differre etiam superius docuerimus, exemplo manus, in qua musculi totum operandi munus sibi uendicant, apprehendendi scilicet: ossa uero opem ferunt, hae autem per uiuorum anatomiam deprehenduntur. Nam quod omnem conferat ad digestionem, hinc colligi potest, quod, sicui in ventre uulnerato omni pars abscindatur, is post adeptam sanitatem non facile unquam digerit: confert igitur omentum ad digestionem, quod autem ad egritudinum considerationem per hanc anatomiam attinet, posterius dicetur.

MUNDINI.

DIVISIO autem & numerus partium corporis est: quia partes quaedam sunt quae extrema vel extremitates dicuntur. Quaedam uero intrinsecae & profundae. & illarum quaedam sunt quae ordinantur immediate ad conseruationem speciei: quaedam immediate ad conseruationem individui. Prima sunt

membra genitalia. Secunda sunt quæ in vētribus continentur.

Tres autem sunt ventres in corpore nostro, scilicet superior, qui cōtinet mēbra animata vt caput. Inferior, qui continet mēbra naturalia. Medius qui continet membra spiritalia. Primo tamē incipiam ab anatomia ventris inferioris: quia illa membra fatida sunt. Et ideo vt ista primitus abijciantur ab eis incipiendum est.

Secundario quia omnis nostra cognitio, & speculatio, specialiter quæ ex manuali cōsistit operatione, a notioribus nobis incipit. talia autem, cū sint posteriora natura, sunt nobis notiora.

Primum autem quod est videre in hoc vētre est substātia et cōplexio eius, quia positio eius est satis nota, quia fuit positus infra alios vētres propter imperfectionem eorum membrorum, quæ cōtinentur in hoc ventre: quia membrum quanto minus participat de nobilitate & perfectione; tanto magis locū infimum obtinet in genere membrorum, sicut est in mūdo in genere entium. Item quia cōtinet membra deputata ad expurgādum & ad continendū feces & superfluitates graues quæ tendūt deorsum, & specialiter quæ
sunt

sunt acceptę per sursum.

Est itaque substantia eius carnosā & pelliculosa: carnosā tamen est magis. & ex hoc apparet quod est complexionis calidę & humidę. Et causa quare fuit huiusmodi vĕter carnosus & pelliculosus, & nō ossuosus est, quia huiusmodi venter habet continere mēbra quę sunt propter assumptionem cibi, vt stomachus apta inflationi: & propter retentionem fēcum: vel ex aquositate, vt hydrophis: vel ex ventositate, vel propter impregnationē debet aliqñ matrix intumescere. Si aut vĕter esset ossuosus nō posset intumescere.

Secundum, quod oportet videre est numerus partium, quantitas, & figura.

CVRTII.

Diuidit totum corpus in tres ventres, prior est cerebrū seu caput, Alter uĕter medius, Tertius, uĕter inferior. Aristoteles autem primo lib. de Historia animal, cap. 7. diuidit totum corpus in caput, collum, thōracē, duplex brachium, & crus duplex. Mundinus autem diuidit corpus in interiora, & exteriora: atque interiora quidem in tres ventres. pro qua re illud est adnotandum, quod Galenus diuidit hos tres ventres, dicitq; in nobis tria esse membra, quę principatum obtineant, atque ideo naturam tres ventres fecisse, primumque Cerebro, alterum Cordi, tertium Hepati datum esse: Nam Cerebrum sensus & motus est principū, Cor vitę, Hepar nutritionis. Est autem superior venter totus of

c 2 feus,

feus, inferior carnulentus, medius ex carne & ossi-
 bus constat. cuius rei hæc ratio affertur: quod, cum
 cerebrum sit principium motus voluntarij, consen-
 taneum erat ipsum voluntario motu moueri: atq;
 inde totum hunc uentrem osscum fuisse oportuit.
 Inferior autem venter merito carneus fuit, ut in mu-
 lierum conceptibus posset extendi, Deinde ut pos-
 set continere satis magnam copiam cibi, ac potus.
 Præterea, quoniã necesse erat hunc ventrem ad ex-
 pellendas feces comprimi. Medius uero ex vtriusq;
 est compositus, tribus de causis, quarum prior est,
 vt ad accipiendum, & emittendum aërem posset
 & dilatari, & comprimi, quod facere non posset, si
 totus esset osseus. Altera, ne muscoli caderent, &
 comprimerent cor, quod contingeret, si totus esset
 carneus. Tertia, quia melius defenditur cor, & pul-
 mo ab exterioribus, quàm si penitus ex carne con-
 staret. Oritur autem hoc loco dubitatio, cur natu-
 ra ventrem etiam inferiorem non fecerit ex ossi-
 bus, & carne cõpositum, cum præferim ijdem usus
 sequantur: cui respondet Galenus, nõ potuisse hoc
 fieri, Nam si inferior venter posset vel parum di-
 latari oporteret homines continuè cibum sumere
 cum non satis esset semel, aut bis comedere in die,
 In medio autem ventre nihil prohibet quominus
 continuè aërem attrahamus, Non tñ possums sæ-
 pius citrà noxiam edere: quinimo cõmodius esset
 & utilius de mente Galeni semel tantum in die
 comedere, quod si consuetudo bis comedendi uice-
 rit, partiendus est cibus, ita ut, nihilo tamen plus,
 edas, quàm si semel cibum sumeres. ratio autẽ, qua-
 re inferior sit iste venter, affertur à Galeno quar-
 to de

to de usu par .c.7. ga in quo ventre formatur vox debuit ille esse ori propinquior, a lioqui nō cōmodē vocem effingere posset, aut aërem attrahere, si qui inferior est venter esset medius. Præterea, per inferiorem ventrem excernuntur superflua, quod vt fieret commodius merito à natura inferiore loco est positus. His dictis, videndum nunc est quæ dicat Mundinus secundum mentem Galeni, vt inde ea falsa ostendamus, quæ ex sua adiecit sententia, Dicit igitur se primum initium sumpturum sectionis à ventre inferiori duabus de causis: prima, quia partes illæ foetidæ sunt, ideo illarum anatomia quæ primum est absolueda, vt abijciantur: atque hæc est Galeni sententia, quinto de anatomic. aggress. cap. 8. Altera est, quoniam cognitio nostra à posterioribus procedit, hæc vero posteriora natura cum sint, ideo etiam notiora: ex quo sequitur ut etiam faciliora sint cognita. Galenus tamen in quinto de anatom. aggress. inquit anatomiam musculo rum ventris esse difficilē, ut qui non commodè semel tantum pertractari possint. Declarans autem Mundinus firum huius ventris, duas adducit rationes, quibus dicit inferiori in loco positū fuisse hunc ventrem: prima est, quoniā membra continet ignobiliora, quem admodum in mundo quæ sunt ignobiliora obtinent locum infimum: Verum hæc ratio est absurda, nam homo, qui est igne nobilior, nihilominus in inferiori loco degit: posset tamen quis dicere cū de mundo loqui quō ad partem primariam, sed neque illud verum est, quod membra nobiliora locum obtineant altiore, nam ex Aristotelis sententia Cor est omnium membrorum no-

bilissimum, quod tamen inferius est positum quā cerebrum: pariter & pulmo est Hepate ignobilior eodemq; superior, Huius autem rei vera causa illa est, quam superius ex Galeno retulimus, quod scilicet oportuit partem illam, per quam aër attrahitur ad formandā vocem, esse ori propinquiorem, quod fieri nō potuisset, si venter iste inter os & partem illam se interposuisset. Quare autem venter iste non sit osseus tres superius attulimus rationes, ex Galeno septimo de usu part. 21. Mundinus autē hanc insuper addit causam, quod natura fecit hunc ventrem pelliculosum (ita enim ipse ait) ut possit tūmesceri in hydropisi. Verum falsum est: debuisset enim potius natura prohibere ne flatulentiae istae aut hydropises auerentur: quemadmodum natura fecit peritonium ne flatulentia in intestinis congregetur, ut declarabitur, quare nobis sufficiāt causae ex Galeno adductae.

MUNDINI.

Partes enim sunt duplices. scilicet intrinsecæ & extrinsecæ. Extrinsecarum quaedam sunt directæ, quaedam collaterales.

Directæ primo sunt quæ dicuntur correspondere ori stomachi, et est pars in qua sentitur os, siue cartilago epiglottalis, quæ alio nomine nominatur pomum granatum, de qua suo loco apparebit.

Secundo est pars stomachalis, quæ est supra umbilicum, vel distans ab umbilico per quatuor digitos.

Ter-

Tertio est pars umbilicalis, & est ubi est umbilicus, cum quo est alligatio factus in matrice cum venis matricis. Et propterea in intrinsecis apparet vena quedam quæ continuatur cum ipso, & pertransit per gibbum hepatis in cystim: ista tamen vena priuata est sanguine, quia frustrata est post partum a propria operatione, & propterea continue euanescit: & ideo minor apparet in senibus quam in iuuenibus, sicut etiam euanescit arteria quæ cum dicta vena venit ad umbilicum foetus. Et quando est in ventre foetus, descendit inferius, & peruenit ad arteriam ad horti iuxta spondyles renum & iliorum, ut infra dicitur: & quando excarnas myrach prope umbilicum hanc considera arteriam, quæ est ad modum nervi vel chordæ.

Quarto est pars quæ vocatur surmen infra umbilicum per quatuor digitos: & est pars in qua quedam venæ terminantur ad cutim per quas pueri existentes in matrice emittunt aquositates. Et ideo ut dicit Auice. tales venæ & talis pars notior est in non natis quam in perfectis: ut patet. 14. tertii ca. de causis asclicis: & ego hoc multotiens monstravi, quia in perfectis frustrantur ab hac operatione.

Quinto est pars quæ vocatur pecten in

qua existunt membra genitalia.

Partes vero laterales sunt duę hypochōdria & ilia. Et est hypochōdrium dextrum & sinistrū: dextrum vbi locatum est hepar: & hypochōdrium sinistrum vbi locatum est splen & ilium dextrum & sinistrum similiter sub hypochondriis.

CVRTII.

Ventrem hunc diuidens inquit quasdam partes interiores esse, alias exteriores, atq; has rursus paritur in directas, & quas collaterales appellat, directæ sunt, quæ ori stomachi correspondent, ex his vna illa est cartilago rotunda, quę græcis dicitur χόνδρος. Galenus χόνδρον ξιφοειδῆ appellat, quia glandij formam refert: recentiores nostri malum granatum vocant, propterea quod duritie similis est cortici mali granati, de qua suo loco dicemus. Altera est, quæ prope vmbilicum accedit, Stomachalem nominant. Tertiam vmbilicalem appellat. Quarta pars est, inquit Mundinus, quę sumen dicitur, per quam infantes, dum adhuc in vtero sunt, meiunt. Postremo est Pecten, vbi genitalia membra continentur, tã in viris quàm mulieribus. Laterales vero bifariam diuiduntur, in eam scilicet partem quę super vmbilico est, appellaturq; Hypochōdrium, & in eam quę est inferior, & dicitur Græcis λαγών ut à Galeno introd. med. cap. vltimo, & Aristo. de Hystor. anim. ca. 13. eo quod flacida est, Latinis Iliæ appellantur, partes vero quę sunt propè pudenda Inguina dicuntur, Græci βυβωνίαι nominant, quo nomine etiam earum partium apostemata vocantur.

Mun-

dinus vero ijs enumerandis decipitur, nam cum dicit in vmbilico venam esse & arteriam, illā q̄ p̄ conuexum Hepatis ad cystim perueniat Galeno contradicit, qui in decimoquinto lib. de usu par. ca. 4. in sima parte Hepatis non in gibba, eā collocat quoniam, vas cholere ibi ait esse, meliusque erat sanguinem prius purgari, quā per totum corpus diffunderetur. neque vna tantum vena est, sed duę, quę cū procedant, una à dextris, altera à sinistris. iunguntur ad eam partem, quę dicta est: totidem etiam sunt arterię quę non ad cor terminantur, sed ad magnam arteriam. Præterea errat Mundinus cum ait infantes in vtero per sumē vrinam emitte re, siquidem Galenus decimoquinto, de usu par. ca. 5. inquit quatuor esse per vmbilicum vasa, duas scilicet arterias, & venas totidem, quarum in medio est ζέρον, meatus quidam, qui ex vesicę fundo vrinā exportat: cū longè melius sit per hunc, quā per pudendum, infantem vrinā emitte re: Sed illud forte Mundinum in hunc errorem traxit, quod Auic. decima quarta Tertij, cap. 5. vbi de ascite loquitur, inquit, infantes emittunt vrinam per sumen, cū sunt nati, prius quam ligetur sumen & incidatur: ex quibus verbis manifestè patet Auic. per sumen intelligere vmbilicum: quod Mundinus nō aduertit. illa præterea vrina seruatur in panniculo usque ad pariendi tempus, adiuuat enim plurimum partum. Aristoteles autem primo de Historia animal. cap. 13. appellat Hypochōdrium partem illā, quę Mandino dicitur Stomachalis, quare medici cartilaginem illam χέντρον vocant, pars autem stomachi, quę sub ea est, Hypochōdrium dici debet, quę à

hypocōd
ium

Galeno dicitur Epigastrium, quæ Theodoro transfertur cholago. Pars vero quæ infra vmbilicū est Abdomen dicitur. Hæc noscē plurimum confert, vt cognoscamus quomodo fieri debeant vñctiōnes in doloribus, Nam in doloribus matricis perungi debet fumen sub pectine: in ijs uero, qui circa intestina oriuntur, vngenda sunt ilia: cū affectio est in Hepate solemus dextrum hypochōdrium in vngere, cū verò in Splene, dextrum. In passionibus autem oris stomachi volūnt Munjinus, & Herculanus fieri vñctionem in spondyle, quoniam stomachus alligatur dorso, pro quibus facere videtur Galeni auctoritas. decimorenio Methodi, vbi dicit quod stomacho læso applicanda sunt dorso cataplasmata, pro qua re illud sciendum est, illud à Græcis appellari *σπυροχόμ* quod iter est ab ore ad stomachū quasi *ἔχωμ στέμ*, hoc est, habens os, Arabes vocant Meri, Latini Gulam, quandoq; ramentum proter vsus os ventris stomachus dicitur, quem verò nos stomachū dicimus Græci *γαστήρ* vocāt. Galenus igitur ait quòd affecto stomacho cataplasmata in dorso sunt applicanda, non anteriùs, sicut cū os ventris flegminat: ergo vult Galenus, inungendam esse posteriorem cū os ventris flegminat (ita enim legitur in linacri translatione) Ego verò oppositum sentire Galenum crediderim, hocq; modo exponendum esse censeo, vt dicamus. Non anteriùs applicanda sunt cataplasmata, quod fit vbi os ventris flegminat: quod que hæc melior sit sententia, ostendo, quoniam Galen. distinguit id quod propriè stomachus dicitur, & quod abusiue: si verò voluisset in vtriusque affectione eodem modo appli

vñctiōnes pro
vñctiōnis locis delin
nr.

intra sicut legi
libet

applicāda esse cataplasmata posterius, quid oportuerat discrimen afferre inter stomachum propriè et impropriè: Nemini quidem dubium est, quin in affectionibus stomachi illius, quem Arabes appellāt Meri, posterius, in dorso scilicet applicāda sint cataplasmata, non antè, tunc enim oporteret ea poni supra pectus, quam rem multa sequerentur incommoda. cum verò os stomachi laborat, inungitur pars anterior, quia facilius inunctio munus suum perficit, nulla enim ibi ossa sunt quæ impediunt, vt in posteriori parte. Igitur affecto ore stomachi anteriores partes vngendæ sunt.

De anatomia myrach. i. Epigastrii. uel

His visus partes magis intrinsecas discernere: ipsarum enim quædam sunt continentæ: quædam vero continentes. Continentes communi nomine vocantur myrach. Myrach autem componitur ex quinque partibus, scilicet cuti pinguedine, panniculo carnosio, musculis, & chordis eorū, & siphac. Cum rasorio igitur incidere protraheudo a scuto oris stomachi directè vsque ad ossa pectinis leuiter incidendo. Cutim postea iuxta umbilicum secundum latitudinem incidas protraheudo a dextris ad sinistras vsq; dorsum.

Postea excoria & habebis primo cutim quæ est duplex: quædam est sicut corium: scilicet illa quæ est exterius: & si deperditur potest restaurari: alia est cutis quæ dicitur vera

quæ

quod opium
trium m'cu
Lond' hic om
vno on' n'
temporis m'cu
c' f' f' m' m'

Ab' o'minis

Myrach in
ilio non sp
g' m' m'
addo cuti
ula pon
de cuti.

quæ est alba immediate sequens corium & est spermatica: ideo si deperdatur nõ potest restaurari. Sed in mulieribus caue a vena quæ in eis a matrice ad mamillas ascēdit per myrach transiens vt infra dicetur.

Post autem apparebit statim pinguedo maior tamen in porcho quæ in homine. postea locatus est panniculus carnosus qui non est nervosus vt alij, neque est carnosus vt musculus: sed est permixtus ex carne nervo & panniculo post eum sunt chordæ & musculi.

CVRTII.

Diximus de partibus exterioribus ventris inferioris, quare autem Mundinus de inguinibus non meminerit hoc loco, hæc puto esse rationem, quod Aristot. de histor. animal. libro primo, cap. 14. inquit, Inguen partem esse communem femoris, & cruri ventris: quemadmodum costæ, brachij, & humeri communis est ala, qua de causa scriptores inter partes inferioris ventris inguina non recensent: nam etiam inguinum apostemata potius in coxa sunt, quàm in ventre, Nunc igitur partes interiores declarans inquit, quasdam earum contentas esse, nonnullas continentes vocari, atque has quidem inter partes quinque diuidi, quarum prior est cutis, altera pinguedo, tertia panniculus carnosus, quarta musculi, reliqua omentum: qua in partitione fallitur Mundinus, quod nõ cognouit quæ nam esset illa substantia quam carnosum panniculum appellat, nam nil aliud quàm chordæ musculorum quorundam sunt

hi

*Nota qd adeps
differt a
ping. d. m. p.
p. situ. q.
adeps est
mitans
ulorq. me
inibianis
ed. m. a. l.
pinguedo
tunc h. m. p.
cut. 20.
adeps con
suis frige
ni ut pater
le ob. o.
inguedo
nro neq.
o. c. i. s. e. n. t. a. f. i. n. g. u. e. n. i. s. q. d. u. e. n. t. i. a. p. a. c. e.
adeps in his animalibus est q. d. d. u. l. t. e. n. s. p. o. n. e.
r. i. s. s. i. s. n. e. d. i. g. n. i. s. .*

hi panniculi carnosī, quod posterioriūs ostēdam: quare, reposita ista inter musculos reliquæ partes erunt quatuor. Cutem igitur inquit duplicem esse, vna corium dicitur, quæ deperdita instaurari potest, altera alba spermatica, quæ amissa non item instauratur. Verum hac in re magna est difficultas, cū nonnulli duplicem tantū esse cutem velint, alij in plures etiā partes diuidant. Mundinus igitur ipse duplicem vult esse cutem, cuius sententię fautor esse videtur Auicē. tertiā quarti, cap. de Erysipela. Qui verò tres cutes ponunt hoc vtuntur fundamento, quòd Galen. sexto Methodi med. cap. 5. dicit, occurrunt nobis duæ cutes: in secundo De acci denti & morbo cap. 6. dicit cutem eam, quę nos circundat, nullam habere operationem ergo non sentit, quare sequitur tres esse. Præterea decimo quarto Methodi med. cap. 17. quo loco de Herpete loquitur, dicit Herpetem prouenire à materia quę cutim ipsam, ad summam vsq; cuticulam pertranserat, quā ἐπιδερμὶς & græci vocāt, ergo intus est membrana densior, quæ à materia illa, propterea quòd ab ipsa remoratur, sola eroditur. Ego autem credo cutim illam priorem esse corium, quæ non possit, nisi cum exulceratione, à membrana diuelli, Sanè illud verum est dari tres substantias cutis, ac primò membranam, quæ est sub cute, quam non appellamus cutim, Galen. autem membranam, quia tegit intra totam cutim: propterea Sexto libro Methodi med. cap. 4. dicit esse cutim quæ in membranam terminatur, quare membrana eiusdem est substantiæ, ac cutis: Quapropter tertio De anatom. ag gress. cū docet secare cutim in brachijs, inquit,

Opor

Oportet vt coneris auellere cutim à membrana.
 huius autē cutis exterior pars, quę durior est, Gre-
 cis ἐμδρμῆς appellatur. Quare si ἢ qui dicūt triplē
 cem esse cutim, intelligunt tres dari cutis substāti-
 as distinctas, vera dicūt: Si verò tres cutes, falluntur.
 Deinceps aduertenda est cutis differentiā, nam in
 nobis quatuor sunt eius differentiæ, quarum vna
 poni potest ex Galeni dictis in secūdo de usu par-
 cap. 6. Et tercio, cap. 11. primò enim est cutis in vo-
 la manus, & pedis, quæ non ita versatilis, & plica-
 bilis est, ut in alijs partibus, caretq; pilis, neque ita
 cōmodè excoriatur. Deinde cutis quæ in frōte est
 voluntario motu mouetur, quod non item fit. Præ-
 terea cutis labiorum commixta est etiam carne.
 Est demum cutis quę totum corpus ambit quæ fa-
 cile diripi potest: atque hæ sunt quatuor cutis discri-
 mina. Est etiam alia cutis ea quæ in maxillis est.
 Declarat autem Galen. quare ita sit cutis volę ma-
 nus, inquit quę, quia illius munus est apprehēdere,
 idē debuit magis interius sentire, quàm exterius.
 vtque melius sentire posset caruit pilis. Quod si pli-
 cabilis esset, plurimum detrimenti caperet manus
 ad obeundum munus suum. atque idē in musculo
 brachij est quædam chorda, quam pāniculum vo-
 cant, quę lata est, proceditque sub cutem interio-
 rem volę, huic chordæ adnascitur cutis, hinc pro-
 hibet ne pili nascantur, ne cutis sit plicabilis, efficit
 quę vt manus melius sentiat. Idem de cute euenit
 quæ est sub vola pedis, licet illa non adeo perfe-
 ctum habeat sensum. Quod vero cutis, quæ in fron-
 te est usque ad genas, sponte moueatur Galenus ra-
 tionem reddit vndecimo de vsu part. cap. 14. cum
 dicit

dicit naturam ita instituisse vt moueretur, quoni-
 am aliquando oportebat multum oculos aperire,
 vt plura videremus, rursusque eosdem claudere, ne
 aliquid eos lædat. Verum quoniam sine musculis
 non fit motus è loco, idcirco natura fecit, vt muscu-
 lus sit cuti illi adnatus adeo, vt nõ possit inde auel-
 li, quæ causa est etiam vt vehementi motu mouea-
 tur cutis ea. Illa vero quæ est in labijs, non est
 chordæ, & musculo adnata, vt in superioribus, sed
 ita inter se commissa sunt & confusa, musculus, ca-
 ro, chorda, vt vllum discrimen vix internoscas;
 quod ea de causa factum est, quoniam varijs mo-
 dis moueri labra oportet. In reliquis autem parti-
 bus cutis non est carni, aut chordæ adnata: ideo po-
 test faciliè auelli. Est præterea quintus modus cuti-
 tis, quæ est in maxillis, quæ à totius corporis cute
 nõ differt, neque secum habet musculum aut chor-
 dam adnatam. Sed dicet quispiam, quomodo mo-
 uetur? Respondet Gal. quod ista non differt à cuti
 totius: quod autem moueatur ea est causa, quoniã
 iuncta est frõris, & labiorum cuti: quare ad earum
 motum & ipsa mouetur, nõ quod ipsa motum pro-
 prium habeat. Ex quibus omnibus manifestum ef-
 se censeo, quatuor in nobis esse perspicuas cutis
 differētias. Post cutim autem ponit Mundinus pin-
 guedinem, admonet que eum, qui secat, ne inci-
 dat venas matricis: De pinguedine autem nihil
 præterea addit. Igitur illud aduertendum est,
 quod quædam pinguedo faciliè liquefcit, diffi-
 cilè autem coagulatur: quædam contra, faciliè
 coagulatur, difficilè vero liquefcit. Nam Suis
 pinguedo faciliè liquatur, non ita tamen faciliè
 con-

concrefcit, contra facit pinguedo houis. Latini qui-
 dam, cūm pinguedinem humidiorē volunt ſigni-
 ficare, vtuntur pinguedinis nomine, cūm verò ſic-
 ciorē, adipem appellant: Theodorus tamē, humi-
 dorem appellat adipem, quæ autem ſiccior eſt ſe-
 pum nominat. Verūm Galen. inquit, quòd qui in
 huiusmodi nominibus obſeruādis curioſiores ſunt
 ipſi nomina confundunt. atque idè cenſeo nomi-
 nibus vtendum eſſe vt libet, modò rei proprietās,
 & ordo conſeruetur, quod autem ad pinguedinis
 vtilitatem ſpectat. tunc loquemur, cū etiam de cu-
 tis vſu verba faciemus. Cutis autem vtilitas eſt,
 vt corpus ab exterioribus, tuteur, atq; operiat: an
 verò etiam ſentiat dubium eſt. Ego autem dico,
 quòd & ſi cutis operationem agentem non habe-
 at, operit tamen, vnde ſequitur vt etiam ſentiat: Nā
 & ſi Ariſto. nolit cutim ſentire, quia caro eſt orga-
 num tactus, Galenus tamē vult partes eas, ad quas
 demandantur nerui ſentire. de hac autem re alibi
 diximus. De pinguedine autē, eiūſque complexio-
 ne agit Ariſtoteles ſecundo De partib. animal. ca.
 6. Et tertio, cap. 9. Galen. præterea in libro De ele-
 mētis ait pinguedinem eſſe calidam & humidam:
 contrarium tamen aſſerit in libro De temperamē-
 tis primo, cap. vltimo, et eiūſdē libro ſecundo, cap.
 3. vbi dicit pinguedinem frigidam eſſe, idem ſentit
 Auic. prima cantic. Aueroëſ at ſibi ipſi eſſe vide-
 tur contrarius, Nam ſecūdo collectorum, capi. 2. ait
 pinguedinem eſſe frigidam: Quinto autem, cap. 26.
 & quarto Meteor. vult pinguiā eſſe aërea, declinā-
 riā que ad caliditatem. Ego has auctoritates hoc
 modo conciliare conſueui, ex Aueroë quinto col-
 lect.

le ct. cap. 24. vbi causam inquiri, quare vnguino-
 sa frigore coagulatur: dicit q̄ aëreas partes in aque-
 as conuerti, ideo que tunc possunt à frigido coagu-
 lari: pinguedo uero dissoluta est calidæ naturæ,
 cum autem concreta est tunc fit frigida, quoniam
 partes ille aëreg in aqueas, ut dictum est, vertuntur.
 Pinguedinem sequitur p̄niculus, quem carnosum
 vocat: in quo deceptus est primo Mundinus dum
 hunc panniculum ponit, qui non est: deinde quoni-
 am cordas musculorum pro p̄niculo accepit, quē
 modum reprobat Gale. libro secundo de anatom.
 aggress. cap. 11. quo in loco damnat opinionem eo-
 rum, qui dicunt vngues constare ex carne, osse, cu-
 te, et neruo, quia & si his omnibus vngues conuati
 sint, tamen eorum substantia non est ex his compo-
 sita, nam ex propria materia sunt à principio gene-
 rationis facti. Quòd si illud verum esset hoc seque-
 retur, quòd nerui ex cerebro, & ligamentis consta-
 rent, quod tamen falsum est, illud præterea oportet
 ret istos fateri crystallū, ex aqua & lapide factum
 esse, quoniam mediam quandam naturā inter hæc
 vtraque seruat, cum tamē manifestum sit ex aqua
 concreta fieri. quem igitur ille panniculum vocat
 est ex propria substantia compositus, neque tamē
 est panniculum, sed sunt chordæ musculorum com-
 positæ ex neruis, & ligamentis. Quòd autem hoc
 verū sit videre est Gal. libro sexto Methodi med.
 ca. 4. vbi ait, Cutis extrinsecus omnibus ante stat.
 Deinde sunt chordæ musculorum, postea muscoli
 recti, Tum peritonium: pinguedo enim nō est sub-
 cute necessaria, quia in aliquibus est, in alijs mini-
 mē, & hoc est in medio ventris. In lateribus autē,
 primo

primo occurrit cutis, deinde caro musculi descendentis, postea caro musculi ascendentis, deinceps musculus qui in latum tendit, Tum peritonium.

nota qd Gal. magis indicauit panniculu carnosu seu mēbranam.
 Ex quibus patet Galenum verba nunquam fecisse de hoc carnosio panniculo, sed de chordis superstantibus rectos musculos.

MVNDINI.

Musculi sunt octo, vt dicit Gale. 6. de iuuamē. memb. ca. vltimo. nam duo sunt longitudinales quorum fila protendunt secundum lōgum a clipeo oris stomachi vsque ad ossa pectinis. ideo vocati sunt longitudinales. & isti non habent magnas chordas nisi ligamentales. post istos sunt duo transuersales superiores. vnus a d'xtris alter a sinistris, & abo oriūtur a superioribus iuxta costas, & desinunt in chordas circa ossa pectinis, sic qd dextra chorda tēdit inferius ad sinistrum, & sinistra ad dextrum; & per oppositū sunt procedentes inferiores ad superiora; quorū ortus est ab ossibus pectinis, & anche, & desinunt in chordas cum ad locum, vbi finiuntur costę, veniunt: ita qd chorde eorum cruciantur adinuicem ad modum istius. X.

Vltimo post istos sunt latitudinales: quorum fila protendunt secundum latum, vnus dexter, & alter sinister. & ortus & apparentia eorū est magis iuxta dorsum versus sur-

sum

sum: & isti cum longitudinalibus veniunt in
tersecantes se adinuicem ad angulos rectos.
& hic est numerus, quantitas, positio, substā
tia, figura, colligantia, & continuitas.

CVRTII,

Musculus est quedam caro composita ex villis
musculi autem sunt separati, quia non eodem mo-
do omnes procedunt. in fine musculorum chorda
oritur secundum quam alligatur: illa verò chorda
quandoque panniculo similis est, quandoque est
tanquam rotunda chorda, quæ ex nervis, & liga-
mentis constat: datur autem musculi habentes vil-
los in longum protensos, alios in transuersum, qui
se ipsos intersecantes angulos faciunt aliquando re-
ctos, nonnunquam obrufos, aut acutos: atque his mo-
dis possunt musculi animo concipi. Igitur in ven-
tre musculus alius est rectus: alius qui hunc attingens
angulos rectos generat, quem Mundinus latitudi-
nalem vocat, Galenus transuersum nominat.
libro quinto De vsu part. cap. 14. qui verò obli-
que procedunt Mundinus appellat transuersales,
secutus Auicenam, Galeno autem obliqui dicitur:
atque isti obliquos faciunt angulos. Mundinus
igitur inquit quod sunt musculi longi, qui à grana-
to incipiunt, tenduntque usque ad pudenda. De ijs lo-
quitur Galen. libro quinto De anatom. aggress.
Et quinto De locis affectis: cap. 6. Et sexto Metho-
di med. cap. 4. Et quinto De vsu part. cap. 14. aper-
te loquitur de situ horum musculorum, dicit que
hos musculos non habere annexas chordas, sed
per carnem iungi ossibus pectinis, qua de causa à
nostris carnosii dicuntur, ij vsque ad vmbilicum

*musculi dicitur
sunt per hunc
hinc dicitur à
tunc, sicut
et alij appel-
lantur (sicut
similitudini
in piscis), vel
hinc dicitur. propri-
similitudine
qui hinc dicitur
alij dicitur
sciant no-
men. nam
alij musculi
hinc dicitur
parum
ex hinc dicitur
nam dicitur
sunt latius
no dicitur figu-
ram dicitur*

sunt separati, infra vmbilicum verò sunt vniti ad-
 eò vt nisi sectione diuidi possint, Verùm isti non
 sunt primi qui exterius sint. Sunt præterea inquit
 Mundin. musculi qui transfuersales dicuntur id est ob-
 liqui, qui descendunt obliquè usq; ad ossa pectinis
 sic quòd chorda dextri tendit inferius ad sinistrum
 & sinistri ad Dextrum. Hoc loco peccat Mundi-
 nus, primò enim dixit hos musculos habere vnã
 tantum chordam, qua alligentur ossibus pectinis,
 cùm aliam etiam habeant chordã latam, qua ope-
 riuntur musculi recti, vñ in parte mediã vëtris sunt
 tm̄ duo musculi recti. In lateribus verò sunt mus-
 culi qui à superiori parte in inferiorem descendãt,
 cùm que quispiam horũ cum sua carne tangit mus-
 culum rectum, est chorda lata quæ rectum illum
 operiat: ita quòd supra musculum rectum est chor-
 da musculi obliquè descendētis. Est præterea alius
 musculus, qui oritur ab osse Ilis, non pectinis, vt in-
 quit Mundinus, tenditque in superiorem partem ad
 pectus, s. & interfecat se cum descendente, pariterq;
 chordam supra rectum musculum emittit, quæ iun-
 gitur cum chorda musculi obliquè descendētis:
 Hæ corde iunctę sunt quas Mundinus panniculum
 carnosum vocat. Primus itaque musculus est qui
 descendit, mittit que chordam in musculum rectũ.
 Secundus ascendit, qui & ipse mittit chordam su-
 pra rectum musculum. Sub ijs supra peritoniũ est
 musculus trãsuersus, qui tangit rectum musculum
 efficitq; rectos angulos. Mundinus autem hac in
 parte multis modis errat, primò quia musculi non
 ligantur cum chordis, aut costis, aut osse pectinis,
 Sed cum substantia sua ligantur, Peccauit etiam
 quo

quoniam credidit quòd musculus descēdens à dextris mittat chordam ad sinistrum, & contra; Galenus enim quinto De vsu partium libro, ca. 14. musculos ait nunquam à dextro in sinistrum transire, aut à sinistro in dextrū: verūm dexter in dextra, & sinister in sinistra parte remanet. Illud præterea falsum est, quòd interfecent se chordæ in formam literæ x. oporteret enim vt se in medio musculorum interfecarent, fieri enim non potest vt chordæ eorum se iuxta finem interfecent in formam literæ x. sed facerent aliam figuram. Ille verò musculus qui ascendit ex vna parte & ex alia, non habet chordam, vt etiam Galenus asserit, quia cum carne sua iungitur costis mendosis. Quod autem ad situm attinet, Primus musculus est qui descendit, ortum que trahit à costis, quoniam verò multūm latus est, regit etiam ilia, vnāque cum chorda transitum facit ad vsque ossa pectinis, cum qua eo in loco arctè connectitur; quòd si fortè chorda remittitur, tunc fit hernia, cūm scilicet peritonio cedente, omentum, aut intestinum dilabitur. Est deinde alter musculus ascendens, qui incipiens ab osse Ilijs transit ad costas mendosas. Deinceps sunt musculi recti descendentes, qui teguntur ab iliorum chordis. Præterea sunt musculi transuersi sub obliquis qui chordas suas ad musculos rectos emittunt, ille que sunt peritonio adnatæ: ñ autem musculi ab ossibus vnum ortum trahunt, suntq; in parte ea, que supra vmbilicum est, iunctæ cum peritonio, descendentes verò infra vmbilicum non cum peritonio, sed chordis suis iunguntur: idè secundūm Galen. totum ventrem obtegunt,

Iuuamentum eorum est duplex, scilicet commune, & proprium. Commune est duplex, scilicet principale, & secundarium. Principale est, vt constituentes substantiam ipsius myrach membra intrinseca tueantur a nocumentis extrinsecis, & caliditas eorum reuerberetur ad intra. Secundarium iuuamentum est vt adiuuent ad expulsionem eorum quæ à superioribus expelluntur: & vt ad expulsionem foetus, et secū cum myrach etiam adiuuent: vt dicit Galen. in eodem. 6.

Iuuamentum speciale est quia musculi longitudoinales sunt facti ad attrahendum principaliter. Secundario ad expellendum. & quia hæc operatio in intestinis maxime requiritur: ideo isti musculi fuerunt magni: expulsionem autem operantur per contractionem villorum suorum, quibus contractis comprimunt membra quæ continent: & per consequens expellunt quæ in eis continentur. Item hoc faciunt gratia diaphragmatis, cū quo continentur, quod descendens ad partem posteriorem dorsi causa fit, quare intestina, & membra quæ continentur sint quasi inter duas manus: & ideo, quando isti musculi contractantur, comprimuntur diaphragma sic quæ illa membra exprimunt quæ in eis continentur, sicut

tut aliqua res contenta inter duas manus expellitur per compressionem manuum adinvicem: quod latius infra declarabitur in anatomia diaphragmatis.

Musculi vero longitudinales sunt facti ad expellendum principaliter: & propter hoc maxime, & immediatius approximantur in testinis: & quia expulsionem faciunt per compressionē partis, a qua debet fieri expulsio. Et expulsio debet fieri a superioribus ad inferiora: Hinc est quod isti musculi magis fuerunt positi superius, quam inferius.

Transversales vero fuerunt positi & ad retinendum. Retentio autem fit per villos transversales: ut apparet tertio de virtutibus naturalibus: & quia retentionem naturam oportebat facere, ne superfluitates transcenderent superius ad locum superiorem unde veniunt: & ne cito descenderent sed contineretur, ut totum iuvativum exsugeretur: ideo non fuerunt tantum duo transversales superiores, sed & inferiores duo. Sed quia magis requiritur retentione ne regrediantur superius, quam quod descendant inferius: ideo maiores fuerunt transversales superiores, quam inferiores. Et etiam ad hoc facit diaphragma ut postea dicetur.

His sic dictis videamus quem nobis præbeant
 nsum: sed prius nõ ab re fuerit exponere, cur octo
 tantum musculos in ventre natura instituit, Gale-
 nus lib. quinto De vsu part. cap. 14. probat naturã,
 si plures fecisset, non rectè facere. Si enim, inquit se-
 cundum villorum positionem organorum actio-
 nes fiunt, quatuor verò sunt in vniuersum omnium
 villorum positiones recta, transuersa, & obliqua
 duplex, manifestum est primo numero ex quatuor
 constante, omnem villorum positionem compre-
 hendi. Cum verò corpus nostrum geminum sit, dex-
 tris. s. & sinistris, & æquale exactè, positis in singu-
 las partes quatuor, vniuersi octo sunt æquales mul-
 titudine, magnitudine, villorum positione, adeo vt
 nihil abüderet aut desit. Quòd autem pauciores esse
 non potuerint hinc etiam declaratur: hoc posito,
 quod musculorum munus sit vt se contrahant ad
 expellenda superflua, quæ in intestinis sunt. Cum
 igitur ex aliqua re concaua aliquid erit exprimen-
 dum, necessarium fuerit ex omni parte æqualiter
 exprimere, alioqui non rectè exprimeret. si ergo
 essent tantum musculi anteriores, cum se contrahe-
 rent, fæces ad ilia eijcerentur: si vero obliqui tantum,
 fæces ad anteriora compellerentur: quare vt æqua-
 liter exprimantur excrementa, natura instituit hos
 octo musculos. Nunc redeamus ad Mūdinum quo
 in loco proponit vtilitates horum musculorum, di-
 citque communem vtilitatem esse, quod partes in-
 teriores contineant: Alia præterea est, quam refert
 Gale. quinto De vsu part. ca. 15. quod facti sunt ad
 vocem formandam, & ad respirationem, vghemen-
 ti enim aërem impellunt motu, motus autem mus-
 culorum

respiratō
 educit
 musculi.

eulorum comprimit diaphragma. Est alius quoque
 usus, quod à se compressa intestina faeces cogunt
 e mittere, conferunt quoque ad foetum emittendum.
 Admonet nos Galen. naturam, quando quippiam
 ad aliquam utilitatem instituit, providere ne quid
 incommodi sequatur: quoniam igitur compressa
 à musculis intestina emitterent fortè excrementa
 ex superiori parte: idcirco natura instituit diaphra
 gma, quod incipit ab ore stomachi tenditque deor
 sum obliquè, quod si diaphragma cederet non ex
 pelli possent fæces: ut igitur non cedat, instituti sunt
 musculi pectoris, quibus pectus prematur, atque ea
 causa est, qua coguntur anhelitum retinere qui fæ
 ces volunt excernere, alioqui non possent, quoniã
 oportet, ut aër diaphragma tensum retineat, clau
 datur que epiglottidis orificium arctè, resistatque
 compressioni musculorum, pectoris, & ventris. Ta
 met si princeps operatio diaphragmatis sit propter
 respirationem, & vocem, atque hi quidem sunt cõ
 munes vsus: Proprii autem, inquit Mundinus, sunt
 quod attrahant, & expellant: at transversi quidem
 expellunt, obliqui vero retinent, quare etiam natu
 ra utitur villis rectis ad attrahendum (vnde gula
 habet villos rectos) transversis ad expellendum, ob
 liquis ad retinendum: admonui autem superius ne
 confundas nomina, nam quos Mundinus muscu
 los longos seu longitudinales vocat, Galeno dicuntur
 recti: latos, transversos nominat, & qui ab ipso
 dicuntur transversales Galenus appellat obliquos.
 Mundinus errat in suo potissimo fundamento, quia
 omnes hi musculi, qui supra ventrem sunt, ad, expel
 lendum sunt instituti, quod ex ratione superius ad
 ducta

musculorum
 usus. ut
 e legem

pp ad dia
 phragma
 na instituit

a
 p. proprio
 mus. hrag
 m. h. s.

Mundinum
 Curiosus xp
 h. d. e.

ducta patet: natura enim non potuit facere plures, paucioresue, quoniam ex omni parte oportet eos æqualiter comprimere. Hoc etiam ex Galeni sententia declaro. In libro De usu part. quinto ca. 14. diuidit membra nutritionis in tres partes. Quædam enim sunt quæ suscipiunt intra se nutrimentum, illud que digerunt, vt stomachus, Hepar, venæ: non nulla ad excernendas superfluitates instituta sunt, vt folliculus fellis trahit bilim, Splen melancholiam, Renes vrinam. Alia prohibent ne nisi intempore exeant excrementa: aut cum tempus adest faciunt vt emittantur. Superioris generis est musculus quidam in ano, qui intestinum astringit, efficit que ne feces nisi tempore emittantur. similiter in vesicę orificio est musculus, qui curat ne vrina intempore exeat: huius autem generis eorum scilicet quę faciunt ne superflua exitum morētur, cum adest tempus, sunt octo illi musculi ventris inferioris. Vult igitur Galen. quod omnes musculi sint ad retinendum, non ad apprehendendum: vnde ea quę sunt in intestinis non retinentur nisi aut per reuolutionem intestinorum, aut per musculum ani. Hoc præterea clariùs ostendi potest, nam si natura instituisset villos, vt intestina attraherent, nõne cõmodiùs id fieret, si villi in intestinis essent? Sed inq. Gal. qnto De usu part. ca. 11. intestina debent solũ expellere, & iõ villos habent transuersos. Stomachus aut omnia villorũ gña habet, ad expellendũ attrahendũ, & retinendũ. Intestinis vero non insunt hæc virtutes, ppter ea neq. possum? imaginari istos musculos facere ad retinendũ, quoniã secundũ villos operant. Nam si transuersus ille musculus de

beat retinēdi vim habere op^o ē vt cōprimat, sed & si cōprimat, nō pōt tñ retinere, q̄a ex p̄ssione illa nō claudis̄ orificiū, cū claudat̄ p̄ musculū recti icestini. Quare satis cōstat hos oēs musculōs eē ad expellēdū. sūt q̄ ea de cā varij, ut ēq̄licer expellē possint.

De anatomia siphac. *peritonij*

ELeuatis autem & abscissis musculis istis apparet siphac: & melius ē vt in vna parte referuētur isti musculi, p̄pter illud quod post ea oportet videre: de extractione aquæ ab hydropico. Istud siphac est panniculus subtilissimus, & valde durus, & iste fuit factus, vt prohiberet ne musculi comprimerent mēbra naturalia, & ea contineret: & p̄pter hoc fuit neruosus & durus vt possit dilatari & constringi, q̄n illa dilatantur: & fuit subtilis ne ea aggrauaret: & fuit durus ne facilius rūperetur. nā ex eius fractura accidit passio quæ dicitur ruptura seu crepatura: in tumescit, n. hoc myrach cū rūp̄it hic siphac.

Sunt etiam eius alia duo iuuamenta quæ Auic. ponit in libro de animal. cap. de anatomia stomachi. s. vt per contractionē eius versus dorsum cum quo alligatur expellat illud, q̄ in stomacho, & in intestinis, & in matrice cōtinetur: & hoc facit simul cū diaphragmate, cū quo cōtinuat̄ vt postea patebit.

Aliud iuuamētum est, vt alliget intestina dorso

*Siphac
peritonij
in vltimo
quod totum
est in vltimo
est in vltimo
est in vltimo*

dorso & vt ab ipso vniuersaliter orientur
pānculi omnium aliorum membrorum in
eo contentorum.

Alia vtilitas secundum Galen. quinto de
iuuamē. men. cap. 2. est q̄ prohibet intesti-
na a ruptura, quando inflatur a ventositate.

siphaci - epiga-
strum con-
trahentia aut
ing. pān. iuuamē
uicibus, et ma-
son. loq. ligamēti, et peritonio.
et parit. epiga-
Et ex his apparet quę sit substantia ipsius
siphac, & cōplexio eius: apparet quę sit eius
positio, quantitas, & numerus partium, ap-
paret quę sint iuuamenta ipsius.

CVRTII.

Peritonij
definitio
Peritonij sequitur anatomia: est autem peritonij
um panniculus tenuissimus, qui statim sub muscu-
lis reperitur, cui musculus trāsuersus iungitur. Hūc
vocant Arabes siphac, nos membranam dicimus,
Græci περιτόνιον. i. circum tensum, nam περι signi-
ficat circum, & τενύω extendo, quia circumtēditur
membris ventris imi: vel dicitur à περι & τόνω, q̄
firmo, & roboro significat, eò quòd firmet mēbra:
Latini vero panniculum sub musculis dicunt quia
propriam nōn habent appellationem. Huius sub-
stantiam posterius dicemus, nunc vtilitates recen-
seamus: nam Mundinus, cum eas cōnumerat, duas
non intellexit, Sunt igitur secundum Galenum hu-
ius panniculi vsus quinque, quorum vnum rursus
in duas partes diuidentes, sex erunt in vniuersum
peritonij vsus: Primus est, quòd intestina obtegat,
sed hunc parui momenti esse ducit Gale. satis enim
sunt à musculis operta, Alter, quòd intestina à mus-
culis diuidit, ne illa ab his premantur: hunc vero
vsus

usum non bene intellexit Mundinus: non enim hoc verum est, siquidem Galenus inquit, quod diuidendo intestina à musculis facit ne ea recipiantur inter musculos, atq; ita doleant, ac pariantur, quoniã nō tā desè inter se musculi iūcti sunt vt nō aliquid possit inter ipsos penetrare, ut ijs contingit quibus peritonium est vulneratum: atque hæc est vtilitas, non illa, quòd conferat ne musculi premant intestina, nam cum sit tenuis substantiæ illud non posse perferre. Tertia vtilitas, quæ à Galeno & Auice. refertur est, quod hic panniculus cum diaphragmate concurrat ad excernenda superflua quæ sunt in intestinis, Alia autem, quod tuetur membra à disruptione, & flatulètia, inquit enim Mūdinus quod prohibet intestina à rupiura quando inflantur à ventositate. Verum hoc contradicit dictis superioribus ab ipso, cum dicebat naturã ideo ventrem imū sine ossib⁹ fecisse, vt recipere posset in hydrope & aquosum humorem & flatulentiam, neque rectè Galen. intellexit, qui dicit quod intestina & stomachum à flatulentiã tuetur & dolore, panniculus. n. qui intestina & stomachū ambit prohibet ne eleuentur in flatum. Quare si quando stomachus cibū habeat flatuosum, sit que fortis, repellit flatum inferius, quia vnitur magis cibo, quod fit huius panniculi causa, qui declinat ad comprimendum, quare patet non ea de causa, quam refert Mundinus à natura factum fuisse hunc panniculum. Ex hac re dici posset præcincturam conferre ad digestionem, si quis tamē non assuetus vellet se præcingere nimirum detrimentū caperet: & si optimum sit vt quisque se præcingat, Nam Galen, duodecimo libro

Methodi

*in Bononia
Mundini
his si in solo
recolit*

Methodi med. affert exemplum de rustico, qui in colicis doloribus se ipsum præcingebat alió que et pane vescebatur, statimq; conualefcebat, nullam interim operam remittens. Alius est vsus, quòd alligat tanquam vestis membra omnia ventris inferioris, Illa tamè præcipua est utilitas, quòd alligat, astringitq; omnia membra ad meliorem faciendã digestionem. Nunc explicemus substantiam huius panniculi, Mundinus ait esse durũ, ut resistere possit, subtilẽm, ne grauis sit. hæc est Aristot. sententia; tercio libro De part. animal. cap. ii. Membrana, inquit, talis suapte natura est, densa est, vt arcere possit: carne vacat, vt vaporem nec trahat, nec habeat: tenuis prætenditur, vt leuis sit, & nihil ponderis afferat. Atque hæc dicta sint de usu, substantia, & quantitate peritonij. numerus vero partium videndus est, extenditur enim circum membra ventris imi: quæ igitur pars stomachum, & vesicam ambiat est crassior, quoniam oportuit vt illa extēderetur, quæ verò est circum Hepar, & renes, quoniam hæc non extenduntur, est tenuior.

MUNDINI.

Restat autem videre de passionibus eius: potest autem venter pati omnẽ genus ægritudinis, scilicet malam complexionem, malam compositionem, & solutionem cõtinuitatis: de cura malæ complexionis nihil dicã, quia non habet proprium in sua curatione quod ex anatomia dependeat.

Mala autem compositio, quæ est tumor præter naturam, in ipso est duplex: quædam

est

est apostemans, & quædam non. Prima nõ
habet aliquod præcipuum, nisi q̄ in eruptio
ne eius, si rumpatur ad intra & extra, hæc est
peior, quam si rumpatur ad vnum latus tan
tum: & causa patet, quia natura non habet
supra quod se fundet in cõsolidãdo vulnus.

Mala autem compositio quæ non est apo
stema est inflatio ipsius ventris, quæ accidit
in hydropisi ascite vel timpanite. Nam in
ascite aquositas continetur in concavitate
ventris inter intestina & siphac, sicut in tim
panite ventositas cõtinetur, & facit intumes
cere myrach. In curatione eius debes proce
dere cum his quæ ponunt auctores.

Modus autem qui maxime dependet ex
anatomia est extractio aquositatis per inci
sionem. Modus autem est vt partem my
rach, quam modo incidisti, reducas super in
testina ita quod stet sicut in viuo: & postea
hydropico situato supino debes cutem tra
here superius, & postea rasorium habere
& perforare vsque ad siphac: ita quod inci
datur etiam siphac: & tunc statim debes ha
bere cãnulam & ponere in foramine & ex
trahere de aquositate quantum sustinet pa
tiens: semper tamen sis memor quod meli
us est infra subsistere q̄ exquisitissime eua
re

vbi aqua
Contra
in hydrope
par
intelligi totu
illa sbam
cõpat cut
cuta cuti
g. pãnic. co
noto. m. s. cut
ligam. s. m.
s. cuti
itoneo. aq
q. p. cuti
m. s. cuti
p. p. cuti
et m. s. cuti
p. p. cuti
datur m. s. cuti
alud corpus
p. p. cuti

x nõ videtur ab Hipp. e. b. aph. 27. Quia autem curare
vultus aut faciem si in vniuersa, post aut aqua effluens
mouetur: modum autem exhalandi aqua optime Calleni
necessari qui de his opinatur, in d. Gabriel. Omentis
dicitur q. quosdam sicut omni mortui sunt.

cuare: & specialiter in hydropisi propter debilitatē virtutis: postea dimitte cutim quia redibit ad locum suum & recoop eriet vulnus aliorū, & ex aqua amplius nō exhibit. De ipsa vero quādo vis extrahere plus de aqua retrahe cutim sicut primo. Istud tamē vulnus nō facies nisi a lateribus inferius non in medio. Primo quia vuln⁹ factū in medio nō ita cito cōsolidatur propter siphac esse grossius & solidius ibi quā in lateribus. Secundo propter chordas vulnus est paratum duce respasmus. Tertio quia aqua melius egreditur, quia grauis est tendere deorsum.

Si vero venter patiatur solutionem continuitatis, tunc aut illa solutio est penetrans in profundum aut non. Si non, tunc non est cura difficilis. Si sic, tūc per vulnus aut egredietur aliquid de contentis aut nō. Si sic, aut illud quod egredietur ē ^{compurum} zirbus, aut aliquid intestinorum. Si zirbus tunc debet sui cum serico, vel ligari iuxta cutim quantum possibile est, & postea abscindi: quia de ipso quātum contingit aēr corrumpitur. & si intromittatur putrefit, & putrefacit alias partes. & ideo debet ligari, postea abscindi: & post illud debet intromitti, & filū dimitti extra, & dimittere labium apertum quia natura

con

consolidabit zirbum, & expellet illud quod est cum filo alligatū, hoc facto debes consolidare vulnus.

Si vero illud quod egressum est, est intestinum: tunc, aut intestinum est vulneratum aut non: si non est vulneratum, & neque substantia alia est ei inuoluta, quā citius potest debet intromitti. Si vero aliqua substantia vt puluis est anexa: vel etiam sanguis debet lauari cum aqua calida & intromitti. Si vero propter moram ventositas sit inclusa in eo: & ex hoc intumescat & non possit intromitti: tunc cataplasma resolutiuum vel spongia madefacta in decoctione resolutiua desuper poni debet, & detumescat, & sic intromittatur. Si autem non possit detumesieri neque intromitti, tunc dilatetur vulnus ^{per}myrac donec intestinum intromittatur.

Cum autem intestinum fuerit incisum, tunc si ipsum fuerit ex grossis intestinis debent labia eius sui cum serico sicut labia aliorum membrorum. Si vero sit ex intestinis gracilibus, tunc non sustinet futuram nisi sit profunda valde, & talis impedit operationem eius. Et propter hoc melius est, vt teneantur coniuncta labia vulneris cum capitibus formicarum magnarum isto modo. de-

caus miles mult.
nat coru formis
magnu in memi
 bent enim labia intestini coniungi manibus
 & debes habere formicas magnas, & facere
 ut mordeant labia coniuncta vulneris, & ab-
 scindere caput statim, & sic facere donec la-
 bia sint iuncta: & tunc intromitte intestinum
 ut prius, hoc facto ad curandum ventris so-
 lutionem redi. Et istud vulnus curari de-
 bet cum reductione labiorum in vnum, &
 reducta contineri cum sutura facta cum seri-
 co hoc modo. Nam in prima sutura in vna
 parte, accipe totum ^{myrach} myrach cum ^{siphac} siphac, Ex
 opposita vero parte, accipe solum myrach.
 In secunda vero sutura in parte in qua dimis-
 sum fuit siphac, capias myrach & siphac, Et
 in parte, in qua in prima sutura accepisti si-
 phac cum myrach, accipe solum myrach, &
 dimitte siphac; & sic consequenter. ad hoc ut
 labium siphac iungatur & reducatur labio
 membri carniformis, ut fiat certior & firmi-
 or consolidatio vulneris: & eodem modo cu-
 ra vulnus, ac si per ipsum nihil sit egressum.
 & hoc de anatomia ^{myrach} myrach quod est mem-
 brum continens.

CVRTII.

Dictum est anatomiae cognitionem plurimum
 conferre ad cognitionem aegritudinum: igitur vi-
 deamus quae aegritudines ex hac ventris anatomia
 curari possint: nam Mundinus inquit venter posse

se

se pati ex mala complexionē, mala compositionē, solutionēque continuitatis. Prioris curatio nihil accipit ab anatomia, Alteram, quam tumorem esse ait præter naturam, diuidit in eā quæ est ex apostemate, & in eam quæ secus: priorem vocat tumorem apostemosum, atque iste à Latinis dicitur ab scessus, fit que cum materia in aliquo sinu colligitur, facitque vt membrū ab alio distet. Qui Auic. verteunt appellant exituram. Quem vero tumorem non apostemosum nominat, est tumor aquosus, huiusque curatio ex anatomia colligitur: contingit enim quandoque aquosum humorem illum recipi inter intestina & peritonium: tunc que hydrodrops ascites dicitur, sentitur que tunc maximè, cū eger latus mutat. Præcipit autem modum, quo extrahatur aquositas illa. vult que corpus primo esse locandum supinum. Auic. tamē decima quarta tertij, cap. de cura ascitis vult eum aut stare, aut sedere: hoc idem sensit Paul. Ægin. lib. sexto, capi. 50. huiusmodi que curam omnes antiqui ponunt. Sed Auic. ait non oportere eā fieri nisi sit virtus fortis. Hippocr. etiā sexto aphor. 27. dicit quod, si hydropticis excisis multam aquam extraxeris moriuntur. Ego vero aliquando vidi hydropticum, à quo natura aquosum humorem emittebat per vmbilicū, exhibatque aqua cum volebamus, qui tandem mortuus est, quare paucissimi hoc modo curantur, huiusmodi que curatio tentanda est cū nulla alia spes supersit. Sed dicit quispiam hanc Auic. sententiam non sibi constare, nam cum ea est ægritudo que nullam aliam curationem possit admittere, tunc æger non erit fortis, sed maximè infirmus. Igi-

tur Auic. dictum intelligendum est, vt vult Serapio, qui inquit si nulla alia cura valeat, id est si eger nolit medicamenta sumere, tunc hac sectione opus est. Vult præterea Mundinus, cutim trahi superius, vt cum dimittatur claudat vulnus. Sed hoc noluit Auic. quia cutis illa dimissa vulnus non claudit. *vult mundin* Illud tamen est in codice Auic. notandum, in quo corruptè legitur, excoriandum esse in inferiori parte, legendum est enim, in superiori. Nonnulli asserunt sectionem in sinistra parte fieri debere si causa Hepatis sit hydrops: sin vero propter splenem, in dextra. cuius rei causam hæc refert Paulus Ægin. quòd vulnus ea parte fieri debeat, inquã eger nõ quiescit: Quibus igitur suppurationes in Hepate sunt, ijs, quoniam in dextrã recumbunt, læua pars ferienda est. Ad lit Mund. vulnus in medio ventris non debere fieri, tum quoniam eo in loco peritonium est crassum maximè. tum quia propter chordas, inquit, vulnus paratũ est adducere spasmm. Sed non videt contradictionem in dictis suis, nam quòd dicat peritonium esse crassum causa est, quia non cognouit chordas musculorum transuersorũ, quæ tendunt super ipsum, distingui à Peritonio: nã quando musculorum facit anatomiam, non dixit eos habere chordas. Quod verò nũc dicit non esse in medio ventris ferendum propter chordas, immemor sui recenset sententiam Galeni, & Auice. Est etiã alia causa propter quam, secundum Mundi. latus, non medium ventris ferendum sit: quia aqua facilius descendit ad inferiora: sed hoc est falsum, quia, vt dixi, oportet egrum stantem, aut, si id non possit, sedentem feriri. illud tamen fateor posse

stea quam emissa fuerit aqua debere eum supinū
 locari, vt inquit Auic. est præterea animaduer
 tendum ne multum exeat aquæ, quoniam arteriæ
 dilatarentur, spiritusque continuo exhalarent, quæ
 res faciliè ad mortem duceret. Ponit demum aliū
 curandi modum, qui ex anatomia & ipse sumitur.
 quòd scilicet: si quis vulneratur in inferiori vêtre,
 ex quo vulnere omentū exeat, debeat pars ea, quæ
 extet, serico quàm maximè ligari, curarè que, vt
 quod omentum extet, abscindatur: quoniam putre
 scit, vt inquit Hippocr. Aphorism. libro sexto, 58.
 Si omentum, inquit, excidat necessariò putrescit.
 Galen. tamen sexto Methodi med. cap. 4. Et Auic.
 quarta quarti libri, ca. de regimine vniuersali vul
 nerum in visceribus. non dicunt quòd necessarium
 sit omentum abscindere, nisi forte nigrum, liuidum
 ve fuerit, tunc enim quod supra nigricans est, vincu
 lo excipiemus, quod post vinculum est amputabi
 mus. Quare Galen. exponens aphorismum illum,
 inquit, verum esse vt plurimum, licet perrarò ali
 ter eueniat. Quòd autem Mundinus ait, vulneratis
 subtilibus intestinis, quæ consui non possint, oport
 ere vt labia vulneris iuncta retineantur, cum capi
 tibus magnarum formicarum, plerique recētiores
 chirurgici dicunt capita formicarum nō esse apta,
 quoniam decidant: propterea ipsi fidibus halicuti
 cis, aut pergamenis mollitis vulnera illa consuunt.
 Verùm de his non meminit Galenus: illud tantum
 dicit, filum eligēdum esse, quod nec adeò molle sit
 vt disrumpatur, nec tam durum atque àsperum
 quod vulneris labia diuellat, dilaceretque. Mun
 dinus vnum tantum cōsuendi modum ponit, Gal.

*notam.**fideri
uica.*

verò sexto libro Meth.med.cap.4. tres modos cō
numerat: quorū prior est cōmunis quo omne vul
nus confuitur. cum in peritonium & abdomē acus
inmittitur, quem admodum in alijs: curaturque
quā maxime, vt peritoniū abdomini coalescat:
quod cū difficile sit adeo, vt vix coalescere possit,
quoniam est neruosum, Ideò Alia quidam vtūtur
ratione, consuetes quæ similis sunt nature, vt peri
tonium peritonio, & abdomini abdomē, atque iste
est tertius modus, quem Galen. ponit. Alius modus
est cū à cute introrsum acus inijcitur vltra rectū
musculum, præterito autē, quod ei subest, peritonio
per reliquū peritoniū ab interno extrorsum, est re
deundū, atq; inde per reliquū abdomē acus trans
mittenda, plurāq; alia, quæ studiosus per se inueni
et, mihi locū mōstrasse sat est. Verūm hæc sufficiāt,
quod ad hāc rē p̄tinet: si prius tñ docuero in Auic.
codice hæc verba deficere. Et reuoca acum, trans
mittāsque duo peritonij labra.

De anatomia zirbi. i. omenti.

REstat videre de anatomia cōtentorum.
Hæc autē mēbra sunt numero decē. Pri
mū quod occurrit est ^{omēphum} zirbus. Secundū inte
stina. Tertium stomachus. Quartum splē.
Quintum epar. Sextum mesenteriū. Septi
mum renes. Octauum vesica. Nonum testi
culi, & vasa spermatica, & matrix in muliere.
Decimum est vīrga cum collo vesicæ.

De zirbo autē primo q̄ oportet videre est
locus eius; locus, n. eius in homine est q̄a co
ope

operit stomachum ab anteriori parte, & omnia intestina: licet in alijs animalibus non cõoperit omnia intestina. hoc fuit quia hõ inter cetera animalia eiusdẽ quãtitatis est debilioris digestiue virtutis: & etiam quia intestina nociuis exterioribus sunt magis disposita, propter cutem eius subtiliorem esse, & minus pilosam.

Ex hoc etiã põt patere secundũ, scilicet qd sit eius iuuamentum. Iuuamentũ. n. eius est principaliter confortare virtutem digestiuã stomachi & intestinorũ reuerberãdo calorẽ naturalẽ ad stomachũ. Et ppter ea dixit gal. 4. de. V. P. cap. 9. qd qdã fuit vulneratus curi epiploõ. i. zirbus fuit abscisus: tamen ex vulnere sanatus est, ex quo tamen postea nõ potuit digerere.

Et ex his cõsequenter patet tertiũ inquirendũ de ipso. s. de substãtia eius. substãtia eius nõ fuit simplex sed cõposita & fabricata ex substãtijs q̄ habẽt calefacere. & ppter ea fuit cõpositus ex triplici substãtia sicut dicit Gale. 5. de iuuamentis mēbrorum. c. 2. s. ex panniculis subtilibus duobus, & ex adipe seposita, & ex arterijs & venis. Primo vt ipsi pãniculi cõtinerẽt alia: & etiã qa iste zirbus debet esse extẽsibilis leuis & dẽsus, vt calidi

tatē reuerberet, & ad hoc magis pōt substan-
tia pānicularis, q̄ aliqua alia. Secūdo, in ipso
fuit adeps quē calefacit, cū sit valde p̄pinqua
caliditati, vel impotentia ad calidum. Tertio
arteriā, & venā quā multum calefaciunt.

Ex hoc patent reliqua duo, scilicet qui sit
numerus partium eius: & quā sit colligātia
eius, nam habet colligātiā ad membra, ad
quā terminantur, vt ad stomachū, & ad sple-
nem, & ad intestina: & specialiter colon pro-
pter causam quā dicetur.

Habet etiam colligantiam ad membra a
quibus oritur. Oritur nanque ex dorso a pā-
niculo a diaphragmate orto: & causa q̄re in
de oritur est: quia ad locum illum terminan-
tur duæ extremitates panniculi siphac, quæ
debent inuestire ^{peritonium} zirbum: & sic etiam ibi est
vna vena magna: & etiam est arteria a qui-
bus iuxta stomachum oriūtur venæ paruæ,
& arteriæ contextentes zirbum.

Tertio ibi est mesenteriiū seposum, a quo
oritur adeps seposa replens vacuitates illius
contexturæ: quæ autem sit ipsius ægritudo
declaranda per anatomiam suam, patet
ex ijs, quæ dicta sunt supra.

CVRTII.

Sequitur Omenti anatomia, de quo Gale. quar-
to De vsu part. ca. 9. tractat. et Arist. tertio de Hist.

ani-

animal. cap. 14. Et quarto de part. animal. cap. 3. dicitur autem Græcis ἐπιπλοον, est enim suprapositū intestinis, adhæretque solū stomacho, spleni, & intestino colo, & situ suo stomachum operit cum intestinis, in homine tamen operit mediam tantū partem stomachi, in alijs verò ortum trahit à medio ventris inferioris. Quod autem in homine, & similia omni superextendatur intestinis signum est quod hæc sola in epiploclam inciduat: Ratio autem, quoniam digerentem virtutem habet infirmam, Mundi autem inquit, quoniam habeat pellē tenuē, careatque pilis: sed hoc mihi non probatur, quia & si homo careat pilis, habet nihilominus rationem, qua vestes, alia que ad vsum necessaria comparare possit. Sed quæritur an verum sit, quod homo infirmę sit digestionis. Nam Aristot. quarta sectione problem. 6. & quarto De part. animal. cap. 9. ait hominem esse calidissimum, ergo habere debet validam digerendī virtutem. Dico certum esse hominem debiliorem esse, nam si frumentum, carnes, reliquā que huiusmodi cruda comederet, quod faciunt reliqua animantia, proculdubio ea concoquere minimè posset, cum tamē homini etiam cōueniant. Quomodo ergo est calidissimus? Dixi paulò ante hominem quidem esse calidissimum, sed tamen de calore extensiuo intelligendum esse. Sed dicet quispiam, cum digestio fiat à calido temperato, nõne homo debet magis digerere? Respondeo, hominem quidem esse calidissimum iuxta pectus, non tamen protinus etiam calidissimus est ex parte stomachi. hoc autem ideo natura instituit, quia qui vehementis sunt caloris maiori egent nutrimentē

to: quòd si plurimum cibum sumeret, plurimi fumus
 à stomacho confurgerent ad impediendas intelle-
 ctus operatiões, vt igitur minus ederet oportuit eū
 debiliorem stomachum habere. ad adiuuādam ta-
 men digestionem natura circumdedit inte stina omē
 ro, quod in alijs animalibus non fecit: Quòd autē
 ad digestionem conferat exemplo est ille de quo
 meminit Galen. libro quarto De vsu part. cap. 9.

Omenti autem substantia cōstat ex venis, arterijs,
 pinguedine, & duobus panniculis: necessaria enim
 fuit panniculosa substantia, vt propter duritiem, nō
 permitteret calorem exire: leuis, ne graua ret. venæ
 autem, arteriæ, & pinguedo à calefaciendum data
 sunt. Ne mirum sit autē quòd dixi pinguedinē ex-
 calefacere, quoniā etiam Galenus probat, quoni-
 am ipsa vrimur ad perungēda frigida: deinde quo-
 niam facilimè flammam concipit: verūm dicit ali-
 quis, hoc esse aduersus meam sentētiā quam pa-
 ulò ante protuli, cū dicebam pinguedinem concre-
 tam esse frigidam. Ego verò dico hoc facere ad so-
 lutionem iam propositæ que stionis nam aliquādo
 Galenus dicit, quod in omento multa est circum-
 fusa pinguedo, quæ hūme ctat, membra tanquam
 oleum mollit, prohibētque ne præterea obdure-
 cat, atque hæc est quam calidam esse asserit. vt un-
 tur enim ea non secus ac oleo, facilis quæ est ad fla-
 mam concipiendam: Quare cum pinguedinem ca-
 lidam esse ait, de liquefacta intelligit, cū verò
 frigidam, de concreta. Illud præterea inditio est pin-
 guedinem liquatam excalefacere, quòd ad fouen-
 dum stomachum melius perungimus pinguedine,
 quam vrimur vestibus, nam exactius meatus ob-
 surat

si qua
 in pinguedine
 intelligi
 adat calidam et frigida.

turat unctio quàm faciant injectæ vestes. Hoc ta-
 men in re præsentis verum est, quòd non pinguedo,
 sed durities potius panniculorū calorem intra omē
 tum continet. Nunc dicendum restat cui parti iun-
 gatur omentum. pro qua re Mundinus ait habere
 cum colligantiam cum ijs membris ad quæ termi-
 natur, vt stomacho, splene, & intestino colo præ-
 cipuè. Ego autem declaravi, ex Galeni sententia
 sexto De anatomicis aggress. cap. 5. non solum his
 iunctum esse, sed etiam quandoque iungi pinnule
 iecoris, & alicui mendosæ costæ. oritur verò se-
 cundum Galenum quartò De vsu part. capi. ii. ex
 venis, arterijs, & tunicis, Nam partibus, inquit, pe-
 ritonij quæ à dorso vtrinque ascendunt sibi inui-
 cem occurrentibus ad gibbosissimam & altissi-
 mam partem ventris, & ibi magnam arteriam, &
 venam secundum longitudinem eius extensam in-
 uenientibus, locus iste totus principium est genera-
 tionis omenti, ceu iam omnia habens quibus ege-
 bat. Ergo, è gibbosa parte ventris, ad quam ten-
 dunt venæ & arteriæ, & secunda tunica peritonij,
 non ex panniculo carnosio, qui non est omino, ori-
 tur omentum: neque enim datur panniculus carno-
 sus, neque in posteriori parte, vnde trar. sacri mus-
 culi incipiunt, sed sibi sunt membranæ & chordæ
 musculorum: Est præterea apud Mundinum alia
 causa qua oririatur omentum ex carnosio panni-
 culo, quia, inquit, ibi est seposum mesenterium, à
 quo pinguedo oritur, quæ repleat vacua conte-
 xturæ illius. Verum hoc falsum est, nam pingue-
 do mesenterij, non generat omenti pinguedinem,
 quoniam hæc non pendet ex pinguedine alterius:

sed

sed generatur ex vnguinoso sanguine, quem membrana perfrigerauerit. Præterea, quod ex alio oritur, cum eo continuè iunctus est: at omenti pinguedo iuncta non est cum mesenterio: atque hæc de omenti anatomia dicta sint.

De anatomia intestinorum.

LEuato autem zirbo quātum ad partem quæ cooperit intestina, & nō plu, s nemo ueas alia membra a suo loco statim tibi apparent intestina. Circa quæ primo notabis positionem & numerum: fuerunt enim plura inuoluta & reuoluta: & non fuerunt vnū intestinum rectum, propter duo.

Primum quia dato q̄ in quibusdam brutis tantum sit vnum intestinum rectum vel recte procedēs. In homine autem & in alijs animalibus perfectis fuerūt reuoluta, vt diu cibis contineretur in stomacho, & in intestinis: quia si non contineretur, oporteret quod animal esset in cōtinua assumptione cibi, & in continua assellatione: & continuatio illa impediret occupationem in alijs perfectioribus operationibus.

Secunda causa fuit, quia si intestinum fuisset totum vnum rectum, non quælibet pars cibi fuisset contacta a superficie intestini: & ideo intestinum non fugisset totam humiditatem contentam in cibo: vt igitur nihil rema

neat

neat de cibo intactum ab intestinis: & vt tota humiditas exugeretur, ordinavit natura ipsa eē inuoluta: ex hoc statim apparet quod sunt plura numero: quia sex: tria subtilia, & tria grossa. *sex sunt in ista*

CVR. T. II.

Ex intestinis primū Duodenum vocatur, quia duodecim est digitorum: alterum Ieiunum, quod vacuum sit: tertium Gracile, quod etiam Ileon vocant, tamen si proprie Ileos morbo sit, qui circa hoc intestinum oboritur: quartum est, quod ideò Monoculum appellant, quoniam vnum tantum habet orificium, ex qua parte colon oritur, Demum est Rectum intestinū. Primū autem quæri solet, quæ de causa natura tot ambages, ac reuolutiones in intestinis fecerit. Pro cuius solutione duas affert causas Mundinus sumptas ex Auice. in initio decimæ sextæ tertij libri, ait enim primò eam fuisse causam vt cibus diutiùs in stomacho, & intestinis moraretur: aduersus quam sententiam manifestè Galenus est, quarto De vsu part. capi. 17. cum inquit, propterea enim quòd cibi deferuntur per viā longam & strictam, diligenter simul & citò, quæ ex ijs ad hepar est, anadolis facta est neque vult Gal. quòd facta sint propter digestionem, neque vt fæces exportent, sed vt concoctum alimentum diligenter distribuant ad hepar. Plura eo loco Gale. dicit, ad quem studiosos remitto. Est etiam alia ratio reuolutionis intestinorum. vt scilicet faciliùs et citiùs ad hepar chylus trahatur, nam si intestina recta essent, quod illis continetur non sugeretur, sed illud

illud tantum, quod venis illis proximum esset traheretur: quare hæc inuolutio facit, vt facilius & citius totum trahatur ad hepar, nõ vt diutius chylus moram trahat: nam stomachus cum chylum ad intestina transmittit, suam retinet partem, atque etiã si chylus, cum primùm exit è stomacho, contendere ad hepar, non tamen sequeretur ob id quòd continuè homo famesceret: quin potius id contingeret si ad hepar non perueniret chylus. Potest tamen Auic. dictum cum Galeno conuenire, si intelligatur intestina inuoluta esse, ne cibus facile exeat ab animali, neque enim hoc Gale. negaret, sed non est dicendum, vt Mundinus, scilicet vt cibus diutius maneat in intestinis. Illud tamen verum est, quòd naturæ intentio in faciendis intestinis inuolutis fuit prima, vt distribuatur nutrimentum corpori animalis, licet autem id postea consequatur, quòd moram in intestinis trahat, non tamen hanc primam fuisse causam dicendum est. Hoc loco maxima oritur dubitatio de virtutibus⁹ intestinorum: nam sunt qui dicant omnes ips naturales virtutes inesse, alij quosdam concedunt: omnes tamen in hoc conueniunt, attractricem et expultricem illis inesse. In reliquis, attractrice. s. & retentrice, tota versatur quæstio, intelligendo tamen vt hæc potentiæ naturales sunt, non voluntariæ, ut quæ est in musculo ani. Pro qua re illud est imprimis notandum, tria esse villorum genera, nam quidam recti sunt, qui ad attrahendũ valent, nonnulli transuersi, atque hi sunt ad expellendum, Alij obliqui, ad retinendum iuuant: omnes tamen retinendi potentiam habent, ex sexto De usu part. cap. 8. igitur alia membra omnia villorum

lorum genera habent, ex eodem, libro quarto, ca. 17. præter intestina, quæ vnum tantum genus habent, transuersos scilicet quibus expellendi vis inest. Contra tamen hanc sententiam est Auicên. auctoritas decimasexta tertij, Et Galenus qui quarto De vsu par. cap. 17. ait in quibusdam intestinis esse villos rectos. Idem etiam in tertium aphor. 12. & quartum, 12. & sextum, 1. quo loco ponit virtutem retentricem in intestinis infirmam, quam ventris fluxus consequitur. Præterea tertio de virtutis naturalibus, capi. 9. In vna quaque parte quæ nutriatur, quatuor esse potentias naturales asserit: quod verum est, etiam in intestinis omnes hæc quatuor potentia inerunt. Ad quam contradictionem tollendam scire oportet, duplicem esse attractiuam virtutem, vnam, quæ absque suo motu attrahit, vt magnes, qui ferrum ad se trahit, nec tamen ipse mouetur, atque hoc fit à virtute attractrice; alteram, quæ non nisi moueatur attrahere possit. idem est de retinente potentia statuendum. Dico igitur quod attrahens virtus est in intestinis, vt est in magnete. Dubitatur præterea an virtus illa per villos retineat, eodem modo an virtus retinens per motum localem retineat. Verum virtus ea quæ propria virtute attrahit, propria etiam virtute retinet: quominus autem talis sit in intestinis, nemini dubium esse debet. Nunc ad auctoritates ex aphorismis allatas est respondendum: Dico præter illam retinentem potentiam quæ fit cum motu, & eam quæ sine motu, esse etiam aliam tanquam speciem retentricis virtutis, quæ fert rem si adueniat, vt si in manu aliquid gestarem, neque depellerem, dicerer illud

v. v. h. c.
attractiuam
in motu

illud continere: huiusmodi igitur retentricem potē-
 tiam habent intestina, quæ tamē adeo infirma est,
 vt cum rem ferre non possit, ad eam expellendam
 insurgat, propterea neque potest verē retentrix ap-
 pellari: neque enim villos rectos, aut obliquos ha-
 bent, sed tantum transversos quibus expellit. His
 dictis, Galeno respondendum est, qui dicit in recto
 intestino rectos esse villos: per se autem patet solu-
 tio, nam vult Galen, quod per intestinum rectum
 exeant fæces, quæ, quoniam aliquando obduratę
 sunt, ne dum exire contendunt diuellant intestinū,
 nam in eo duo villorum genera instituit, rectos
 scilicet, & latos, non tamen ad attrahendum. Dicit
 hic quispiam, si intestina non habent retentricem
 potentiam, qua de causa in fluxu applicant medici
 stiptica ad confirmandam retentricem cum ea in
 intestinis non sit penitus: Respondeo quod ea em-
 plastra non applicantur, propter intestinorum re-
 tentricem virtutem, sed propter eam, quæ est in ve-
 nis meseraicis. Hinc illud colligi potest, quod ad
 medendi praxin multum confert. Quod sæpenu-
 mero ex obduratis fæcibus dolores adueniunt, que
 emitti nequeant: ad quas molliendas perperam no-
 strates medici exterius molliētia emplastra, & vn-
 ctiones applicant, belneisque ad id vtuntur: Me-
 lius enim ius potandum, aliaque huiusmodi molli-
 entia interius darētur: nā intestina (vt dictū iā est)
 expellendi tantum vim habent, atque hæc virtus
 moderata potius siccitate eger, quàm superflua hu-
 mectatione: sed obduratas fæces si ab exteriori
 parte mollire speraueris, non rectē ages, quoniam
 potius intestinorum substantia humectatur per hu-
 iusmodi

iusmodi quàm fæces, eorum. n. substantia à natura
 duas tunicas sortita est, vt non facilè pati possit, vt
 Gale. auctor est quarto libro De vsu part. cap. 17.
 Quare meliùs humectantur fæces per ea quæ sur-
 muntur. cum igitur, vt dictum est tria sint genera
 villorum, ac per rectos quidè attrahatur, per trans-
 uersos expellatur, per obliquos retineatur, notan-
 dum est matricem, venas, & vtranque vesicã vna
 circumdari tantùm tunica, in qua tamen omnia vil-
 lorum sint genera, quæ verò duas habent tunicas
 sunt stomachus, & arteriæ, præterea etiam intesti-
 na: sed illa in exteriori tunica villos habent rectos
 & obliquos, in interiori transuersos: Intestina
 & si duabus contineantur tunicis, tamen transuer-
 sos solùm villos habent. Hoc loco tollenda est con-
 tradictio quæ in Galeni dictis esse videtur, nam in
 sexto Methodi med. cap. 4. sentire videtur esse inte-
 stina neruosa, in sexto autem Aphorism. 18. tenuia
 intestina ait multùm carnosæ substantiæ participa-
 re. Dicendum est nihil prohibere quominus ex di-
 uersorum collatione, intestinorum substantia, ali-
 quãdo carnosã, aliàs neruosa appellatur: nam si ad
 reliqua intestina leiuinum cõferatur. neruosum dici
 poterit, si uerò ad ossa, aut membranas carnosum
 poterit appellari, quare mirandum non est si diuer-
 sis cõparata quandoque carnosã, quandoq; neruo-
 sa vocãtur. ipsa autem (vt etiam dictum est) ex vil-
 lis, & propria substantia constant. Intestinorum au-
tem duo sunt genera, nam quedam tenuia ac graci-
lia, sunt, alia crassiora: ac tenuia tria sunt, totidem-
que crassa existunt: verùm illa quidem inuoluta
sunt, vt chylus ad hepar quam primum transmitta-
tur:

*In his hinc
 duo sunt gē*

cur: hæc vero duriora sunt etiam ipsa aliqua inuoluta, vt in ipsis consistant fæces vsque ad emittendi tempus, ne sæpius egerere cogamur: quod etiam testatur Gal. quarto de vsu par. cap. 18. inquit enim retinendis humidis excrementis vesicam, siccis vero crassum intestinum fuisse institutum. hoc pauca habet venarum orificia, quoniam parum relinquatur chyli, quod non attrahatur ex gracilibus intestinis. Nam post digestionem demittit omnia, atque hepar quidem per venas exsugit quod bonum est, reliqua in crassiora intestina descendunt.

DE ANATOMIA RECTI.

*recti inuolutum
cedat.*
Incipiamus ergo ab ultimo quod vocatur rectum vel longum: cuius extremitas est orificium quod vocatur anus. Sed vt anatomia aliorum non destruat, ligare oportet intestinum istud circa medium eius in duabus partibus: & in medio ligaturæ incidere, & inferiorem partem dimittere, & cum superiori ascendere scarnando. Et nota circa istud intestinum multitudinē venarum meseraicarum, quæ veniunt ad sugendum si aliquid est de humiditate in chylo, vel de superfluitate remansit: & istud intestinum iuxta ilia finit: vbi incipit intestinum colon.

CVRTII.

Adiutere oportet, hoc intestinum & duo alia crassa habere pinguedinem quandam interiorem, gracilia vero loco pinguedinis humiditatem habere musco-

muscosam, vt dicit Auicena, decimasexta Tertij.
 cap. 1. habet autem pinguedinem vt seruentur tuta à
 cholera, quæ per ea transit. Est autem rectum, vt
 magis ad eijciendas fæces aptum sit, quod secus ef-
 fet, si illud natura inuolutum fecisset, non oportuit
 autem, vt est in alijs, ipsum inuolutum fuisse, pro-
 pterea quod non est ad distribuendum cibum fa-
 ctum. Quod autem dicat Mundinus multitudinem
 venarum meseraicarum (ita enim appellant) ve-
 nire ad hoc rectum intestinum, vt inde extrahant
 siquid de humiditate in chylo, vel superfluitate re-
 mansit, quid sibi velit nescio, Sanè nunquam apud
 Galenum aut Auicem. legi plures huiusmodi ve-
 nas ad hoc intestinum peruenire: tamen si Gentilis
 dicat plures ad hoc peruenire meseraicas venas
 quàm ad cæcum intestinum, quod monoculum,
 appellat. Etenim quemadmodum gulæ superior
 pars (ex Galen. quarto De vsu part. capi. 8.) est du-
 rior, quàm sit ea, quæ inferior est, quoniã sæpe in-
 cidit in duriores cibos: eodem modo paucas venas
 natura ad stomachum transmittit, ne indigestum,
 atque incoctum cibum attrahant ad iecur: quo-
 niam vero ex gracilibus intestinis plus attrahitur
 nutrimenti, ideo plures etiam venas habuerunt.
 Nisi fortè dicat Mundinus, in intestino recto esse
 hæmorrhoidas venas, quas meseraicas vocet, hoc au-
 tem maximè absurdum est. In recti intestini ex-
 tremitate est musculus, ex Galen. sententia quar-
 to De vsu parti. cap. 19. per quem anus astringitur,
 vocaturq; græcis. σφιγκτηρ, nos autem strictorem,
 aut strictorium, verbum verbo reddentes, appel-
 lare possumus.

p.^m m. h. h. m. u.
d. r. n. e. h. u.
2.^m colu
3.^m mono
culu.
4.^m m. p. l. e. u.
Sen gra-
cile.
5.^m l. e. m. u.
6.^m d. u. o. d. e.
rum.

pl. e. u.
et d. u. o.
d. e. m.
g. r. a. c. i. l. i. a.
d. i. c. u. n. t.

Et dicitur colon, quia plura cola habet,
 vel cauernositates. vel cellulas, vel cameras
 in quibus stercus figuram accipit, & in ipso
 retinetur propter has cellulas. Circa quod inte-
 stinum debes considerare locum, quia mul-
 tum circa sinistrum renem inuoluitur: & hæc
 est causa quare eius dolor ex parte loci non
 distinguitur a dolore renali. Postea vero a-
 scendens, & cooperiens splenem incipit circa
 exteriora declinare versus partem dextram,
 & cooperit stomachum: & propter cooperi-
 turam quam facit supra stomachum, accidit
 quod quando superfluitates descendunt ex hoc
 intestino quod stomachus ei compatitur, & do-
 lor, & rugitus tunc temporis apparet circa sto-
 machum: & tunc statim homo appetit assel-
 lare, & assellat. Quod non contingeret si in
 stomacho essent humiditates, quæ facerent
 hunc rugitum & dolorem: & ex hoc patet
 quare accidit, his qui purgantur, quod syncope
 eis accidit quando appetunt assellare. Vel hu-
 mores in intestino hoc continentur, qui de-
 bent euacuari: quia tunc illi humores in in-
 testino illo existentes alterant stomachum &
 os eius, & ex alteratione oris stomachi sequi-
 tur syncope,

Sed dubitabit aliquis rationabiliter de lo

ço huius intestini, cum sit de grossis deberet esse inferius & non supra alia: cuius oppositum apparet. Dicendum q̄ istud intestinum fuit locatum superius iuxta stomachum, p̄pter tria.

Primum, quia istud ignobilius est omnibus gracilibus: & ideo sub myrach inter omnia gracillia debuit positum esse exterius.

Secundum, quia istud intestinum continet fæces. & aliquando induratur: & de se priuatum est omni humiditate & caliditate naturali, vt a mēbris vicinis adiuuaretur ordinauit natura vt immediate locaret supra stomachū, vt cooperiretur a zirbo, a quo et stomachus cooperitur: quia & zirb^o ipsum humectat & calefacit: & propterea apparet q̄ non est aliud intestinum, cum quo alligatus sit zirbus sicut cum colon.

Tertia cā huius locationis est: quia istud intestinum proprie est factum ad continendum & expellendum fæces, sed magis ad expellendum: & ideo inter alia intestina ad ipsum proprie debuit peruenire cholera, quæ habet expulsiuam stimulare: modo propter hoc q̄ sic locatum est cholera ad ipsius substantiam peruenit præter illa quæ ad concauitatem intestinorum peruenit. Nam supra

ipsum in parte dextra existit pēnula hepatis, in qua existit cystis fellis cū quo alligatur: & hoc apparet ad sensum. Et propterea tale intestinum in tali loco apparet citrinum vel subnigrum, & amarum in gustu. Et nota circa hoc mirabilem operationem nature.

Ad illud quod obijcitur, soluitur, q̄ intestina non iudicantur superiora ratione loci: sed ratione colligantia, quam habent cum stomacho vel fundo stomachi, modo intestina gracilia ratione colligantia ad fundum stomachi sunt superiora aliis.

Ex loco superiori istius intestini apparet causa quare in dolore colico augetur dolor tempore assumptionis cibi: quia tunc istud intestinum comprimitur a cibo: sed tempore famis non: sed intenditur dolor renalis: & hoc est vnum ex signis distinctiuis inter vnū dolorem, & alium.

Et ex loco & colligantia dicti intestini apparent nobis duo, vnum vtile in cognitione, aliud in operatione: in cognitione: quia quando fit colica passio incipit in parte sinistra: & in illa magis molestat: tunc quia intestinum illud frigidius ē illic, cum non tangatur a cysti fellis.

Secundo quia in maiori quantitate est locatum

catum circa renem sinistrum, & est strictius: tamen illa collica quæ fit in parte sinistra nõ tandiu molestat: tum quia fit a causis facilibus: tum quia causa eius est in loco viciniõri ad expulsionem: & nota hoc quia per experientiam vidi multoties.

Quantum ad opus vero confert, Primo quia in colica ea quæ administrantur ad extra debent magis applicari & approximari circa hypochondrium sinistrum, quã dextrũ licet vtrobiq; conferant. Secundo quia quando fit clyster melius est, vt corpus declinet versus dextrum, vt intestinũ colon non comprimatur ab aliis. postea iniecto clystere vertat se super lat⁹ sinistrum, & ibi per ali quod tempus moretur: & postea paulatim super dextrum sicut in expulsionem, quæ debet fieri per potionem administratam per superiorẽ partem, & e contra quando incipit mouere: & hoc est de loco & colligantia eius.

Substantiam vero eius consideres grossam, & solidam: & propterea ventositatem generatam in eo multo tempore continet, quæ in eo fortissimum interdum generat dolorẽ, qui cũ fiat in substantia grossa & solida apparet: ac si intestinũ terre bello perforetur. Et etiam in hoc similatur dolor huius

dolori renali.

Quarto cōsiderare debes figuram eius & formam quæ apparet ex dictis: cellulosum enim est intestinum, & in cellulis istis: quia via & transitus multum obliquantur: fit causa morę super fluitatum, quæ in eo figuram recipiunt ad modum illarum cellularum: & ideo stercus figuram habet quã scis: figura maxime apparet in stercore desiccato & retento: vt in febris & aliis ægritudinibus in quibus eiiciuntur squibale & humores flegmatici vt plurimum in illis retinentur: & sunt materia cucurbitini.

Nam in concauitate cellularum est humor flegmaticus multus qui est sufficiens materia generationis vermium: & si inter vnã cellulam & aliam continetur paucus humor, qui non sit sufficiens ad generationẽ vermium: est tamen sufficiens ad generandum panniculum continuantem vnum vermem generatum in vna cellula cum alio in alia cellula generatio. Operatio, instrumentum, & ægritudo ipsius ex prædictis patet.

CVRTII.

In anatomia colli primũ situs est aduertendus, est enim magna ex parte in iliis sinistris inuolutus, quare dixit Galen. sexto de locis affectis cap. 2. difficile

cile esse distinguere dolorem renum, à colico, ratione loci. Initium sumit colon ab inguine dextro, quo in loco egcum intestinum est, inde ad iecur cōtendens superat fundum stomachi, & tangit splenem, transitq̄ in sinistra ilia, tum recto intestino cōmittitur quod, autem ait Mundingus colon operire stomachum, id plerique negant, mihi cum ijs non est multum certandum: sane illud est manifestum quòd stomachum tangit. Quare autem perturbationes stomachi cessant cum egerimus, hanc rationem reddit, quod materia nō erat in stomacho, sed in colo. Hinc etiam causa patet, quare in sumendo medicamento sycopen patimur, nam cum medicamentum colon permeat communicatur etiā stomacho, qui maximè sensibilis est, atq̄ inde euenit syncope. Causas verò, quibus ita situm est hoc intestinum, refert Mundingus, quarum prior, cum inquit, quoniā ignobile est ideo sub myrach oportuit positum fuisse exterius: absurda est, quā neque Arist. aut Galen. vnquā dixit: nō enim hæc ratio ualet. Est prope myrach, ergo est in loco ignobiliore. iecur. n. est proximū myrach, neque tamē est ignobile. Altera ratio quam affert hæc est, In colo fæces continentur, quas, quoniam aliquando durantur, oportet humectari, propterea natura instituit vt statim supra stomachum poneretur, vt ab omēto operirentur, à quo humectari possent. Sed neq̄ ratio ista magis est bona, siquidem nemo vnquā dixit pinguedinem in panniculari membro, aliud humectare præter membranā: vt illud fatear, esse aliquos, qui velint glandulosas carnes esse in menterio ad intestina humectanda: tamen si Galen.

do De semine capi.ultimo,nolit intestina omnino humectari glandulosis carnibus: quod si non vult eò minuùs concederet ea pinguedine omenti humectari,cum ad humectandum pāniculum, stoma-
 chumque calefaciendum facta sit. Tertiā afferēs causam ait. Propterea quod ad eijciēdas fæces præcipuè institutum fuit, idcirco debuit folliculum fel-
 lis attingere, vt ad expellendum fæces sumeret cho-
 leram,quod fieri non potuisset si illud alio in loco natura collocasset. Verum neque hæc mihi ratio probatur:siquidem in hoc omnes consentiunt colō esse carnosum,& cellulosum, vt in eo fæces diuini⁹ contineantur, ne sepius egerere necesse sit: quod si verum est,quæro ego à Mundino,cur velit hoc in-
 testinum ea de causa felli proximum esse, vt cito fæces eijciat:Cum id natura non tam ad expellen-
 dum,quam retinendum fæces instituerit.Præterea colon ex vna tātum parte cysti tangit:quod si na-
 tura voluisset choleram opē ferre ad emittendas. fæces, fecisset venam,quæ ex cysti in hoc intestinū choleram traheret.Hæ sunt rationes quas adducit Mundinus ad probandum situm huius intestini:qui-
 bus adducor,vt credam veriores eas esse quas Ga-
 lenus & Auicen,afferunt,Nam Galen. quarto De vsu par.cap.13. inquit naturam in dextris ilibus ec-
 cum intestinū deposuisse, quia locus ibi vacabat, cum dexter ren in altiori loco sit,huic autem colō propinquum fuisse necesse erat,quoniam ab ipso oritur:curauit autē natura vt hepar tangeret, quo-
 niam,vt inquit Auice. decimasexta Tertij,capi.2.
 Hæc intestina crassiora, præter expultricē, habent etiam non nihil digerentis virtutis. Non potuit au-
 tem

tem colon propius dorsum collocari, quia ibi sunt gracilia intestina: etenim natura magis propè dorsum instituit venam illam, à qua dimittuntur vene ad mesenterium, quæ chylum quo ad fieri potest è gracilibus exsugant. Effecit verò natura intestinum duodenum, rectum, vt vene magnæ, atq; arteriæ locus esset, quo ad mesenterium tendant: quare is locus, cum in eo nulla alia essent intestina, relictus est Colo: quæ etiam fuit causa, quod supra fundum stomachi trāsire potuerit, Voluitur autem inter lienem & renes, is enim locus vacuus relinquatur: Quare merito ibi est locatum. Ex his patere existimo rationes Mundini falsas esse, nostras autem veriores. Hoc loco non ab re fuerit secutos ordinem Mulinum recensere quos vsus possit Medicus capere ex huius intestini anatomia, in curandi praxi, ac primus est, quem ponit Mundinus, quòd dignoscimus dolorem renum à colico, nam si colicus sit affectus, assumpto cibo, inquit, augetur dolor, quoniam cibus intestinum comprimit. Verum nihil certi afferi hoc signum, siquidem assumpto cibo corrugatur stomachus, atque ideo non possunt cibi intestinum comprimere, neque Galen. de hoc signo meminit lib. sexto De locis affect. cap. 1. quo in loco distinguit renum dolorem à colico, tametsi hoc asserat Auic. decimasexta Tertij. tract. 3. capi. 10. Ex situ præterea coli possumus, inquit Mundinus, cognoscere cur colicus dolor læuum latus magis torqueat quàm dextrum, nam in ea parte maior est huius intestini quãtitas, quàm in dextra: est etiam magis à iecore remotum sinistrum latus: præterea magis distat à loco expellendi: qua de causa

in

in læua parte solemus remedia adiungere magis quàm in altera, Quod tamen intelligendum est, si sinistra torqueatur, nam alioqui si dextrum latus pateretur oporteret remedia eodem in loco pariter applicari: ex his tradit regulam quãdam, quod in coli affectibus, dum immittuntur clysteres, oportet ægrotos iacere in dextrum latus, tum se in sinistrum conuertere. pro qua sententiã vix vllus est eorum, qui de hac re scripserunt. Nam Auic. quarta primi cap. 17. ait. Videtur quòd eorum situs, qui bus clysteres iniiciuntur, optimus sit, vt supini iaceant, deinde se in latus quod dolet conuertant: eandem habet sententiã decima sexta Tertij cap. De colica. Rasis etiam cap. de colica, vult eos aut in sinistrum latus, aut supinos iacere. De sinistro vero $\epsilon\delta\epsilon\sigma\lambda\epsilon\gamma\theta$. cuius rei ratio hæc est, quoniam intestinum rectum in sinistrum latus declinat, quod si velis in dextrum iacere, tunc sinistra pars sursum verget, eritque non secus, ac si velles aquam sursum tẽdere. Quare nemo est, qui hunc clysteris immitendi modum præcipiat, præter vnum Mundinum, qui verius est ne ab alijs colon premeretur, si in sinistrum latus iaceret eger: sed non vidit alia intestina dorso esse alligata, & mesenterio, atq; ideò non posse colon premere. Quod si compressio illa clysteris transitum impediret, non oporteret omnino in latus sinistrum affectũ, clysterẽ immittere, quod omnibus contradicit. Addit Mund. coli dolorẽ esse ac si terebello perforaretur, quoniam eius substantia crassa est. Galen. autẽ secundo De locis affect. cap. 5. ait hos dolores esse, ac si essent acus in colo. nonnunquã tamẽ in auribus ac dentibus apparẽt.

Quod

Quòd verò ait huiusmodi dolorem facere vt renum dolori colicus conueniat, fallitur: nam id præcipuum signum est, quo hos dolores discernimus. Quà propter Galen. referens causam huius doloris, ait Substantiam huius intestini esse crassam, quare fieri potest, vt huiusmodi affectus eueniat, vt in eo intestino aliqua res fixa videatur, quod in puniculo prope renes non item fit, quoniam subtilis est maximè, atq; ideò iste dolor fixus nō apparet. Quæ autem res Mundinum in errorem traxit fuit hæc, quod Gale. sexto De locis affectis, cap. 1. cum hos dolores distinguit, inqt dolorem renū fixū esse, & Auic. decimafexta Tertij, tract. 3. cap. 7. Verū idem Auic. paulò inferiùs cap. 10. inquit dolorem colicum ad partes moueri plures, renum vero fixū, esse. Ex quibus verbis notandum est, quod duplicem sensum capit, cum dicitur dolorem esse fixum vel scilicet quod non mutet locum, vel quod infixus sit tanquam clauus, igitur re hoc modo distincta dicere possumus dolorem renum fixum esse, q̄ nunquam commutat locum, sed semper in renibus cōsistat: pariterque coli dolorem fixum esse, quod tanquam acus aut spina, infixus sit colo. Postremò describit figuram, inquit intestinum hoc cellulose esse, vt diutius fæces retineantur. Verū his dictis sibi ipsi contradicit Mundinus, qui superius dixerat colon esse propè iecur, vt recipiat cholera ad expellendas fæces: Ego vero, vt concedam esse cellulose, & continere fæces, ad quas expellendas transeāt cholera, non tñ dico ipsum esse ppè iecur vt cholera recipiat. quæadmodū paulo añ dixi. De vermibus dicemus in cæci intesti anatomia.

Hoc

Hoc autem intestinum continuatum est in parte superiori cum monoculo siue cæco, quod dicitur monoculus, non quia nisi vnū habeat orificium per quod attrahitur ad ipsum, et per ipsum expellitur: quia hoc est impossibile: sed habet duo orificia vnum per quod attrahit, alterum per quod expellit. Illud autem per quod expellit non est sicut in aliis opposite locatum contra primū: sed ambo locata sunt iuxta se inuicem: & infra hæc orificia pendet lacuna huius intestini ad modū sacci: & ideo alio nomine vocatur saccus, et sic apparet ei⁹ figura, et colligātia, & locus etiā: quia locatū est in latere dextro supra & iuxta terminū anchæ, siue scię: & infra renem dextrū substantia eius est eadem cum substantia colon. agritudinem etiā patitur similem ei. Iuuamētū est vt pars succi q̄ venit ad ipsum in eo retineatur, & reuoluatur, et vt reuerberet v^l descēsum prohibeat citum ipsius succi ab intestinis superius.

CVRTII.

Queritur solet vnū ne tantū, an duo habeat orificia cæcum intestinum, quod monoculum nostrates appellāt: Dicere consueui, quod si pro sacco accipiatur, quatenus pendet, vnum solum habet orificium: si vero conferatur ad intestina, quę cum illo committuntur, duo. Quod ad utilitatem pertinet, vide-

videtur Mundinus deficere: siquidem superius dictum est crassiora intestina ad fæces cōgregandas, easque retinendas vsque ad commodum tempus, esse facta. Vermes autem, Auic. decimasexta Terrij, tract. 5. ait. in hoc præcipuè intestino, & colō detinentur, iuuantq; si parui sunt, quoniam generantur & nutriuntur ex ea materia quæ in nobis pertrahitur. Verum si hæc sententia vera esset, rectè facerent fœminæ, prohibētōs infantes ne dulcia edant, quia dicunt quòd vermes ascendere faciunt: Sed quando vermes non sunt, dulcia pro vermibus nō faciunt, neque eos generant, quinimo choleram gignunt: quæ vermibus contraria est. Ego vero sepe numero in anatomia diligenter scrutatus sum, neque ullos tamen nisi perraro inueni.

MUNDINI.

Et ista intestina superiora sunt gracilia et sunt tria. Nam huic intestino continuatur intestinum Ileon quod circa ilia locationē habet & situm & reuolutionem: & in isto fit iliaica passio, in qua est dolor vehemens circa ilia: & sic apparet locus, colligantia, & passio: & quia substantia eius est subtilior; ideo gracile vocatur, sicut propter primam causam vocatur ileon. Eius iuuamentū est; quia factum est vt cōtineat succum, vt quod vtile est possit exfugiri: ideo multum inuolutum est, & ad ipsum proueniūt plures venę meseraicę, quam ad aliquod aliud intestinū, & ab

& ab eis & à mesenterio debes ipsum excarnare: & quando ad partem eius superiorem iuxta stomachum peruenisti: tunc inuenies quod circa partem sinistra ad spondilos declinat, & valde est incarnatū cū mesenterio: & ideo cum cautela incide ne frangas aliqd.

CVRTII.

Dictum est quare hoc intestinum reuolutū sit, & qui vsus ex hac inuolutione capiantur, & quæ sit eius substantia, exponendum restat, cur Ileon dicatur, nam Mundinus ait dici Ileō propterea quòd sit circa ilia, verūm nominis similitudo. & græcarū literarum ignoratio Mundinum decepit, nam græcè quidem ἰλεον dicitur, non tamen ab ilibus, quod nomen latinū est, deriuatur, sed potius ἀπὸ τῆς ἰλῆς à quo verbo etiam deducitur ἰλιος, passio, scilicet ieiuni intestini præcipuè, quamuis etiam alijs gracilioribus intestinis accidat, est que dolor intensior & periculosior, quem vulgus Miserere mei vocat.

DE ANATOMIA IEIUNI.

Et post incisionem inuenies ieiunū intestinū quod taliter vocatur: quia vt plurimum inuenitur vacuum in bene dispositis. Et causa suæ vacuitatis est duplex: scilicet rectitudo eius; nam est rectum sicut intestinum vltimum. Secūda causa est multitudo cholerae puræ, q̄ peruenit ad intestinū hoc à cysti fellis p̄ cānalem, qui cōtinuatur cū intestino duodeno, cū quo istud immediate cōtinuat.

Ieiu

Ieiunum, dicitur quòd ut plurimum vacuum re-
peritur (ita enim inquit Mund.) Galenus autem in
Introd. inquit, Ieiuno tale est inditum vocabulum,
eò quòd nunquam quòd accipit continet: Sed hęc
forte etymologiam parui referre quispiam dixerit:
Illud tamē quòd ait Mundinus hoc intestinum esse
rectum, Rasis que ei ad stipulatur libro primo ca.
26. & Auer. collect. libro primo, cap. 26. non video
qua ratione defendi possit, & si quidam anatomi-
ci recentiores conentur illū defendere: Nam Gale.
libro quinto De vsu part. cap. 3. ait, Intestinum (de
duodeno loquens) nō est flexū, aut circumuolutū
voluit postea autē circū & flectit vocatū q; hęc
pars intestinorum vñ 519, hoc est Ieiunū, quòd semp
vacuū inuenitur, ne minimū quidē cibi in se ipso cō-
rinens, quòd idem clariùs explicat in Introd. cū
inquit. A Ianitore incipit Ieiunum intestinum, in
sinus vehementer implicitum: Sed in re tam per se
manifesta, quæ sensu percipitur, nihil opus esse ra-
tionibus, aut testibus censeo. Quare sequetur non
ea de causa vacuum fuisse hoc intestinum. Alterā
Iulius rei causam refert, quòd scilicet vacuū sit pro-
pter multam cholera, quæ ad ipsum à cysti fellis
defertur per meatum, qui duodeno intestino com-
mittitur. Verū Galenus, lib. quinto De vsu part.
ca. 3. plures affert causas, quas breuitatis cā omitto,
studiosus lector eas ex Galeno ipso peret. De hoc
etiam intestino Arist. De par. animal. tertio libro,
cap. 14. inquit, Fœminis pars nulla certa superioris
intestini est ieiuna: alia enim alijs ut fors tulerit.
Maribus autem pars proximè ante cæcum, aluūm
que omnibus est vacua, Sed hoc falsum esse cuiq;

protinus videri potest, nam Ieiunum cæco nō com-
mittitur, intercedit enim Ileon. Quod verò de for-
minis dixit, posset ea ratione defendi, vt dicatur
non esse in illis tam vacuum hoc intestinum, quia
non est tanta cholere copia, neque hepar tam ve-
hementer attrahit. Posset etiam aliquis superius di-
ctum hoc modo tutari: faterique Ieiunum intesti-
num, si extrahatur, protrahaturque, non esse cæco
proximum, quoniam Ileon intercedit. Sed si eo si-
tu consideretur, quo est in corpore, inuenietur cæ-
co proximum esse. Quare, si hoc modo intelliga-
tur Aristoteles, nihil erit, quod reprehēdi iure pos-
sit. Illud tamen aduertendum est dictionem illam
(proxime) in græco Aristotelis codice non esse: li-
cet eam interpretes: & Theodorus ipse addiderint.

¶ De anatomia Duodeni,

Et istud intestinum dicitur primum &
vocatur duodenum, quia eius longitudo vt
in pluribus est duodecim digitorū ad quod
intestinum cannalis quidam a cysti fellis p-
uenit: & ideo caue quādo excarnas ne istud
cannale incidas: sed incide intestinum duo-
denum bene inferius, & liga.

Et tunc incipiendo sicut incipiunt aucto-
res habes sex intestina. Primum est duode-
num. Secundum ieiunum. Tertium ileon,
& ista sunt gracillia & superiora. Quartū
monoculum seu cæcum. Quintum colon.
Sextum rectum.

Duod

Duodenum à mensura dictum, est enim duodecim digitorum, veteres $\epsilon\kappa\phi\upsilon\sigma\iota\mu$ appellabant, id est explantationem. Huius figura recta est, ne sit impedimento venæ, & magnæ arteriæ, quæ ibi implatur ad intestinum, ad quod peruenit meatus à cysti fellis. mirabilis autem in hoc meatu fabricando fuit natura, ut ait Galenus, nam per ipsum cholera duodenum ingreditur: Sed, ingressa ubi est, per eundem exire nequit. quod itidem fit in vesica: nã premas quantum libet vesicã, vrina semel ingressa eodem meatu nunquam exhibit. aduersus eos qui affirmant naturã non rõe, sed casu omnia operari.

¶ De anatomia Mesenterii.

Hæc enim omnia intestina videbis esse inuoluta cõtinuata alligata dorso sicut alligata sunt omnia viscera per quoddam membrum, quod vocatur encharus vel mesenterium à meseraicis quæ in ipso sunt dispersæ. Et vulgares Bononienses vocant ipsum interiglio: id est interiora tenens.

Istud membrum secũdum auctores substantiam habet compositam ex venis cordis, pãniculis, ligamentis, ut prædicta membra possit ligare ex substantia seposa & pingui, ut dura membra quales sunt spondyles cũ mollibus: qualia sunt intestina & alia viscera sine medio non coniungantur: ut molle à duro non patiatur: reliquas autem vacuitates, quæ sunt in hoc, replent substantiæ glandosæ

dofæ, quæ multæ sunt in hoc membro, & est vnum iuuamentum carniû glandofarum quæ in hoc sunt Aliud iuuamentum ẽ, vt fuffentet venas meferaiças, quæ in hoc difperfe sunt ficut nõ ẽ lõginquũ q̄ iftæ carnes fint factæ ad generandam humiditatem, qua in teftina fæces interdum humectent, vt lubricet cito ab inteftinis: & ideo videmus q̄ ftercus liquidum emittitur, dato q̄ cibaria fumentur dura: maxima tamen pars glandofæ carnis eft in parte fuperiori, in qua frequẽter cõgregatur propter propinquitatem ad fplenem, melancholia, ex qua caufatur melã cholia myrachia.

Hoc factõ eleua mefenteriũ, vel dimitte donec feceris anatomiam venarũ, quæ pro ueniunt ad ftomachũ & ad fplenem: ad quã vidẽdam, & aliorum membrorum, infla ftomachum cum cannula per portanarium & liga fortiter, & abfcinde inteftina. Et fac incifionem infra locum ad quem peruenit cãnalis a cyfti fellis ad inteftina.

CVRTII.

Mefenterium, inquit Mundinus, compofitum eft ex venis, panniculis, & ligamentis, Galen. tamen De vfu part. libro quarto, cap. poftremo. fi rectè eius dicta & diligenter perpendantur, non vult venas effe de mefenterij fubftãtia, Causa verò potiffima

*Inflatio
Stomachi
cum Cannula.*

fima ob quã mesenterim factum sit non ea est quã
 refert Mundinus: sed quam Gale. qui ait, Naturam
 voluisse deriuare venas, & arterias ad intestina,
 quæ, nisi aliquo loco firmatæ essent, cadente homi
 ne frãgerentur: quod ne eueniat, instituit mesenteri
 um omento implicitum, in quod recipiantur venæ
 & arteriæ. sunt autem etiam in eo glandulosæ que
 dam carnes, ad replendas vacuitates. Quare eius
 substantia erit ex panniculis, carnibus glandulo
 sis, pinguedine, & ligamentis, quibus dorso alliga
 tur. Est autem *μεσεντέριον* dictum eò quòd sit
ἐν μέσῳ τῶν ἐντέρων, hoc est in intestinorum medio.
 Vfus verò glandulosæ carnis in mesenterio secun
 dùm Mundinum est, quòd sunt tanquam substrata
 quedam venis meseraicis. Præterea, quòd humidi
 rates generent pro molliendis fœcibus: quod tamẽ
 Galenus secundo De semine, cap. vltimo omittit,
 propterea quod, inquit, manifestam nõ habet pro
 bationem. Ex his glandulosis carnibus mesenterij
 inquit Mundinus generari melancholiam. quã mel
 rachialem vocat. Galen. vero tertio De locis affe
 ctis cap. 6. ex Ianitoris inflammatione, quòd vide
 tur Auic. reprehendere prima Tertij, cap. de melã
 cholia. pro Galeno videtur stare Auer, quarto col
 lect. Vtunque sit, sanè inter omnes constat hanc
 passionem esse in ventre inferiori, ex qua nonnun
 quã materia ad caput attollatur, omnino hæc pas
 sio curatu difficilis est, q̄ ad mortẽ usq; cõsequatur.

De anatomia stomachi.

Viso de intestinis procedas & videas ter
 tium membrum: puta stomachum, de

quo debes videre illa sex, quæ de aliis. Primo locum pernotabis eius. Secundo situm: quia cū sit cella cibi stomachus: vt dicit Gal. 5. de iuuamē. membro. ca. 2. & ibi habetur totum quod dicitur de stomacho. Et dictū est de intestinis. & habetur ab Aliabate tertio suæ theoricæ dispositionis regal. ca. 25.

Est ergo locus eius in medio superioris & inferioris: dextri & sinistri: anterioris & posterioris.

Sed tu hic dubitabis quare stomachus non fuit positus iuxta os. Dico q̄ causa fuit duplex. Vna est quia iuxta os debent esse membra anhelitus propter attractionē aëris. Secunda quia membra s̄cum receptiua debent esse continuata cum stomacho: talia autē infra diaphragma debent esse cōtenta.

Et ideo vides q̄ stomachus superius habet cor mediante diaphragmate inferius mesenterii & intestina. A dextris habet hepar a quo apprehenditur quinq; suis pennulis, sicut manus quæ apprehendit & capit quinq; digitis: & a sinistris habet splenem, quo calefit, ratione arteriarum eius, a parte anteriori habet ^{omphalum} zirbum, a posteriori musculos dorsii, & venam magnam, & arteriam, quæ transit supra dorsum, vt postea videbis: & ideo

locus

locus eius est in medio; quia est sicut cella cibi communis omnibus.

Situs autem eius est, quia licet sit locatū supra dorsum: pars tamen eius superior declinat versus sinistrum: inferior vero ad dextrum, ut patuit in Anatomia anni 1562. 24.º. v. c. 11.º.

Et causa istius situationis fuit, ppter causas, quę dicētur in anatomia hepatis: nā hepar debuit esse in laterē dextro eleuatū: & cū sit magnum totam concavitatem dextrę partis superiorem occupavit: splen autem nō: & ideo in dextro non potuit pars superior stomachi collocari, sed in sinistro.

Pars ergo inferior debuit ad partem dextram declinare: quia in parte sinistra inferiori iuxta renes est intestinum colon grossum multū: inuolutum multis inuolutionibus; & sibi occupat magnum locum. Sed in parte inferiori dextra sunt intestina gracilia & subtilia, q̄ paruū & modicū occupant locū: & iō stomachus quātū ad partē inferiorem debet declinare ad partē dextrā, vt repleat concavitatē ibi existentē, & cedat locū colo.

Sed tu dices quare stomachus non fuit locatus directe supra spondyles dorſi.

Dico q̄ causa huius potuit esse triplex. Vna quę dicta, est vt cederet hepatis in parte

dextra, & repletur vacuitatem in parte sinistra. Alia causa fuit, quia si stomachus esset directe locatus supra dorsum, tunc orificia duo, scilicet inferius & superius essent directa. Et ideo in homine cum sit staturæ recte stomachus non bene contineret cibum, sed descenderet ab eo statim: vt ergo hoc non contingat sic fuit situatus. Tertia causa huius fuit quod quantum ad os eius superius, & partem superiorem debet recipere melancholiam a splene, quæ est in parte sinistra: & quantum ad partem inferiorem debet recipere cholera ab hepate quod est in parte dextra. Et ex hoc apparet scilicet quis sit loc^o & situs eius scilicet stomachi.

Colligantia consequenter apparebit melius: quia colligantiam habet cum splene, cum hepate, & cum corde, & cum cerebro, & illud consequenter declarabitur, quia apparebit quod cum splene habet colligantiam propter venas quæ apportant melancholiam ad os stomachi: & propter venas, quæ veniunt ad latus sinistrum stomachi ad nutriendum: sicut cum hepate habet colligantiam, ratione venarum reliquarum, & cum cerebro propter nervum qui venit ad os stomachi, qui expanditur maxime circa partem superiorē stomachi.

Cum

Cum corde vero habet colligantiam ratione arteriæ magnæ, quæ sub ipso est.

Ex his potest apparere tertium. scilicet cuius figuræ sit, quia est figuræ rotundæ: quia talis figura magis est a nocumentis remota. Item quia omnium aliarum est capacissima. Stomachus autem multa debet continere, sed non est perfecte figuræ rotundæ, sed arcualis magis, propter causam dictam: quia pars superior eius est declinans ad sinistrum: inferior vero ad dextrum ad modum cucurbitæ retortæ, vel sarraceniæ: verum omnia quæ dicentur de stomacho melius apparebunt per anatomiam membrorum sequentium.

Patet etiam quartum, scilicet quæ sit quantitas stomachi: quia magnus valde, cum interdum ipsum oportet recipere & continere magnam quantitatem cibi: verum quod non est semper in magnitudine sui vltima, sed æquatur magnitudini contenti: quia extensibilis, & corrugabilis.

Quinto autem videas partes & numerum partium eius: partes autem eius sunt duplices, scilicet vniuersales, & integrales. Quædam vero quantitatiuæ & determinatæ. primæ sunt duæ tunice eius. Prima intrinseca est neruosa. Secunda, & extrinseca est car-

nosa . verū est q̄ prima est spissior secundā: quia illa primo debet contangere cibum: & ideo vt non ledatur ab eo debuit esse spissa. Item propter aliud: quia stomachus p̄pter illam tunicam est extensibilis, quia requiritur interdum vt extendatur propter multā quantitatem cibi, sed exterior: licet requiratur p̄pter digestionē fuit subtilior: quia digestio, stomachi iuuat a mēbris vicinis circumstantibus: sed extensio & continētia cibi non.

Et istæ tunicæ non solum diuersificantur in substantia, quantitate, & loco, sed situatone villorum: quia in prima cum in ipsa sit appetitus: & appetitus immediate ordinetur ad attrahendum villi fuerūt situati ad attrahendum: tales autem sunt longitudinales: & ideo in ea sunt villi longitudinales: & q̄a attractioni statim cōiungitur retentio: quia omne q̄ attrahit̄ attrahit̄ vt retineat̄, & retinetur vt digeratur: vel quia membrum voluptetur. Hinc est q̄ in hac etiam tunica fuerunt positivi villi transversales, qui deseruiunt retentioni. verum est q̄ illi sunt locati in parte non interiori illius tunicæ, sed exteriori. In secunda vero cū ipsa ordinēt̄ ad digestionē & digestionī seruiat: ex cōsequenti q̄a ei consequitur expulsio fuerunt positi villi lati

tudi-

tudinales. Et ex hoc apparet quare intrinseca tunica fuit nervosa: & carnosam non fuit intrinsecam propter villos longitudinales qui debent esse in tunica intrinseca, quæ est, vel debet esse principium appetitus. Item alia causa est, quia intrinseca ordinata est ad sentiendum: extrinseca ad digerendum & ad alterandum. Nunc autem sensatio melior fit quando sensibili immediate occurrit sensus vel membrum sentiens: alteratio vero potest fieri per medium & digestio. & hoc est quod expresse ponit Avic. cap. de membris. primo cañ. fen. prima. Et natura quidem intrinsecam tunicam: scilicet stomachi fecit nervosam: extrinsecam vero carnosam: potest namque digerentis operatio ad id quod digestum est in potentia sine occursum provenire: sentiens vero id quod sentitur non potest sentire nisi obviando ei sensu tactus.

C V R T I I,

Qua de causa non fuit stomachus prope os positus, ratio est apud Galenum, quarto libro De usu part. cap. 1. Cur verò supra dorsum fit, vera est à Galeno relata causa, quarto itidem De usu part. cap. 7. inquit enim, Oportebat naturam fabricare Iecur, Stomachum, & Splenem: Stomachusque in medio ponendus erat: Iecur, quoniam nobilius membrum erat, dextrum locum obtinuit, Splen sinistrum. Quia vero Splen choleram trahit à Iecore, ut id

com-

cōmodiùs fieret, natura inferiori in loco splenem posuit, in altiori autem Iecur. Igitur Initium stomachi est in Ieua, quia pars illa supra splenem vacua est. Sed quoniã Iecur in altiori loco est, ideò oportuit stomachum transcuntē sub Iecur locari in medio, & ex vna quidem parte esse in dextra, ex altera verò in sinistra, ea scilicet vbi est orificium: nam cum fundum stomachi sit Iatius, meritiò in dextra parte positum fuit, contra summum ipsius, vt pars minor esset in Ieua. Illa verò Mūdini ratio, qua probat stomachum non potuisse locari directè, supra dorsum, nulla est, quia orificium stomachi non est inferiùs directè, sed in pre laterali, quare, etiam si in medio directè esset Stomachus, non modò orificium esset à latere, non exire posset cibus nisi in tempore. atque ideò ratio hæc nihil valet. Sed neque illa magis probat, cum dicit, propterea quòd splen transmittit melācholiã ad os stomachi, ideò non potuisse stomachum directū esse. Nam sit stomachus directus, nil prohibet, quin rã commodè recipiat melancholicum humorem, ac si esset à latere, quoniam per meatum immittitur. Quare ea tantum causa vera erit quam primo loco adduxit. Atque hæc quod ad situm attinet dicta sint. Quod ad colligãtiã autem, aperte Mūdnus ait stomachum iūctum esse cerebro, per nervos: cordi, per arterias: Iecori, per venas: spleni, per venam, quæ melācholiã ad os stomachi defert, de qua non nihil inferiùs loquemur. Figuram habet rotundam, propter duos illos usus, quos Gale. quarto De vsu part. cap. 7. refert. quoniam hæc figura est minimum omnium passioni obnoxia: & quo-

quoniam capacissima est. Non est tamen perfectè rotundus, quoniam (vt eodem in loco ait Galen) infernè quidem ἐκφύσις, id est explantatio, ad interna est: supernè autem ad oesophagum ipse aduenit. quod clariùs ostendit etiam octauo De vsu part. cap. 11. Illud etiam notandum est quod dicit Galen. quod, qua parte ascendit per spondylos, quãdam gibbositatem, & concauitatem generat, idè Mundinus ait similem esse cucurbitę retortæ, nam dum à sinistro in latus dexterum tēdit, cum dorsum sit eleuatum, inflectitur quodammodo. Quantitatem autem stomachi notabilem esse oportuit, quoniam tantum debet cibi continere posse, quantum in diem sufficiat, quemadmodum declarat Galen. tertio de facult. naturalib. ca. 4. Et quarto. de Symptom. causis, cap. 7. ait, oportere stomachum, vt in sua naturali dispositione constet, contrahi circa rē contentam: adeo vt nihil inter ipsum, & cibum interit. hinc est quod qui fluctuationes in stomacho sentiunt, nō bene se habet stomachus, quod plerique contingere opinantur ex infirma digerēdi virtute, sed falluntur: quoniam huius rei vera causa est quod non bene continet, quemadmodū vas aliquod non plenum fluctuare solet. contra, cū stomachus circa cibum ita contrahitur, vt nihil mediū sit, tunc fluctuationes illæ fieri nequeunt. Acq; optimum signum est ad cognoscendum infirmāne an potens sit retinēdi virtus. cum enim est debilis stipticis solemus vti. Hoc igitur requiritur ad retinendi potentiā vt stomachus circa cibum contrahatur: Verū hoc satis non est, nisi etiam contract⁹ persistet, usque dum cibum digeratur, Idem est de vesica

Vesica, & Matrice sentiendum, & in vniuersum de omni membro, quod aliquid contineat. Stomachi partes inquit Mundinus esse alias vniuersales, alias particulares quas quantitativas & determinatas vocat. Vniuersales sunt quæ stomachum circumdant: eaque sunt duæ tunicæ. Dicitur est autem superius de harum tunicarum numero. Et Galenus quinto De vsu part. capi. 11. de his agit, Et quarto, cap. 8. inquit interior tunica membranosa est. non tamen dicit nervosa. Est autem sciendum, quod dupliciter intelligi potest, tunicam interiorem nervosiorē esse: aut enim dicimus esse nervosiorē, id est magis duram, non quod nervos habeat, aut plures habere nervos à cerebro demissos: atque hoc modo intelligendum est de parte superiori oris stomachi: in qua natura nervos posuit, ut maximè sentiret famem, appetitūque generaretur, ex Galeni sententia quarto De vsu part. cap. 7. Tota vero tunice interioris substantia nervosior est id est durior. huius autem rei causam affert, ex Gale. sumptam, quarto libro De vsu part. cap. 8. Quia prior omnium tunica interior cibi occurrit, huius autē sunt duriores, quare ne ab ipsis lædatur durior est effecta. quod non item est dexterioris, quæ cibum non contingit. hoc autem verum esse vel ex eo videre licet, nam quo magis tunica illa ori accedit propius, hoc durior fit. nam stomachi, & eius, quod Meri vocant tunica eadem est continuè: est autem quæ ori accedit propius (ut dictum est) durior, quoniam cibi occurrit purioribus. Quod verò dicit Mundinus interiorem tunicam nervosiorē fuisse, & crassiorē, ut in cibi completēdis extendi posset: ratio non valet

valet, quoniam si interior extenditur, magis extē-
 di oportet exteriorē: ergo si ea de causa, interior
 tunica crassa fuit, vt extendi posset. ob eandē con-
 sentaneum erat exteriorē crassiore fuisse: cū ma-
 gis, quā interior, extendatur. Neque, quōd cras-
 sior sit, confert quicquam ad digerendum, quoniā
 ad hoc profunt Iecur, & Splen. Hæ autē tunicæ
 inter se differunt, inquit Mundinus, etiam villorum
 situ: nam, quæ interior est tunica rectos habet vil-
 los, ad attrahendum, in cuius parte exteriorē sunt
 obliqui, vt retineāt. In exteriori autē tunica sunt
 villi transuersi, quorum munus est vt expellant.
 Atque hoc non in stomacho solum est verum, sed
 etiam in arterijs. Quod verò dicit, in exteriori tu-
 nica villos transuersos conferre ad digerendū, fal-
 sum est: quia sequeretur transuersos villos, qui eo-
 dem modo sunt in arterijs, prodesse ad digerendū.
 Iam autē dictum est villorū huiusmodi pro-
 prium munus esse, vt expellant.

MUNDINI.

Aliæ vero sunt partes eius quantitatiuæ
 & determinatę, vt pars superior & orificiū
 eius inferius quod dicitur portanariū: pars
 eius superior secūdam naturam angustior
 est parte inferiori: quia in inferiori debet fieri
 digestio & cibus debet contineri: in superio-
 ri non.

Orificia tamen harum partium conueni-
 unt & differūt. Conueniunt quia ambo po-
 sita sunt a lateribus stomachi: & non sunt po-
 sita

sita vel facta in vltima eminentia partis inferioris & superioris: sed pars inferior descendit magis quam portanarium vel piluron, vt cibus non descendat, sed contineatur in ea vt in bursa quadam sicut superior supereminet ori stomachi: vt quādo stomacho repleto homo inclinaretur non reascendat cibus ad meri, & os: & specialiter quādo multum repletur stomachus. Ex hoc pōt videri quare ex superflua quātitate cibi diaphragma comprimitur & cibus non egreditur.

Item cōueniunt quia ambo orificia sunt in stomacho in loco in quo continuatur vel alligatur dorso. nam os stomachi est recte in principio suæ alligationis dorso alligatum: & propterea alligatum est os stomachi ad spōdylem vbi finitur & terminatur diaphragma: & ista est. xiiij. spōdylis eo quia in. xij. est costa vltima mendosa ad quam terminatur diaphragma.

Et ex hac apparet tibi q̄ quando vis exterius alterare vel confortare: vel aliter operari circa os stomachi, q̄ optimum est in dorso circa. xij. vel. xiiij. spondylē hoc facere: & specialiter quando prædicta impugnantur ab hepate & splene: dummodo arteria aorta non impediatur, quæ in dorso est. Sequētibz

auxem

spōdylis
nodus seu
vertebra
spinae d̄r.
in spina
spondyli
for sunt
et 20. quoz
7 Collum
sp̄ritunt.
2 Toracē.
5 alij lūbos.

autem spōdylibus, quę vocantur spōdyles renū alligatur stomachus vsq; ad portanarium, tunc vero alia pars inferior a spondylibus obliquatur versus sinistram: & ideo cōueniunt illa duo orificia.

Differunt etiā quia superius orificium quod vocatur os stomachi est magis latum quam inferius portanariū. Et hoc fuit quia per os stomachi: aliquādo cibus grosse substantiæ & duræ debet descendere & indigestus; & ideo os stomachi debuit esse latum. Sed per orificium inferius tantum res subtiliata & digesta debet egredi: & ideo nō fuit ita latum & hoc de partibus eius.

Ex quibus apparet sextum quod debet inquiri de stomacho: scilicet quæ sit eius substantia: quia apparet quod cum nervosa tunica sit maior in eo quod substantiæ nervosæ sit a dominio.

Ex hoc apparet quæ sit complexio eius: quia frigida & sicca.

Apparet quę operatio vel iuuamentum: quia duplex: vnum ad appetendum cibum pro toto per tunicam intrinsecam: alterum ad præparandum cibum ad nutrimentum totius: & hoc per tunicam extrinsecam carnosam & membra coadiuantia.

Et ex his potes videre quod potest pati ægritudines omnium generū a quibus possunt compati alia membra omnia principalia: vt hepar, cor, cerebrum: & ex consequenti totum corpus. Curatio tamen earum proprie ex anatomia huius non dependet plus quam aliorum. Et hæc de stomacho.

C V R T I I.

Post vniuersales accedit ad particulares, easq; rursum in superiorem & inferiorem partem diuidit: illa angustior est, hæc magis ampla. atq; hoc in homine: nam in alijs animalibus, vt Galen. ait lib. quarto De vsu part. cap. 7. pars anterior, quia pro na incedunt, latior est. Deinde sunt duo orificia, quæ conueniunt quia sunt à lateribus Stomachi: nam superius orificium ad sinistrum latus vergit, inferius autem ad dextrum. Sed quantum ad superius orificium, cum stomachus plenus est vndique extenditur, atque ideo hanc rationem non afferbat Gal. quod à latere sit, vt facilius claudat. Alligatur autem os stomachi inter duodecimum, & decimumtertium spondylum, quo in loco finit extrema costa. Ex hoc dicit Mundinus in passionibus oris stomachi inungendam esse partem posteriorem, dorsum scilicet, quo loco, os stomachi alligari dictum est. atque id ex Galeni sententia, qui decimotertio lib. Methodi med. ait, laborante gula, aut quando os ventris phlegmone vrgetur cataplasmata super spinam dorsi imponimus. Differunt autem ea duo orificia, quonia inferiorius est strictius, superius autem magis amplū. atque hoc
opri-

optima ratione, inquit Galenus, factum est, quoniam per superius duriores res transeunt; inferius autem ideò angustius esse debuit, vt cibum contineat, quoad digeratur. atqui non modo angustum esse satis est, verùm etiam in quibusdam animantibus posuit natura carnem glandulosam, qua orificium clauderetur inferius. Præterea quoniam digestus cibus per hoc transit. Hoc Galeni dictum notandum est, quod omisit Mundinus. Si aduertas (inquit) videbis gulam stomachi esse partem quãdam, quæ cum ad stomachum venit paulatim dilatatur. Si verò inspicias Duodenum intestinum, cognosces, quòd non est explantatio stomachi, quæ eadem habet latitudinem, quam orificium à quo oritur. Præterea eadem sunt, tunica stomachi, & gulæ, Intestina autem (vt diximus) & si duas habeant tunicas vnum tamen solùm genus villorũ habent. Stomachi substantiam Mundinus ait esse neruosam. Sed dixerim ego quod, si cum panniculis & membranis conferatur substantia eius magis carnulenta dicetur, quàm neruosa: comparata verò cum membro molliore dici poterit neruosa. Temperamētum eius innatum frigidum est & siccum. de quo plenius alibi tractabimus. Vt usus est, vt appetat, & digerat. Hoc loco superpondij vice addamus, Quo nam modo nutriatur stomachus, cum dictum iam sit venas meseraicas per mesenterium transeuntes chylum ab intestinis ad Iecur deferre, ergo nihil relinquitur pro stomachi nutrimento. Dico ego, de Galeni sententia, quatuor modis nutriri stomachum, ac primùm ex venis ijs nutritur, quæ veniunt à vena caua, terminanturque sto-

macho. Deinde ex venis, quæ per mesenterium, & omentum terminantur, stomachoque & ipsæ terminantur. Præterea nutritur chylo, quem pro sui nutrimento retinet, quem admodum faciunt etiam intestina. Demum nutritur ab Hepate, à quo per easdem venas reuocat nutrimentum, cum aliunde non habet, vt asserit Galenus tertio libro de naturalibus facult. cap. 13.

De anatomia splenis.

Splenis Anatomia perfecte videri non potest nisi abscindas costas aliquas mendas ex latere sinistro: quas non perfecte eleues: sed vt sufficit operi tuo, quibus abscisis locus splenis tibi apparet: quia parieti sinistro stomachi adhæret quantum ad concauum eius: quantum vero ad conuexum alligatur dorso & siphac mediantibus panniculis subtilissimis, ortis a siphac. Apparet secundo quod locus eius non est ita in alto, sicut locus hepatis.

Figura eius est quadrangularis: quia in homine est quasi ad modum quadranguli propter figuram stomachi: cuius concauitatem circumstantem in parte sinistra habet splen replere.

Tertio vide quantitatem eius quia in homine satis proportionabilis est in quantitate respectu aliorum membrorum.

Colligantia vero eius est: quia colligantiam

tiã habet ad cor, hepar, mesēteriũ, zirbũ, & stomachũ. Colligantiam vero habet ad omnia ista membra, præter cor, per venam quę venit a porta hepatis ad splenē, quę colligantia apparet: nam si excarnando procedas videbis quę a vena cõcaua hepatis peruenit vena magna ad splenem, a qua descendit vnus ramus in medio trãsitus eius inferius ad mesenterium ad ipsum nutriendum, & portat sanguinem aquosiorẽ & humidiorẽ: postea quando ista vena approximatur spleni iterũ vnus ramus ramificatur ab ea: qui vadit ad nutriendum partem sinistram inferiorem stomachi: postea vero peruenit ad splenem & concauitatem eis. Et ramificatur in concauitatem ipsius in duos ramos: scilicet inferiorem & superiorem: & descendit inferior inferius ad nutriendum zirbũ, quantum ad partem sinistram: sed superior transiens per concauitatem splenis ramificatur in duos: quorum vnus peruenit ad partem superiorem sinistram stomachi ad nutriendum superiora: alter vero circa orificiũ peruenit stomachi, ad portandum melancholiam, quę mulgendo profluit ad os stomachi vt incitet appetitum. Quod vero remanet in splene ipsum nutrit. Et ex hoc apparet ti-

*nota quę à splene
ne prouenit
vna ad ipsum
non sic vna
melancholiam
deseruit. quo
in partem ali
si offendi se
dicit.*

bi cūm quibus mēbris alligantiā habet splē
mediante vena.

Colligantiam autem habet cum corde
per arterias, quę ad ipsum veniunt ab arte-
ria ad horti, quę in dorso est infra diaphrag-
ma: a quibus arterijs stomachus multum ca-
lescit in latere sinistro: vel a splene ratioē ista-
rum arteriarum: & hæc fuit vna causa qua-
re arteriæ multæ & magnæ veniunt ad sple-
nem, sicut alia causa fuit, vt calore arteriarū
sanguis grossus, qui est nutriturus splenem
subtilietur & digeratur: quia splē habet sub-
stantiam raram in quam debet recipere hu-
morem grossum melancholicum.

Et ex his apparet tibi quintum quod de-
bes videre de splene scilicet, quę sit eius sub-
stantia, quę est rara & spongiosa.

Propter quod apparet sextum: scilicet cu-
ius complexionis sit: quia in comparatione
ad cutim calidæ & hūidæ, licet essentialiter
sit frigidæ & siccæ, propter nutrimentum.

Iuuamentū patet: & ex his tibi apparet q̄
cū recipiat et cōtineat humorē melācholicū,
grossū & ineptū euacuatiōi q̄ frequē replet:
oppilat & apostēat: & resoluētia fortia tunc
multū resoluūt substātiā ei⁹ si sint fortia: da-
to q̄ rōe humorū cōpetāt. Et hæc de splene.

Sicūm

Sicū esse splenis in sinistro latere inferius, constat. Cuius figuræ ratio hæc est. Splen, quoniam stomacho, qui rotundus est, adheret: ideo ex ea parte qua contingit stomachum concavam habet figuram, ex opposito vero gibbam: vniuersus quadrangularis est, sed oblongus, quod fit propter venas, quas per eum transire ferunt. Huius quantitatem (inquit Mundinus) esse ad proportionem aliorum membrorum. De qua notatu dignū est quod dicit Gale. quinto De vsu part. cap. 6. vbi æqualitatem naturæ admiratur, in instituendis Splene, folliculo fellis, et renibus: unde tres sunt in nobis superfuitates, quæ separari à sanguine dicuntur, melancholia, cholera, vrina: paucissima est superfuitas melacholica, copiosior cholericæ, vtraque abundantior aquosa: crassissima melancholica, mediocris cholera, subtilissima aquosa. Paucæ. & crassæ superfuitati, & per longam viam ducendæ maximum, & rarissimum organum supposuit, quod collocauit sinistris partibus ventris cholericæ paruum dedit. Galenus igitur dicit melancholiam paucam esse, tamen, quoniam oportebat per longam viam deduci, ipsa verò rebellis est, neque pars trahi, naturam instituisse maiorem splenem, vt potentior esset. Verum cystis fellis, quia magis propinqua est quo deducitur, & quia facilius trahitur, ideo fuit minor. Colligationem splenis declaras Mundinus ait, colligari cū corde per arterias: cum alijs autem per venas. Dictum est plures venas venire ad stomachum & intestina per mesenterium. Gale. in lib. De anatomia venarum. In stomacho, ait, & Intestinis quasdam esse tanquam radices, quæ nu-

trimentum pro toto corpore accipiant. Et De usu part. cap. ultimo, ait. Quam plurima quidem ad vnum quodque intestinum officia venarum, velut arboris alicuius radicum extremi, & subtiles termini finiebantur. Colligit autem natura, sicut in arboribus subtiles illas radices ad crassiores, ita in animalibus vasa minora, ad maiora & hæc rursus ad alia maiora, idque semper facit usque ad hepar, donec omnia ad vnã venã reduxit, eã quæ porta dicitur: quod ipsam nutrimentum in animal immittitur. Hæc autem in octo quasi surculos diuiditur: quorum duo adeo parui sunt, vt vix sensu percipiuntur, priorque ad Duodenum tendit, alter ad Ianitorem. Quod autem ad Ianitorem attinet, diximus fundum stomachi inferius maius esse, quàm superior sit pars. si autem perspiceret aliquis stomachum extractum atque inflatum, videret inferiorẽ partem in acutum desinere: sed non existimandum esse partem illam acutam fundum esse stomachi: est enim Ianitor, ad quem secundus ille ramus peruenit. Tertius est ad nutriendam cauam partem stomachi. Quartus ad splenem accedit: atque is est, quem Mundinus ait dimittere venas quasdam minimas in corpus, quod alcharas vocant, Galeno dicitur πένυρας, est enim glandulosum corpus, quod vasa mesenterij diuaticata fulcit, ea, quæ ad intestina transmitti oportet. Cum verò vena ista prope splenem accedit (nam in Auic. codice corruptè legitur Cum iungitur spleni) reuertitur vnus ramus ad stomachum: rursus ingreditur concauum splenis in medio, atque ita pars vna ascendit, altera descendit. Quam rem declarans Galenus ait, hoc semper

per eodem modo non reperiri: communis autem
 modus in quo reperitur hic est. Cum vena ingre-
 ditur splenem pars vna ingreditur splenem, altera
 descendit: atque haud ita multum supra ingressum
 in splenem, egreditur furculus vnus qui ad stoma-
 chum tendit, alius infra splenem oritur, qui omen-
 tum petit. velle autem videtur Mundinus, in ramo
 venæ, cum splenem ingressa est, inueniri duas ve-
 nas, vnã, quæ ad stomachum, alterã, quæ ad
 os stomachi ascendat. Verum Galen. ait hoc raro
 contingere, vt sint duo rami, vtrique ad stomachũ
 tendentes. Ego quoque hoc rarissimè vidi. Sed du-
 as quidem venas vidi, vnã ad stomachum eun-
 tem, alterã ad omentum. Illud tamen fateor, ve-
 nam eam, quæ venit ad stomachum, pertingere vs-
 que ad os stomachi. Quod verò inquit Mundinus
 Venam eam, quæ ad stomachum tendat, portare
 melancholicum humorem, ad incitandam famem,
 Docui aliàs id esse falsum. Galen. quinto De vsu
 part. cap. 4. Naturam, ait, prouidisse, vt phlegma-
 ta ab intestinis expurgentur, per choleram, quæ ad
 ipsa transmittitur. Quod si in stomacho generare-
 tur phlegma, non instituisset choleram: in ipsum
 demitti, quia vomitum excitaasset frequentem: nã
 medici volunt vomitum fieri quidem, sed bis sin-
 gulis mensibus: vt purgetur stomachus. Qui verò
 vomere non possunt, comedant balsameta aliqua,
 quæ possint ad expellendum. At melancholia ad
 stomachum transmittitur, non vt appetitum exci-
 tet, sed vt cõtinendi virtutem adiuret. Quintus est
 ramus, qui ad intestinum rectum descendit vt si
 quid chyli superest attrahat. Sextus ad dextrã sto-

machi & omenti tendit, eiusque idem munus est,
 quod vena, quæ ad splenem pergit. Septima ad co-
 lon, Postrema ad gracilia venit intestina. Quoni-
 am autem quis fortasse quæret, quid sit quod natu-
 ra venam, quæ ad stomachum tendit, transmiseric
 prius ad splenem: Dicimus aut quod facta ideo sit
 ut humorem melancholicum in stomachum defe-
 rat, ut contentricem adiuuet: aut quoniam melan-
 cholico sanguine stomachum nutriri oportuit. quo
 pacto etiam vena quæ venit ad omentum, à sple-
 ne melancholicum sanguinem trahit pro omenti
 nutritione. Si qua vero ad stomachum peruenit,
 prius quam splenem ne attingat quidem, id fit ut
 iecur à stomacho, rursùmque stomachus à iecore
 si opus sit alimentum trahit. Officium splenis est
 ut trahat melancholicum sanguinem à quo nutriti
 tur: quare factæ sunt arteriæ, quibus sanguis ille de-
 puretur. Alias etiam causas refert Galen. quarto
 De usu part. cap. 15. quare plures arteriæ veniant
 ad splenem, præcipuèque ut sanguis per arterias
 subtilior efficiatur. Deinde ut arteriarum sangui-
 ne nutriatur splen: nam hepar rubro sanguine, &
 crasso nutritur, splen nigro subtiliori, pulmo, flavo
 & spirituosus, atque hic sanguis in corde digeritur,
 hepar nutritur sanguine à se digesto, splen autem,
 quoniam humor quem attrahit crassus est, ipsum
 autem subtiliori sanguine nutriri oportet, ideo na-
 tura instituit arterias, quibus crassus ille humor elab-
 ore tur: ac niger quidè restat, Sed laborat? fit sub-
 tiliior, atque ita alit splenem. præterea arterijs in sple-
 ne opus fuit ad fuliginosas superfluitates expellen-
 das, quæ sunt in melancholico humore. His dictis,

super-

superest utilitates splenis exponere. Dicitum est autem splenem ab Hepate melancholicum humorem trahere, eumque depurare. Volunt etiam nonnulli splenē à stomacho chyllum attrahere, eumque digerere: habentque Galeni sententiam in lib. de usu anhelitus. quo in loco miratur plerisque dicere nullum esse splenis usum, eumque, qui sit, solū Aristotelem nouisse. Sanè Aristoteles tertio De partib. animal. capi. 7. Iecur & lienem ait ad cibi concoctionem iuuare, propterea quòd calidam habeant naturam. Hoc tamen manifestum est, splenē ab Iecore non attrahere quod digerat, sed sanguinem solū melancholicum: nam, teste Aueroë in paraphrasi de animalib. Lien sanguinem ex se nō gignit: cuius rei signum illud est, quòd vna vena à stomacho ad splenem protenditur, qua stomachus à melancholia expurgatur: non chylus trahitur. Quod ex Galeni auctoritate obijcitur nihil facit, quoniam satis constat librum illum non esse Gal. Aristotelis autem verba ita exponit Albertus, splenem iuuare, ad concoctionem, quoniam calefacit stomachum, non tamē quòd trahat, sed quòd adhæreat. Dicere autem posset quisptam Galenū tertio De facultatib. naturalib. cap. 13. afferere splenem attrahere ex iecore: Ego autem dicerem hoc posse fieri cum maximè egeret nutrimento, non quòd semper trahat vt sanguinem digerat.

De anatomia epatis.

HEPAR manifeste vides esse locatū in dextro latere amplectens stomachum superius eleuatum valde, & non decipiat te quod

in ani

in animali mortuo multum locatur sub costis, quia non est sic, cū sit sub diaphragmate & diaphragma extremis costarum cōiungitur. sed hoc euenit quia membra spiritalia multum euanuerunt: & ideo vacuitate eorum replet hepar comprimēdo diaphragma: & ideo debes trahere inferius & animal siue corpus eleuare.

Et considera secundo quantitatem eius maximā in homine, cum sit animal calidū.

Tertio respicias partes eius, quarum quędam sunt intrinsecę integrales: quędam vero extrinsecę magis: intrinsecę integrales sunt quinq; pennulę eius: licet in homine, non semper sint abinuicem separata: & quęlibet illarum pennularum est composita ex venis diuisis & dispersis per eas in modum retis, cuius retis vacuitates repletę sunt carne, quę est proprie substātia hepatis, quę est sanguis coagulatus. & in his venis continet chylus, qui diuisus est ad minima, & secundum minima alteratur, & cōtangitur ab hepate: & ideo fit vt quasi totū hepar contangat totum chylum: & hoc ordinauit natura vt melior fieret & perfectior conuersio chylī in sanguinem: quia alteratio quę fit secundum minima melior siue perfectior est.

Sed

Sed tu dices quare natura non sic ordinavit in stomacho: sed in stomacho posuit concavitatem unā. Dico quod hoc fecit quia in stomacho non debet fieri perfecta digestio sicut in hepate. Item quia in stomacho assumuntur cibaria grossæ substantiæ quæ non possent per strictissimas vias penetrare. sed ad epar substantia tantum liquida dicitur pervenire & penetrare. Et ista decoctio si fiat in toto hepate: magis tamē fit in parte superiori. Et propterea pars illa solidior est & magis compacta.

Partes eius extrinsecæ sunt partes eius quibus mediantibus habet cum alijs colligantiam. nam cum corde habet colligantiam per venā chyli, quæ oritur a gibbosa parte hepatis, & per arterias, ut videbis in anatomia cordis, & venæ chyli. habet colligantiam ad diaphragma cui suspenditur: & ad spondyles siue dorsum, cui alligatur per pāniculum eius.

Pāniculus autem eius est duplex: scilicet cooperiēs vel circūvoluens, & suspendens. Primus est substantiam suam velans. Secundus est suspendēs ipsum ad diaphragma superius. Ex primo patitur dolorē extensiuū. Per secundum patitur dolorem aggrauatiuum

uum materia aggrauante.

Quædam vero sunt partes quæ sunt or-
tæ ab eo: & istæ sunt duplices: scilicet venæ,
& cannalis chystis fellis: de canali hoc pos-
tea videbitur.

Venæ autem sunt duplices scilicet chylis
quæ oritur a gibbositate hepatis, & cõcaua
siue porta, quæ oritur a cõcauo hepatis. De
anatomia chylis postea videbitur.

Portæ autem sunt quinque rami intrantes
hepar sicut sunt quinque pennulæ iam dictæ
hepatis.

Egredientes vero extra hepar sunt octo:
duæ parvæ, in quibus nõ labores ad discer-
nẽdũ: quia sufficit tibi si sequẽtes discernes.

Sex autem aliarum. Prima vadit ad dex-
trum stomachi ad nutriendum tunicam ex-
teriorem eius: & specialiter partẽ inferiorẽ.

Secunda vero vadit ad splenẽ, cuius ana-
tomiam iam vidisti in anatomia splenis: & il-
la est satis magna, & bene discernibilis.

Tertia tendit ad latus sinistrum, & vadit
ad intestinum rectum ad exigendum humi-
ditatem a cibo si quid remansit iuuatiui.

Quarta vadit ad superiorem partem de-
xtram stomachi ad nutriẽdum ipsum in op-
posito eius, quæ veniebat a splene ad latus

fini-

sinistrum.

Quinta pars diuiditur: quia vna vadit ad dextram partem zirbi ad nutriendū zirbum: in opposito illius quæ veniebat a splene, quæ veniebat ad nutriendum sinistrū zirbi. Alia vero pars vadit ad colon ad fugendum quicquid est in ipso, & ad nutriendum ipsum: & propterea in parte dextra maxime. continuatur zirbus cum colon.

Sexta vero pars vadit ad ieiunum: & reliquum eius vadit per intestina gracilia: scilicet ilion vsque ad cæcum, & in isto sunt plures venæ meseraicæ quam in aliquo alio: & propterea iste ramus erit tibi manifestus valde: & hoc de tertio videndum circa , epar.

Quartum quod debes videre est forma eius, & figura. nā figura est lunaris, quia cōcavitatē habet & gibbositatē: propter quod apostema factum in gibbo eius debet esse figuræ lunaris.

Quinto apparet substantia eius: quia in eo est caro propria, quæ est sicut sanguis coagulatus.

Et ideo eius cōplexio calida & humida.

Iuuamētum & operatio eius patet: quia eius operatio est chylū sanguificare. Et quia hydrops est proprium nocumētum sanguifica-

ficationis manifestum est quod hydrops est propria passio hepatis. Quomodo autem aquositas vel ventositas huius perueniat ad totum: ut in hyposarca satis patet: quia per venas. Quomodo autem perueniat ad concavitate ventris, ut in ascite, & tympanite declaratum est supra in anatomia myrach.

CVRTII.

Auicena decimaquarta Tertij cap. 1. inquit maius esse hominis iecur quam aliorum animalium, quorum corpus magnitudinem hominis non excedat. Præterea gulosus, & timidus maius habere iecur quam reliquos homines: prioris sententiæ hæc afferri potest ratio, quod in homine magna copia sanguinis resolvitur, quoniam calidæ, & humidæ est temperaturæ, curémque habet rariorem, & multum exercetur: propterea ut sanguis regeneretur ampliori iecore opus fuit: quod maius est edacibus & timidis, quoniam illi quidem maxime appetunt, & ideo maxima fit resolutio: timidis, vero quia cor habent frigidius, magna fit resolutio, hæc autem fit ab iecore, hinc iecur illis est magnum. Quod ad partes hepatis interiores, quis dicit esse, quinque pinnulas. Galenus sexto De anatom. aggress. capi. 11. inquit, in animalibus magnis unam cum venis, & meatibus qui sunt conceptacula cholere: & arterias ipsius conseruare poteris penes iecur: si vero paruum fuerit animal non usque quaque ad finem cuiusque pinnulæ conseruare poteris: tria genera vasorum. Igitur in parte concava iecoris omnes venæ ad unam reducuntur, quæ eunt ad intestina, deinde in quinque ramu

ramusculos diuiduntur secundum vnāquāq; pin-
 nulam, & ab illis rursus ramis plures disseminant.
 Eodem modo à vena caua, quæ est in gibba par-
 te oriuntur quinque alij tanquam surculi, secundū
 quinque pinnulas hepatis. Quæ omnes, eæ scilicet
 quæ à porta, & quæ à caua vena egrediuntur,
 vtrum inter se iungantur mox dicetur. Nunc expo-
 namus quare natura non fecit concauitatem in Ie-
 core ad sanguinem generandū, sed venas potius in
 Hepate instituit. Mundinus duas affert causas, qua-
 rum altera, cum inquit, Quia in stomacho perfe-
 cta concoctio non debet fieri sicut in hepate: falsa
 est. Quia in stomacho fit perfecta concoctio, quod
 ad chylum attinet. tametsi non ea sit quæ in san-
 guinem commutat. At longè melior ratio est quæ
 Galen. adducit, quarto De vsu part. cap. 13. inquit
 enim, si in Iecore magnum ventrem veluti lagenā
 quandam natura fecisset, deinde in ipsum vētrem
 per vnā quidem venam intromitteret sanguinē,
 per aliam verò inde extraheret, ne breuissimo qui-
 dem tempore in hepate maneret. Dicit rursus quis-
 piam. Quare in Iecore non fecit ventrem, quæ ad-
 modum stomachus, qui se astringeret, & dilataret?
 Respondeo, non potuisse hoc fieri, quoniam in Ie-
 core villi esse non potuerunt, est enim sanguis cō-
 cretus ad generandum sanguinem: & propterea fa-
 ctæ sunt venæ, quas capillares vocant. Quod au-
 tem dicit Mundinus meliorem in gibbo hepatis,
 quā in concauo fieri concoctionē falsum est, nā, cū
 rami venę cauę sint in gibbo iecoris, venę aut por-
 tæ in cōcauo, & cystis fellis infra in concauo, dicat
 que Gal. hanc ideo esse infra, vt sanguis purior trā-
 i feat

feat ad gibbū, qui antea in cōcauo digestus fuerit, signum est non deteriorem fieri digestionem in cōcauo, quàm in conuexo fiat. Quæ verò Iecoris potissimum pars generet sanguinem quæri solet. Pro qua re meminisse oportet regulæ superius à nobis traditæ: nam venæ, arteriæ, panniculi sunt in Iecore, sunt etiam in alijs partibus, in quibus minime generatur sanguis, quare apparet ex illis sanguinem non gigni. Restat ergo vt cystis fellis, aut caro propria Iecoris sanguinem generent: Verùm hoc non facit cystis fellis (nullum enim ipsa sanguinem producit) Relinquitur ergo substantia propria hepatis, quæ agens generet sanguinem. ipsa nã que, cum sit sanguis coneretus, conatur similem sibi chylum efficere, quare rubicundum efficit, atq; in sanguinem vertit, qui postea à venis rapitur. Colligationes autem hepatis cum alijs membris exactissimè Galenus tractat. libro quarto De vsu part. cap. 14. dicitque, præter eas quas adducit Mundinus, quòd costis etiam mendosis iungitur: quinto tamen De locis affect. capi. 6. ait non in omnibus iecur iungi cum costis nothis. Præterea inquit Galen. quòd copulatur hepar phrenibus, & per ipsas phrenas cordi etiam coniungitur. vulnerataque eius loci vena aut diuulsa mors sequitur acutissima. ordinem autem, quem seruat, Mundinus accepit ab Auic. primo can. atque à Galeno, in libro De anatom. venar. Hepatis figura ex vna parte, vt dictum est, concaua est, ex altera est gibba, nã oportuit sub diaphragmate esse concauum, quoniam stomachū amplectitur. Hac autem in re Mundinus deficit: longè plura ex Galeni libro quarto

De vsu part. cap. 13. & 14. habentur. vt quòd in hepate sint arteriæ paræ, nerui minores, maiores venæ ad cystim fellis, quòd arteriæ sint in concauo, quòd rami caux venæ sint in gibbo, quòd venæ Hepatis subtiliores sint, quàm alibi, tunicaque earum tenuior sit. quod ideò factum est, quoniam, cum hepar chylum in sanguinem cõuertat, ad hanc rem eę aptiores sunt, quæ tenuiores: neque enim timendum erat ne frangerentur, cum eas Iecoris caro tueatur. arteriæ autem non sunt in gibbo hepatis, quoniam ea pars satis motu diaphragmatis vtilatur. cæ autem arteriæ paræ sunt, quia non eas cor ad iecur ideò transmisit, vt inde sanguinem sumat, quoniam non est purgatus: non vt sanguine arteriarum Iecur nutriatur, quia nutritur crasso sanguine: non quòd calore per arterias delato egeat: cum enim sit inter membra prima, calorem ex se habet: sed solum ad euentilandum Iecoris calorẽ. Quòd autem natura Iecori neruum paruum dederit causam refert Gale. quarto De vsu part. ca. 13. Ne scilicet omnino insensibile remaneret. neruorum enim vsus est propter sensum. quæ igitur pars plurimo eget sensu, plures ei dati sunt nerui, quæ vero non sunt sentiendi organa neruos quidem habent, sed quibus ea sentiant, quæ tristia possunt esse. Rursusque ex his ea maiorem habent sensum, quæ magis sentire, & pati possent. vt intestinis maior est huiusmodi sensus, quoniã cholera, quæ per ea transit faciliẽ ea posset excoriare, si non sentirent, atque expellerent: idem est de vesica. Cystis aut fellis, Splen. Renes, tantum non habent sensum, quoniam à cholera non læduntur. Hepar autem nullo

eget sensu: eius enim officium hoc solùm est vt nutrimentum parat: quare sanguis purus tantùm restat in iecore: Cystis enim trahit choleram, & splē melancholiam. Nerus igitur ei dedit natura, vt passiones sentire posset. nā (vt inqt Gal.) si neque phlegmonis, aut suppuratiōis, aut alicuius alteri⁹ passionis habere sensum deberet hepar, nulla in re differret à planta . ppter ea nullo alio sensu eguit nihil .n. in ipso restat præter purū sanguinē, spoliarū cholera, melācholia, & aquosa superfluitate. Ex dictis autē, quòd ad cōcauā partē hepatis veniāt arteriæ, ad gibbā nō itē: Soluit illa quæstio, nūq̄ dari possit naturalis etiā spiritus, cū deē, & vitalis, & animalis. Cū.n. dicimus ad Iecur uenire paruas arterias illud sequitur. nō esse naturalē spiritū distinctum. nam si in hepate naturalis spiritus generaretur, opus fuisset multis arterijs, vt in eis vitalis spiritus in naturalē trāsmutaretur, multos.n. oportuisset diffundi vitales spiritus, q̄ p̄ totū corp⁹ innaturales mutarētur quā naturales spirit⁹ à vitalib⁹ distincti nōdātur, Nisi fortè q̄s neget naturalē in iecore generari ex vitali. Quod oēs, qui asserūt naturalem spiritum distinctum, ponunt tanquam fundamentum. Dubitatur deinceps. quoniam Aristot. primo De hist. animal. capi. 18. Et tertio De part. animal. cap. 7. videtur dicere, ab aorta non venire arterias ad iecur, aut splenē. quod tamen falsum esse ex anatomia sensu ipso percipitur. Quidam facile soluunt hanc questionem, dicentes has arterias Aristoteli cognitās minimè fuisse, quoniam, vt dictum est, eius tempestate perfecta non erat anatomia, quemadmodum neque cognouit neruos distinctos

stingui à ligamentis. Sed nobis fortè satisfacere potuisset hæc solutio, si de iecore tantum locutus fuisset Aristoteles: nunc verò cum de splene idem dicat, non temere de tanto viro huiusmodi iudiciũ ferendum esse censeo. quamobrem propius & diligentiùs rem intueri oportet, vt & veritas cognoscatur, & nihil tãto uiro indignũ pferamus. Dicerẽ igitur ego, quòd arteriæ, quæ nascentes ab aorta ad alia membra tendunt, sunt geminæ, vna dextra, altera læua: illæ verò quæ procedunt ad splenem & hepatis non sunt geminæ: nã ab aorta procedit ramus, à quo fit arteria iecoris & lienis, eaque, quæ ad intestina tendit. Arteriæ autem, quæ ad renes, & alia membra eunt, nõ à ramo aortæ, sed ab aorta ipsa statim descendunt. Hoc igitur modo tutarer Aristotelem, vt dicamus, arterias hepatis, & splenis nõ nasci ab aorta immediatè, arteriæ verò reliquorum membrorum immediatè ab ipsa oriuntur. Nunc propositam paulò ante questionem explicemus, in qua quærebarur, an venæ, quæ egrediuntur à porta, iungantur cum his, quæ à caua vena procedunt. Nam ex porta oriuntur quinque tanquam surculi (vt dictum est) qui eunt ad concauum iecoris. eodem modo vena caua in gibba parte diuiditur in quinque ramos, ex quibus plurimæ capillares venæ oriuntur. Hęc igitur est dubitatio, Nunquid hæc capillares venæ iungantur inter se, ita, vt quod in vna est ad aliam transeat. Sanè illud manifestum est, quòd nutrimentum, quod per portam attrahitur, diffunditur in capillares venas, ac per eas transit in cauam. Hoc autem duobus modis fieri, possumus animo concipere, aut quòd venæ capilla-

pillares simul iungantur, aut quòd venæ quidem non iungantur, sed alimentum ad capillares veng caux transeat per porositates Iecoris. Nam Gale. quinto libro De loc. affect. cap. 6. habet hæc verba. Etenim quod simarum partium venæ, ab ea, quæ in porta exoritur, in tenuissimas extremitates fini antur, haud obscurè apparet. Atque quod ad eundem locum aliæ quoque venarum extremitates, à concaua vena in gibbas viscens partes distribu tarum, perueniant, similiter constat. licet quo modo per sua ora ipsæ inter se coniungantur videre ne quaquam possimus. Neque enim dubitat aliquis, sed omnes ferè medici vno ore enunciant, quod cibus vniuerso corpori distributus, ex omnib⁹ simarum partium venis exiens, ad gibbas partes per di etas extremitates transsumitur. Ex quibus Galeni verbis patet, non posse videri an simul iungantur nec ne. Et si nonnulli dicant se vidisse Hepar aquis dissolutum, in quo illæ venæ capillares non erant inter se iunctæ. Ego vero facile illis assenti or. quoniam, & si concedamus iunctas esse, non potuissent illi profecto id vidisse: nam quo pacto relinquerentur venæ integræ donec Iecoris caro absumpta esset? Quod si fieri posset vt id perspicere tur, nullus alius modus eo melior esset, quem Gal. præcipit sexto libro De anatom. aggress. Hinc colligi potest, facile esse vt obstructiones in Iecore fiant: siquidem nutrimentum transiens per venas illas minimas, cū sepe fit ex crassis cibus, facile eas obstruere potest. Quare malè faciunt, qui humores crassos ex vena caua volunt extrahere, neque illos prius extenuant, non enim, si sunt crassi, per tæ angu-

angustias venas trahi poterunt. His dictis subdit de
 inceptus Mundinus, quod Iecoris operatio est, ut chy-
 lum in sanguinem mutet. quare propria eius passio
 est hydrops. quomodo autem fiat, se superius di-
 xisse ait. Sed non declaravit quo modo a quosdam illi
 humores transeant ex hepate inter Intestina, & pe-
 ritonium. Sunt qui velint aquam istam, generatam
 in Iecore ex chylo, penetrare panniculum hepatis
 & cadere inter peritonium & intestina. Alij puta-
 runt renes trahere urinam ex hepate, quæ si mul-
 ta sit, è venis inter peritonium & intestina cadat.
 Nec difuerunt qui crediderint hanc excidere uenis
 ruptis. Sed hoc nec verum est, nec verisimile; nam
 si frangerentur venæ, non humiditas illa tantum
 aquosa, verum etiam sanguis ipse exiret. quare meo iu-
 dicio priores duo modi meliores sunt, & veriores.
 Nonnulli etiam dicunt vidisse se lapidem in pin-
 nula iecoris generatum, quod negant plerique fie-
 ri posse. nam Galenus primo libro De loc. affect.
 ita inquit, Lapis in Renibus, & Vesica duntaxat
 nascitur, atque (vt nonnullis placet) etiam in colo.
 Et quarto De loc. affe. cap. 8. ait generari etiam in
 pulmone lapidem. Et sexto item De loc. affect. ca.
 2. reprehendit eos qui dicunt posse in recto intesti-
 no generari lapidem. Neque tamen in locis his, nec
 ubicumque de lapidis affectione loquitur unquam
 meminit Gale. in iecore nasci lapidem. Verum enim
 vero ego ipse aliquando vidi quendam, qui ingen-
 ti intestinorum dolore torquebatur, postea inter-
 egerendum lapidem emisit. sed illum diceret Gal.
 non in recto intestino, sed in colo fuisse generatum.
 quare de hoc mihi non est cum Gale. certandum.

i 4

Quo

medicam
 Et hoc mihi
 magis de re
 1563.

Quominus vero in iecore generari possit mihi sc̄
 nō est dubium, qui in anatome hominis cuiusdam,
 qui scabiosus erat, fueratque iam decē annos icte-
 ricus, ipsis oculis vidi cholera in cysti obduratam
 in modum lapidis. Quare mihi à vero abesse non
 videtur, quod in iecore etiam lapis generari possit,
 cum ibi quoque, sicut in pulmōe, sic calor innatus.
 & si id Galenns nō vidit. neque enim omnes mor-
 bos Galeni tempora cognouerunt.

¶ De anatomia chysti fellis.

CYstis fellis locus est in concauo hepa-
 tis in pennula media eius: & causa hu-
 ius fuit, quia cholera, quam cōtinet, debet
 transmittere ad intestina propter causam di-
 ctam superius: nunc autem agilius cholera
 hanc transmittit ad intestina: quā si esset lo-
 cata in gibbo hepatis. Item nisi sic esset: tunc
 non contangeret intestinum colon propter
 iuramentum dictum.

Sed tu dices quomodo verificatur dictū
 Galen. 5. de iuuamentis membro. cap. 3. q̄
 purgatiuum cholere est in loco medio vena-
 rum, quæ portant sanguinem ab hepate &
 venarū inferiorū, quæ attrahunt, & educūt
 chylum ad hepar.

Dicendum q̄ illud habet veritatē: de lo-
 co colli cystis fellis: quia initium colli est in
 medio hepatis: vt patet ad sensum: & debuit

ibi

ibi esse initium sui ortus, cum in medio hepatis compleatur digestio humorum. ergo ibi debet sanguis depurari a superfluitatibus omnibus: et ideo collum cystis fellis ibi debuit esse vel habere ortum: licet bursa siue vesica cystis sit locata vt dictum est.

Secundum, q̄ debes videre, est colligantia eius. Colligantia autem eius apparet ex partibus suis, quas discernes eleuando cystim fellis a parte inferiori: & tūc manifeste vides q̄ habet duplicem partem: scilicet vesicam continentem, & collum suum deferēs & deportans: & istud collum vsq̄ ad distantiam quandam est vnum, & postea bifurcatur: & vnus ramus eius penetrat in hepar in medium sui: vel melius oritur a medio loco hepatis, ad attrahendum choleram ab hepate: alter ramus magnus descendit ad intestinum duodenum, vt vidisti superius: & iste bifurcatur, quia ab ipso ramus paruus ramificatur, qui vadit ad fundū stomachi ad confortandum digestiuam: & iste fuit paruus ut expulsiuam superfluenō irritaret vel stimularet: & istud est verum vt in pluribus. Aliquibus vero iste ramus est maior eo, qui vadit ad intestina prædicta.

Et ex his ad sensum poteris videre solu-

tionem cuiusdam quæstionis quæ cõsuevit fieri. tertio de virtutibus naturalibus. capi. 23. Gal. dicit, q̄ per idem collum cystis fellis attrahit choleram: & expellit, quia videtur quod tũc expellat ad locum, & ad membrum a quo attraxit. Dicendum q̄ istud est idem collum vsque ad quandam distantia: postea vero bifurcatur.

Et ex hoc apparet tibi quæ sit colligantia cystis fellis: quia colligantiam habet cũ hepate, intestinis, & stomacho. Item habet colligantiam ratione neruorum, venarũ, & arteriarum cum alijs membris eo quia ad ipsum præter prædictum canale perueniunt venæ & arteriæ: quas potes videre ad sensum ad ipsum nutriendum: quia ex eo humore non nutritur, qui peruenit ad concauitatem eius: secundum Galen. 6. de iuuamentis. ca. 3. sicut & ad ipsum perueniunt nerui: quibus mediantibus habet sensum.

Ex his apparet tertiũ .s. quis sit numerus partium eius: & quartũ .s. quæ sit eius quãtitas: et q̄ntũ .s. q̄ sit figura eius: quia figuræ oblongæ cũ rotũditate. substantia ei⁹ est pellicularis.

Iuuamenta eius patent ex dictis: quia factus est ad attrahendum choleram rubeam & superfluum ab hepate ad expellendum

cam

eam ad intestina : vt dictum est.

Et ex his potes videre quæ sint infirmitates, quæ ab ipso possunt contingere: & sunt valde nocentes, vt oppilationes. Illa autem oppilatio potest esse duplex: scilicet quia vel est oppilatio facta in collo eius cõmuni: vel in aliquo ramorum eius: si sit facta oppilatio in collo eius communi: tũc cum cholera nõ expurgetur ab hepate per miscetur cum sanguine per totum corpus: & si ipsa sit cholera subtilis, & corpus sit aptum ad febrem ipsa est causa febris putridæ cholericę: si vero sit grossa: tunc est causa ictericę: & tunc egestiones poterunt esse coloratæ: tamẽ magis vel minus, secundum q̃ plus attrahitur de cholera ad intestina. Interdum tamen est q̃ oppilatio illa sit tantum in cãnali, qui peruenit ad intestina: & tũc cholera attrahitur ad chystim fellis, & non potest expelli ad intestina: quia clausus est caualis. & tunc si putrefiet causabit febrẽ tertianã vel continuã: & egestiones non erunt tinctę sed vrina sic.

Quandoque vero erit opillatio in canali, qui peruenit ad hepar: & tunc egestio non erit tincta, nec ad cystim attrahetur cholera. Et ideo in eo non continebitur: & per consequens non putrefiet in loco precipuo

cipuo: & ideo cholericam generat ictericiã
vel febrem continuam. Et nota bene has op-
pilationes, quia multum valet ad curam, &
multotiens contingunt. Et ex his habes per-
fecte anatomiam hepatis.

His expeditis potes eleuare splenem &
abscindere hepar sed non in totum. Sed cir-
ca gibbum eius vbi est origo venæ cylis di-
mitte partem quãdam: vt aliam videas quã
reseruauimus ad posteriora de hepate & ve-
na illa: stomachum autem dimitte, sed eleua
mesenterium: quia eius anatomiam vidisti
in anatomia intestinorum.

CVRTII.

KYsis folliculum, aut vesicam significat, vnde
cystis fellis vesica est, in qua cholera continetur.
eius locus est in concauo Iecoris, cuius rei causam
hanc refert Gale, quarto De vsu part. cap. 4. quo-
niam leuem, & flauam; superfluitatem recipit. Est
præterea alia ratio, quia aptius erat, vt ab ea fie-
rent rami ad Duodenũ; atque vt non tangat colõ.
Colligationẽ deinde exponit Mundinus, qua alijs
membris alligatur, cum stomacho, hepate, & inte-
stinis. Sciendum est autem cystim fellis collum ha-
bere biceps, cuius vna pars transit ad iecur, altera
ad duodenum; per illum choleram trahit ab hepa-
te, per hunc eandem ad intestina depellit: iste autẽ
duplex est, eiusque pars vna ad intestinum tendit,
altera in fundum stomachi. De his loquitur Gale.
secundo De temperamentis, cap. 6. Et secundo De
regi-

regimine victus in morb. acut. cap. 29. Et secundo
 Artis med. capi. 74. vbi dicit quod vt plurimum
 non est iste meatus, qui choleram in fundum sto-
 machi deducat, qui bus inest, ijs consuevit esse an-
 gustus. quod si in aliquibus est latior, ij infelices
 dicunt, quoniam quotidie euomere coguntur. alio
 qui cholera corrumpit cibum. Galenus enim ali-
 quando testatur vidisse se duos homines vnū phle-
 gmaticum, alterum cholericum, atque is quidem
 nō euomebat cholera, phlegmaticus aurem quori-
 die id faciebat. quare iudicaui, inquit, in phlegma-
 tico meatum fellis transeuntem ad stomachum la-
 tiorē esse, quā qui ad intestina choleram defe-
 rebat, atque ideo cholera, cum exitum non habe-
 ret, quo per intestina expurgaretur ad superiora rē-
 debat. Qua propter, si viderit medicus vomitum
 cholericum alicuius, cuius excrementa non referāt
 choleram, non est statim iudicandum illum esse
 cholericum. Quod autem inquit Mundinus natu-
 ram fecisse meatum hunc ad fundum stomachi, vt
 concoquendi virtus confirmetur. falsum est secun-
 dum Galenum. Est autem ratio Auicennæ decima
 tertia Tertij in principio. Ex dictis ijs, inquit Mun-
 dinus, soluitur dubitatio, quoniam Galenus tertio
 De facult. naturalib. cap. 13 inquit quod eadē uia
 trahit cystis cholera, eamque emittit. Verū hoc
 Galeno non videtur absurdum, ut qua uia quid
 attrahitur eadē emittatur, ut de Galeni sentētia de
 hepate & stomacho dictum est. cystis verò trahit
 ab hepate, expellit ad duodenum, atque hæc, vt ait
 Galen. libro quinto De usu part. cap. 13. omnia trans-
 tendit miracula; obliqui siquidem in ipsa implan-
 tati

tati ad internam capacitatem obliqui & prelongi venientes uelut membrana quadam organorum intus abscindunt, que membrana ab interna excrementorum latione eueritur, & aperitur. In reliquo vero tempore toto, accidit poro & contrahitur, & ita certum fit operculum poro, ut non solum humoribus impossibilis sit regurgitatio & relatio, sed etiam spiritui. Habet preterea colligationem cum hepate, cerebro, & corde, per venas, nervos, et arterias, quas posse sensu percipi ait Muidinus. Galen. tamen quinto De usu part. cap. 8. nervos & venas que veniunt ad cystim fellis uix percipi visu posse aiebat, venam tamen manifeste visibilem esse. Existimabit autem forte aliquis naturam frustra emisisse venam ad cystim fellis. neque enim lien venam habet, qua nutriatur. Renes pariter per quam venam aquosum humorem vring, per eandem nutrimentum etiam attrahunt: folliculus autem fellis atque vring non eadem via qua cholera, vrinam ve expellunt, nutrimentum quoque trahunt. Cuius rei rationem refert Galen. lib. quinto De usu part. cap. 7. poros inquit, per quos cholera, atque vrina veniunt, esse angustos, ex illis enim cholera pura, ex his vrina cui nihil sit admixtum sanguinis transeunt, quare alias esse vias oportuit per quas attraherent nutrimentum. Splenis autem vas latum est & rarium; ad attrahendum. n. per longum spatium crassum humorum aptius hoc fuit, & timor nullus erat secuturum quoque aliquid esse sanguinis. Sed dicet quispiam de buisse cystim ex pura cholera nutrir, Nam Auer secundo Col lect. cap. 8. ait, hec membra, ut cystis, trahunt ad
 se superflua

se superflua, nisi que conueniant eis pro sui nutri-
 mento. Deinde, omnis attractio debet fieri ratio-
 ne similitudinis, & consensus: ea autem cholera cysti-
 tim non mordicat. Præterea Galen. tertio De na-
 turalib. facult. ca. 13 inquit quòd, sicut hominis ex-
 crementa canibus delectabilia fiunt, ita & cysti
 cholera. Respondeo autem ego, fateor que cystim
 quidem trahere choleram per conuenientiam &
 consensum, quòdque cholera cystim non lædat. ta-
 men, vt bene nutriatur, oportere inquam aliquid
 sanguinis cholere admixtum esse, vt concedā cho-
 lera præcipuè nutriri. Idem quòque est de uesica
 vring dicendum, quòd ex pura vrina nutriri non
 possit, sed oportet nonnihil sanguinis inesse. Cur
 autem cysti fellis natura paruum dederit neruum
 ea causa potest assignari quia minimo eget sensu,
 ne molestiam cholera sentiat, quoniam ei familia-
 ris est. præterea cystis non est organum tactus. Eo-
 dem modo est de arteria, quoniā non eget cystis
 vt ventiletur, neque vt arterie sanguine nutria-
 tur. Ex his deinceps videamus que nam eius sint
 partes. manifestum est autem vnam tantum esse,
 pro tegmine vnam tunicam tantum & peritonium
 habet, quare autem hæc quidem vnam tantum,
 stomachus autem & intestina duas habeant tuni-
 cas superius ex Galeni sententia dictum iam est,
 præter eas tamen hæc quoque afferri possent, quòd
 cystis vnicam tantum habuit, eamque durā, adeò
 vt satis sit qua se tueri possit. Deinde cystis conti-
 net cholera, que ei conuenit. stomachus verò duas
 habet tunicas vnam ad apperendum, alteram ad
 concoquendum, non potuit autem tunicam habere

re duriores, nam, cum sit ad concoquendum, molli tunica opus fuit. Verum quoniam si vna tantum fuisset, eaque mollis, facile lēti poterat, ideo duę institutę sunt tunicę. Vesica autem fellis has non habuit causas itaque vnicam habere potuit. Quare autem minor sit quàm lien, & quare vna tantum sit diximus iam: neque hoc loco repetendum est. Varias nunc ægritudines quas dicit Mundinus ex hoc membro euenire deinceps consideremus. opinatur autem obstrui posse eum ramum, qui ad hepar, & duodenum tendit, nec non etiam collum commune. hi enim cystis fellis duo sunt meatus. Pro qua re illud annotatu dignum est, neminem unquam scriptorem meminisse de obstructione, quę fiat in communi collo, neque enim nisi perraro contingit meatum communem obstrui, siquidē cholera tenuis est, meatus vero laxus. Quare mihi non sit verisimile eum in locum posse obstrui, quod si quandoque fieret eodem modo cura re opporet, quo obstructio ea quę facit ictericum illud vero aduertendum est, quod declarat Gal. quinto de locis affect, cap. 6. omnem ictericā, quę cum obstructione accidat, posse etiā sine obstructione accidere, sicut cū obstruit meatus qui ad intestina tendit, cholera tunc non transit ad intestina, quod itidem accidit si expellendi virtus, qua cystis ad intestina expellit choleram, debilis fuerit, tunc excrementa citrina non erunt. pariter si attractiua infirma sit, tunc cholera manebit in hepate, fiet que icterica. Ratio autē cognoscendę obstructionis est, cum sentitur manifesta grauedo. Potest etiā icterica euenire absque obstructione,

aut debilitate attractricis, & expultricis: si quādo in corpore abundaret multa cholera, quæ à cysti capi non posset: tūc que vrinæ atque excrementa citrina essent, at que de anatomia folliculi huius qui fel. continet dicta sint, si tamē illud addamus quod ait Aristoteles quarto De part. animal. cap. 2. Fel datum esse animalibus sanguinem habentibus, sed non omnibus, nam Equus, Mulus, Asinus, Ceruus, Dama. nō habēt: Camelus autē nō discretū sed venulis quibusdā cōfusus habet. Sunt etiam eiusdē generis animalia quæ partim habēt, partim non habent, vt mures, quod idem homini etiam accidit, aliqui enim fel in iecore habere visuntur, aliqui carent.

De anathomia venæ cylis, & emulgentium, & renum.

Quibus omnibus eleuatis, tibi apparebit vena magna, quæ est ramus cylis descēdens. et arteria magna quæ est ramus ad horti descēdēs: & quādo illa vena cylis est in directo renum ab ipsa ramificatur duæ venæ: quæ vocantur emulgentes: quarum vnam vadit ad renem dextrum, altera ad sinistrum. Orificia tamen illarū nō sunt in directo: sed vnum est altius & superius alio: & hoc ne vnus ren impediret aliū in attrahendo. Superius autem vt in pluribus est orificium venæ quod venit ad renem dextrū, Inferius vero eius quæ venit ad re-

nem sinistrum: licet sit aliquando e cōuerso: et causa illius fuit: quia vt in pluribus rē dexter debet esse magis ad superiora eleuatus sinistro: & hoc quia calidi est eleuare: ipse autem calidior est sinistro. Item quia monoculum intestinum est locatū in dextra parte sub rene. Item hepar erat eleuatum superius, splen vero in laterē sinistro magis descēdebat. Sed si alicui esset magnū hepar monoculum esset paruum, colon vero in parte sinistra esset eleuatum, & pars siue ren sinister esset calidior dextro, & esset contrario modo: hoc tamen raro est. quālibet harum emulgentium vadit ad renis concauitatem: & ideo debes vnā earum excarnare: et melius est vt excarnes leuiter illam, quæ venit ad renem dextrum, propter causam quæ dicitur, & in ea ponas tentam: et videbis quod ad concauitatem & cauernositatem venit renis cuius iam apparet tibi locus: quia locus eius est quasi iuxta hepar.

sed tu dices quare non fuit inferius iuxta vesicā: dico quod causa fuit vt bene attraheret aquositatem ab hepate: quando .n. membrum attrahens est prope illud a quo debet attrahere attractio est melior.

Colligantia etiam eius cum hepate appa

ret, quia magnā venā recipit ab hepate mediante vena cyli: vt per venā illam aquositate vrinalē, quæ est superflua corpori postquā sanguis egressus est hepar attrahat et expellat: sed cum hac aquositate attrahitur sanguis: quia secundū Gal. 6. de iuuamen. mē. cap. 3. ad membra ad quæ attrahitur superfluitas aliqua per cānalem latum attrahitur simul cum superfluitate aliquid iuuatiui, & hæc est cā quare ad splenē et ad renē simul cū superfluo proprio vnicuiq; attrahit sanguis: sed ad vtranc; vesicam scilicet fellis & vrinæ pura superfluitas attrahitur sine sanguine.

Et ex hoc apparet tibi q; vrina ad renes puenit cū sanguine mixta, & venit ad vesicā deputrata & separata à sanguine: oportet ergo quod in renibus depuretur & coletur.

Colatur autē quia ad concauitatem puenit renū, quā videre debes scindendo renem in parte gibbosa eius nō concaua & per longū protrahere vsq; quo concauitatē videas: statim tunc apparet quidam pāniculus, siue pannus rarus: et ista est vena emulgens rare facta ad modum colatorij: & per has porositates potest vrina trāsire: sanguis autē non. Et ideo colatur vrina & distillat inferius in rene ad orificium cui continuatur porus

uritides, qui descēdit inferius vsq; ad vesicā
& vrina descendit per ipsum ad vesicam.

Et ex hoc apparet tibi q̄ habet colligantiā
cū vesica: sicut habet colligantiā prop-
ter arteriam, quę venit ad ipsum cū corde
& cerebro ratione neruorū, qui perueniunt
a nucha ad texendum panniculū eius, quo
mediante sentit, & sanguis remanet in rene,
& attrahitur in substantia eius, & nutrit re-
nem.

Et ex hoc apparet tertium .s. quis sit nu-
merus partium eius. Quia primo numerus
discretus est sub duobus dextro & sinistro.
Et causa prima quidem fuit quod si nocu-
mentum accideret vni operatio perficiatur
per alterum. Secunda causa fuit vt totā sup-
fluitatem aquosam, quę multa est plusquā
aliqua alia secundæ digestionis bene & cō-
plete possent attrahere. Et ex hoc apparet q̄
non fuit tantum vnus ren, sicut vnum splen
& vna cystis fellis.

Sed tu dices quare non fuit vnus & ma-
gnus potens attrahere totam aquo sitatem:
ad hoc respondet Gal. capitulo præallega-
to: quia si esset tantum vnus magnus: tunc
corpus humanum erectum, non esset equū
in lateribus: sed inæquale quod est verendū
& enorme

& enorme. Ex his apparēt iuramēta renū.

Numerus autē partiū patet, quia habet substantiam propriam, concauitatem, panniculum, & collatorium.

Quarto notes quantitatem & figuram. nam figuræ est oblongæ: vt in ipso distincta essent duo orificia prædicta.

Apparet etiam quinto quæ sit substantia eius: quia carnosæ & solida multum: vt ab aquositate mordicatiua non læderetur vel dissoluatur.

C V R T I I .

A vena caua duo oriūtur rami, quorum vnus ad dextrum, alter ad sinistrum renē peruenit, sed non æqualiter, nam, vt inquit Galenus decimo quarto De vsu part. cap. 7. Vena concaua vbi primū enata ab hepate est, & adhuc sublimis versus dorsum flectitur, dextrum renem habet dextris suis partibus adiacentem, deinde consequenter paulò inferiùs ex sinistris partibus sinistrum. atque hæc sunt, quæ emulgentes venæ dicuntur, cur autem ita sitæ sint, ratio, quam adducit Mundinus, refertur etiam à Galeno libro quinto De vsu part. cap. 6. Nam si hæc uenæ directè e regione essent, alterius attractionem altera impediret. Reliquæ verò venæ non eo modo positæ fuerunt, quoniam neque adeo vāhementer trahunt, Quia de causa neque se mutuò impedire possunt. Dexterior autē ren superior est, inquit Mundinus, quoniam est calidior, calidi autē est eleuari, ideo debuit superioris

esse. Verùm hæc ratio nihil valet: quoniã os capitis frigidũ est, nihilominus est altius, quàm sint plerãque omnia membra calidiora. Verùm Aristotel. hanc habet rationem quòd dexter ren sit superior, quia dextra pars est validior. nam Auer. in paraph. ait locum hunc Aristotelis hoc modo intelligendum esse, quoniam pars est validior, & dexter fortior. ideò ei dari debuit locus altior, vt fortius operari posset. Altera etiam ratio, cum inquit ideo dextrum renem esse superiorẽ, quoniã monoculum intestinum erat locatũ in dextra parte sub rene, non valet, quia non debuit ren intestino cedere, quoniam eo nobilior est. Tertia verò sumpta est ex Galeno, quia scilicet hepar in loco esse debuit altiori, ppter ea fuit relictus locus dextro reni. Aliam præterea habet rationem Galenus, ait enim operatio renis est attrahere aquositate, quod commodius fit si in loco sit altiore, vt sit prope venam cauam. Exposito autem harum situ, addit Mundinus, quamlibet harum emulgentium venarum ire ad renis concauitatem. Cuius tamen rei oppositum habet Aristoteles tertio lib. De partib. animalium cap. 9. cum inquit venas, quæ ad renes veniunt non ingredi eorum carnem sed per totã substantiam dispergi. Galen. verò sexto de Anatom. aggress. cap. 13. inquit in paruo animali nõ poteris prosequi venam vsque ad caput nem remum. verùm sit animal magnum ac nuper occisum penetrabis renẽ posito stilo in emulgente Eandem habet sententiã quinto De vsu part. ca. 5. & 6. Cum verò colligationem affert, inquit Iurgi renes cum iecore, per emulgentes venas. Sed nihil

hil Mundin. meminit de arterijs emulgentibus. duę enim sunt arterię etiam emulgentes: vt inquit Gal. quinto De vsu partium, cap. 5. Natura aurem eo in loco Renes collocauit, quoniam non illos trahere oportebat a quosam humiditatem ex sanguine, cum sanguis sit in hepate, quia aquosus ille humor aptus minimè est ad penetrandas capillares. Virum vero Renes totam aquosam superfluitatem trahant in dubio est. Galenus inquit quinto de vsu part. cap. 6. quod ijs qui bene constituti sunt torus ferè superfluus humor extrahitur, quod si in venę sectione appareat humor ille aquosus, signum illud est eos non esse rectè naturaliter dispositos. Quo autem diuerso modo atrahant Renes, Cystis fellis, & Lien, declarat Galenus quinto libro De vsu part. cap. 6. & 8. Quod membrum aliquod quando aliquid trahit superflui per vias latas, trahit etiam sanguinem, vt facit, Vesica autem fellis cum per meatus angustos atrahat, trahit cholera tantum, vt superius iam dictum est. Quod vero ait Mundinus, quod ad vtrāque vesicam trahitur superfluitas, existimāt que vesicam trahere vrinam, Hoc est Galeni decreta ignorare, Qui sexto libro De locis affect. ca. 3. ait vesicam non attrahere vrinam, sed renes vrinam ad vesicam expellunt. Declarat deinceps Mundinus quā ratione depuretur vrina in renibus. Trahunt autem renes, serosam humiditatem que cum à sanguine seiuncta separataque est, restat vrina. hoc loco soluitur questio, quare, si trahunt vrinam eam illico expellunt. Dico enim quod renes vrinam trahunt admixtā sanguine, tuncque sanguis

in renibus restat, vrina uero ad uesicam demittitur. Addit Mundinus quod scisso rene medio est panniculus, qui est uena emulgens, expanditur .n. uena, facitque eum panniculum, per quem vrina sine sanguine transmittatur. Sunt qui credant præter illa concauitatem panniculum esse rarum, per quæ trãseat vrina & sanguis regurgitet. Hoc autè modo credo opinatum fuisse etiam Mundinum, quod uena Emulgens faciat panniculum in concauo renis. Verùm paulo ante dixerat uenas has ad concauum renum peruenire, id autem negat Aristoteles, quoniã inquit pars renis cõcaua semper alba conspicitur: quod si uena eo in loco esset pculdubio ruberet, quoniã ibi esset sanguis. Ego autem de mente Galeni iam admonui, quod si sic animal non paruum, & paulo ante interfectum, uena ea penetrat in renis concauum. Quo modo uero purgetur vrina deinceps dicamus, idque tribus modis fieri possumus animo concipere. Vel quod ibi sit panniculus quem vrina penetret: sanguis autem non possit. Aut quod uena Emulgens non eat ad concauum, sed dispergatur per renes, hoc que modo vrina à sanguine separetur, quod illa quidem transmittatur ad concauam renū partem, penetrètque illum panniculū: sanguis residat in renum substantia. Siue credendum est quod ex purgetur vrina, non quidem per illum panniculū ut dictum est: sed quod uena emulgens disseminetur per substantiam renum, adeo ut ex ea nascantur pori, qui ita angusti sint ut vrinam quidè transire permittant, sanguinem uero minime. præterea, si quando laxantur uenæ eę, fit mictus sanguinis

guinis. Cum igitur ij tres modi fatis probabiles
sint, Galenus tamen videtur illum accipere quē
postremo loco retulimus: atque ideo quinto De
usu part. cap. 7. inquit, Naturam fecisse corpus
renum densum, ne cum vrinis, per aliquem poro-
rum, qui in renibus sunt, sicut subtile cholericum
ita & sanguis excidat. Ex quibus verbis apparet
purgari vrinā, nō p panniculū, sed per poros, qui
in sunt renibus. Possumus tamen (si ea nobis cura
fuerit) Mundini dictum ad Galen. sententiam redu-
cere: Quod in panniculo ambiēte cavitatem renū
sint pori illi āgusti, per quos urina cū subulli cho-
lera transeat. Quo igitur in loco solemus dicere
expurgari vrinam nihil est præter panniculū ve-
lantem concavam renum partē in qua parte, ori-
ficium manifestum, per quod vrina ad vesicam
transmittitur. Vrina igitur per poros eius pannicu-
li ingreditur concavitatē renum. At que hæc vera
est ratio ex Galeni mente. eæ autem venę tenuis-
simæ sunt vt ait Galen. sexto libro De anatom.
aggress. cap. 13. Atque hoc pacto Aristotelis etiā
ratio conseruari poterit, vt cum dicit venam non
ingredi cōcauum renis intelligamus eum loqui de
vena lata per quam possit vnā cū vrina sanguis
etiā egredi, atque hoc manifestum, quoniam p
meatus illos angustos educitur vrina, neque hoc
negaret Aristoteles. An verò meatus ille sit ve-
næ parvæ, an porositas de hac re non est mihi līs
De numero aut dictum est. ratiōesq; sumpta sunt
à Galeno ex quinto De usu part. cap. 6. scitu au-
tem dictum est quod ait Albertus decimo tertio
De animalib, cap. 9. quomodo circa renes gene-

retur pinguedo, Nam in sanguinis generatione re manet pinguedo: cum que renes sanguinem trahunt ferofum sequitur etiam vntuosus sanguis, ex quo circa panniculum renum generatur pinguedo, sub iungit deinde causam qua oues moriantur ex renu pinguedine, Animalia, inquit, ea humida sunt, multumque abundant pinguedine circa renes, quæ putrescit, inde extolluntur fumi, qui congregati intra renes transeunt per arterias ad cor, ex qua re nimium mors euenit. hnt autem huius dicta non nihil dubitationis, nam quod pinguedinem cineri assimilant, non recte facere videtur, quoniam cinis est adustum quoddam, pinguedo autem vntuosum: nisi forte ratione sanguinis vellet simile ei esse. nam quemadmodum pinguedo sanguinem seruat, ita cinis calorem. Sed hoc concedamus. Illud verò quomodo stare potest: cum dicit sanguinem trahi cum pinguedine intra renes: quo. n. pacto posset pinguedo esse extra renes: posset aliquis respondere, quod pinguedo transit extra renes, quoniam tenuis est, coagulatur deinde extra renes. Habent autem renes concauitatem, ut melius recipiant. Præterea colligationem cum cerebro per nervos, quos iam dictum est esse paruos, quoniam renes paruo egent sensu. Neque tamen illud verum est, quod panniculus est nervis textatur, nam textitur ex substantia peritonij. Quoniam autem dici solet, naturam transmittere nervos ad panniculum, ut sentiat: Sciendum est quod Gale. ait de hepate, Naturam scilicet dimittere nervum paruum ad carnem hepatis, præcipue eam, quæ est circa panniculum, non tamen dimisit per totam substantiam, quia pars prope panniculum posita ea est quæ sentit, idem de renibus

bus & pulmone dicēdū est,arque hæc est quæstio-
nis solutio (de qua etiā paulò ante verba fecim⁹)
Etenim, ex Galeni sententia, sentiendi virtus per
neruos demandatur, non quòd maneat in solis ner-
uis, sed ad certum vsque terminum præter neruos
egreditur. Ex hoc patet Dentes sentire vsque ad
certum terminum, vt concedam eos usque ad ex-
trema non sentire. Idem est de vnguibus, & Cure
dicendum. Quare eæ partes renum, quæ propè
panniculum sunt, ad easque terminantur nerui,
sentiunt.

MVNDINI.

Et notes hic q̄ in renibus ex quolibet ge-
nerē egritudinis accidit difficilis ægritudo.

Primo ex morbo cōplexionali, vt ex sup
flua caliditate diabetes: quæ secundū Gal.
6. de interioribus, ca. 2. assimilatur liēteriæ
stomachi: quia tota aquositas subito attra-
hitur & expellitur sine digestiōe a renibus.

Patitur etiā morbum compositionalē
propriū & specialiter in numero, vt lapidē,
arēam, & pilos. Lapis vero, arena, & pili vt
plurimum generantur ex eadem materia,
& in eodem loco: nam materia horum sunt
humores grossi, qui dēfantur & inspissantur
a caliditate renum. Et interdum est quod
parum inspissantur: et tunc fiunt pili qui ge-
nerantur subtiles & longi: quia materia illa
per porum aliquē strictum expellitur pau-
latim

latim continuata sicut a poris cutis expellitur paulatim continue materia pili & capilli: & quando illa materia plus aduritur generatur arena, quæ congregata generat lapidem. Et ille lapis est rubeus, quia ren est rubeus. Et iste lapis si sit ita magnus, quod non possit egredi porum vritidem, vel non frangitur est difficillime & quasi impossibilis cura: quia non nisi per incisionem curatur, a qua penitus caueas. Si vero sit paruus vel frangibilis difficulter curatur & expellitur cum fortissimis doloribus cum transeat per membra valde sensibilia, & ingrediatur per cauernositates vesicam, quæ sunt ita strictæ. Sed fortitudine virtutis aperiuntur & dilatantur: & non est longinquum quod aliquando scindantur.

Patiuntur etiam renes solutionem continuitatis quantum ad venam eorum ex qua accidit fluxus sanguinis cum vrina. Et nota quod hæc solutio huius venæ quæ est causa huius fluxus sanguinis proprie debet intelligi quod facta est in parte illa in qua vena sit subtilior, & rarior: & hæc pars est pars panniculi colatorij, vt apparuit tibi ad sensum: & ideo quando illa soluitur cum deberet prohibere sanguinem descendere non prohibet

bet. Et ideo sanguis egreditur cum vrina.
Et fit mictus sanguinis.

Verum est quod dicunt aliqui alii quod istud accidit ex vena soluta supra renes: & dicunt quod causa est, quia vena debilitur in continendo. Sed tene primum dictū quia rationabilius magis est & sensui magis patet & concordat.

Patitur etiā quarto egritudinē compositā vt apostema; & tunc est dolor fixus propter substantiam suam solidam aggrauatius. Ac si lapis esset infixus in loco, & in dolore hoc multum communicat cum colica. Sed differētia distinctiua ipsorū dicta est supra.

His completis non eleues renes, sed dimittas propter vasa spermatica vt videas ortum eorum: & ideo dato quod vesica sit octauum membrum continuatione: tamen præmittas anatomiam vasorum spermaticorum & testiculorum.

CVRTII.

Nunc est de ægritudinibus renū dicendum. Patiuntur autem passionem, quæ diabetica dicitur, ea autem fit cum quis multam emittit urinā. de qua Galen. loquitur sexto lib. De locis affect. cap. 2 & 3. Habet autem diabetes eandem (ut ita dicam) proportionem cum renibus, quam Lienteria cum intestinis. Fit etiam cum quis mingit vinū aquamue, nulla facta alteratione. Hęc autem accidit propter

pter infirma retentricem uirtutem, uehementem
 que renū attractricem uim, nam potum eo modo
 trahunt quo eporus fuerit. huiusmodi Diabeterem
 uidisse se ait Galen. bis tantū sexto de locis affect.
 cap. 2. Tamen si tertio De facultatib. natural. cap.
 ultimo dicat Galenus quosdam esse qui tantum
 bibant ut uinum exeat per uirgam. Verum tamen
 non dicendum est hanc esse Diabeticam passio-
 nem, non enim uitium hoc proueniebat ob infir-
 mam uim continendi, sed propter immoderatam
 copiam potus quæ contineri non poterat, tamen si
 uirtus esset ualida. Verum Diabetes fit cum potus
 etiam modicè sumptus emittitur non alteratus.
 Altera renum affectio est, lapidis, & pilorum ge-
 neratio. Nemini autem dubium est, quominus ex
 materia terre stri, & uiscosa, & calida lapides ge-
 nerentur, sed illud dubium est, quo in loco coalescat.
 Nam uidemus quandoque lapidem excitare ma-
 ximum dolorem, quandoque exire sine sanguine.
 Quòd si generatur lapis in carne renum, qua ra-
 tione panniculum egredi potest? deinde, etiam si
 egrediatur, quomodo absque sanguine? Hoc argu-
 mento ducti quidam dixerunt, generari lapidem
 in concauo illo renum. Alij contra, id posse fieri
 negant, quoniam pars illa concaua alba est ratio-
 ne panniculi, & quia in eā sanguis non ingreditur,
 si igitur, inquit, lapis ea in parte generaretur al-
 bus esset: sed cum videamus illum rubere potius,
 non est dicendum lapidem in concaua parte renū
 generari. Ego autem hac in re sentio lapides in
 substantia renum gigni. Galen. in libro, qui De re-
 num affectib. inscribitur, licet inter spurios conu-
 meretur,

meretur, ait lapides generari in substantia renum in quibusdam cauis. Verum, quomodo transeunt ad vesicam, neque panniculus frangitur: sciendum est expurgari vrinam per quosdam meatus (ut dictum est) qui possunt, si opus sit, laxari ita, vt lapis transeat, neque frangatur panniculus, nam si semel rumperetur non posset iterum coire, cum per eum vrina continuè transeat illi autem pori, postea quàm lapis est egressus, astringuntur rursus ne sanguis vnà exeat, quandoque tamè contingit naturam esse adeò debilem, vt poros eos nequeat astringere, tunc que sanguis vnà cum lapide emittitur. Qui verò albi sunt lapides generantur in renum cauis. Tametsi audio in alia anatomia inuentos fuisse lapides rufos in renum concauitatibus. Quod ad pilos attinet dicebat Galenus sexto libro De locis affect. cap. 2. se aliquando uidisse pilos qui semipedis longitudinem æquarent, interdum etiam ips longiores, adeò vt miraretur quomodo fieri posset, vt in renum spatio tales possent existere, proinde probabilius ipsi videbatur in venis huiusmodi res procreari. Est alia præterea renum affectio quæ fit cum sanguis mingitur. Quæ in re Mundini sententiam non probo cum vult affectionem hanc prouenire potius ex solutione panniculi. Nam (vt dictum est) si panniculus dissoluatur coire non poterit, cum sit in assidua attractione. Propterea Galen. sexto De locis affect. cap. 3. ait quòd sanguinis excretio prouenit, aut ex renum debilitate, cum non possunt continere sanguinem, aut quòd pori ipsi, per quos vrina purgatur, laxiores facti sunt. Hinc etiam illud colligitur purgatione
 vrinæ

vrinæ fieri non per panniculum, sed per meatus. atque idcò natura rectè instituit corpus renum quod densum esset, vt illi meatus contineantur arctius, neque tam facilè soluantur. retentrix que virtus sit fortior propterea non abre medici in huiusmodi affectionibus adhibent stiptica. Quare si quis hanc sequatur sententiam, quod vrinę purgatio fiat per meatus illos angustos, facilè oppositiones soluet. Postremo patiuntur renes apostema, quam passionem, quoniam nihil ad anatomiam spectat eius consideratio, sponte prætereo. Quare ad alia accedamus

De anatomia vasorum spermatis
etiam in muliere.

DEbes ergo scire quod membra generationis in viris & in mulieribus in aliquo differunt: & in aliquo conueniunt.

Conueniunt primo in vasis spermaticis quantū ad ortū eorū: quia vt dicit Auicena. 3. cañ. sen. 20. & 21. de anathomia matricis vasa spermatica in viris & in mulierib⁹ oriuntur iuxta renes: ita scilicet quod vasa que sunt in parte sinistra ortum habent a vena e mulgente sinistra, & dextra ortum habent supra renes vel infra. s. a vena cyli, & arteriæ ab arteria adhorti. Et quia hæ venæ ortum habent a corde & ab hepate vt infra videbis potes cognosceñ quomodo vasa spermatica sunt decisa a corde, quia non immediate

diate sed mediate. Et hoc in viris et in mulieribus potes videre: licet autem conueniant magis in loco originis.

In locis autem, ad quæ terminantur in viris & in mulieribus multum differunt, quia in mulieribus terminantur ad matricem in loco exteriori, vbi sunt testiculi: imo proprie loquendo extra matricē reuoluntur & contextuntur. Et concauitates & texturæ carnis minutis glandosis replentur: et propterea non sunt vere testiculi, sicut in viris: imo sunt sicut testiculi leporis facti propter prædictam vtilitatem, vt generēt humiditatem quædam saliualem, quæ sit causa delectationis in mulieribus: postea vasa hæc substantiam penetrant matricis, & ad concauitatem ipsius pertingunt. Et fiunt ora ipsorum & vocantur cotyledones: quia eis mediantibus alligatur foetus matrici, per quæ fit fluxus menstruorum. Et quædam perueniunt ad os matricis neruosum ad portandum humiditatem saliualem iam dictam: & ab his venis ramificatur et oriuntur duæ venæ à quolibet latere: vnæ quæ in myrach penetrant & ascendunt: & quanto plus ascendunt minus occultantur: & extra iuxta cutem magis approximantur, donec pueniant ad māmillas.

Et ideo in mulieribus quando facis anatomiam myrach has venas cōserua, & considera hunc locum: & hoc in muliere: quoniam in porca vel in alio animali habēte māmillas in myrachistę venę oriūtur in matrice, & manifestantur in myrach.

Et vltra has venas ascendit à profundo pectoris iuxta vel indirecto pomi granati vna vena, quę venit ad māmillas ad decoquendum sanguinem, qui debet conuerti in lac: & non videtur nisi vna: & in porcis prægnantibus valde apparet. Et tūc apparebit tibi colligātia matricis, et māmillarum per venas illas. Et quare appositio ventosæ in māmillis restringit fluxum menstruorum.

C V R T I I.

Antequā anatomię seminalium vasorū expositionē aggredior, referam Galeni uerba ex Quarto decimo libro De usu part. in initio, quo loco de clarat, cur natura tātam delectationē immiscuerit coitioni: inquit enim, Naturę triplicē esse scopū in cōstruēdis membris, aut enim uiuēdi gratia ea producit, ut cerebrū, cor, & hepar: aut melius uiuēdi, ut oculos, nares, aures: aut sobolis reparādę, ut pudenda, testiculos, vteros. & enim voluisset natura maximē immortalē esse suam procreationē: Sed quoniam materia repugnabat (non enim fieri poterat, vt cōpositū ex arterijs, venis, neruis, & carne esset incorruptibile) auxilium aliud ad immortalitātē

itatē suę creaturę est machinata, p̄creandi scilicet.
 Sed cum operatio hæc per se sit despecta, addidit
 delectationem, & mirabilem quendā coëundi ap-
 petitū: à quo excitata & stimulara animalia, & si
 stulta, & si iuuenilia, & si irrationalia omnino fue-
 rint, p̄vident tamē permanentię generis, ac si essent
 prudentia. Hactenus Galenus, nūc ad Mundinū re-
 deamus, cū inquit Membra generationis in vi-
 ris & foeminis non nihil conuenire. De qua re tra-
 ctat Aristot. libro quarto De gener. animal. cap. 1.
 Galenus uerò quartodecimo De usu parti. cap. 6.
 apertè ita (de partibus generalibus loquens) ait.
 Quotcunque igitur in viris sunt particule, has eti-
 am vniuersas in mulieribus est inuenire, vna par-
 te sola differentiis; quòd scilicet intrus quidem cō-
 duntur mulierum genitales particule: uirotum ve-
 rò extra prominent, quæ sunt à regione propè
 πρὸς τὸν ὄρον. Alteras enim harū, utras uolueris intelli-
 gere priores, eas quidē, quæ mulierum, eueniens fo-
 ras, quæ verò virorum tanquam inuertens & in-
 tro duplicās omnes sibi inuicem inuenies easdem.
 Cuius rei causam paulò post Galenus tribuit cali-
 ditati, p̄cedere enim, inquit, & emitti foras in mu-
 lierib⁹ non potuerunt ob caloris imbecillitatem.
 Ex qua re duæ maximè utilitates procreationē
 consecutę sunt. nam facta est matrix: deinde ex fri-
 gido foemine temperamento, plurimus aggeritur
 menstruus sanguis, qui nutrimento est iam conce-
 pto foetui, illud præterea consequitur, quòd mulier
 ex se generat minimè potest, quoniam ob caloris
 defectū semen pro generatione digeri non potest.
 Cū verò ait Mundinus vasa seminalia, quę sunt

à sinistris, ortum habent à sinistra vena emulgen-
te, addendū est, & a arteria emulgente: quoniam
infra venas emulgentes sunt etiam arteriæ emul-
gentes, per quas & per venas expurgatur serofus
humor. Etenim Gale. cū reprehendit Erasistratū,
qui volebat in arterijs esse sanguinē, inquit quòd
natura frustra ibi posuisset arterias ad purgan-
dum sanguinē, si in ipsis nihil esset sanguinis. Quæ
verò vasa sunt in dextra parte ea inquit oriri à
vena caua, et magna arteria. atque hæc est Galeni
sententia quartodecimo De usu part. cap. 7. Quod
autem ait Mundinus, quòd vasa seminalia eodem
modo oriuntur in viris & foeminis, verum nō est,
nisi forte si renes æquali situ essent, alioqui oriun-
tur vt dictum est. Pars autem sinistra matricis, &
testiculi est frigidior, quoniam sanguine nutritur
impuro, qui defertur à vena emulgēte, sanguis ve-
rò, qui ad dextram partem demittitur, purior est,
atque ideò calidor, venit enim à vena caua. qua-
re cum semen egreditur à dextra generare debet
masculum, Propterea hoc animaduertitur ad co-
gnoscendum masculus ne, an foemina sit quod est
in utero conceptum, nam si dextra pars magis in-
tumescat foetum masculum esse significat, si verò
sinistra sit tumidior, foemininum. Quid si (dicit
aliquis) semen à dextra parte exeat, cadat que in
sinistrum matricis? hæc in re Galenus ait potentio-
rem esse partem matricis, atque ideò foemina erit.
Quapropter qui masculos cupiunt procreare, eos
curare oportet, vt foemina inter coeundum in dex-
trum latus cubet. Naturæ verò non satis esse vi-
sum est institueredelectationē in coitu, nisi modū
etiam

Hippo.

in Ap.

etiam delectationis parasset: nam sanguis qui defertur per venam emulgentem, cum sit aquosus excitat quendam tanquam pruritem, & exeundi appetitum, vt ait Arist. primo De generat. animal. cap. vlt. Et sectione quarta Probl. 15. Et Galen. quatuordecimo de vsu part. cap. 9. ait, quòd si est in membro sentiente aliqua maligna materia, magna delectatio oritur cum illam expellimus. Ex qua sententia possemus illam tutari opinionem, quòd sensus tactus in vrinæ extremitate sit idem cum toto sensu tact^o, nam ibi est maior delectatio, quia materia illa, quæ per illam partem emittitur, est alia à materia, quæ in alijs partib^o sentitur. tam etsi contrariam sententiam defendat Aueroës. Prosequitur Mundinus, atque vasa seminalia mulierum inuolui circa earum testiculos, deinde transire in matricem: ex quibus vasis fieri ait cotyledonas, quibus alligatur foetus in matrice. dicuntur autè *κοτυληδόνες* Græcè ora venarum, quæ in matricem perueniunt. Maxima verò est dubitatio, emittant ne mulieres semen in matricem, an extra. Nam philosophi, qui in generatione foeminam nō a cōiuiē conuenire aiunt, affirmant, quod semen in matricem nō recipitur. De quare fusiùs tractauit, in libro De anatomia matricis. quarto decimo, Et decimo quinto De vsu part. Galenus verò declarat Aristotelem, alios que non vidisse quomodo intra matricem semen recipiatur, inquitq; vasa seminalia quæ sunt post testiculos deferre semen intra concavitatem matricis. Sed dicit quispiam foeminas in coitu emittere humiditates quasdā extra matricem, Respondet Gale. esse meatus quosdam,

& carnes glandulosas, quæ factæ sint vt prohibeant ne vrina lædat collum matricis, dum transit. huius autem humiditatis vsus referuntur à Galeno decimo quarto De vsu part. cap. 9. cum dicit iuuare eam ad generandum, quoniam delectatione moueat in coitu, præcipuè quæ generatur in carnis glandulosis. eandem etiam sententiam confirmat. Galen. primo de semine cap. 5. & quinto Aphor. 48. cum ait Hippocrates, Fœtus, mares qui sem in dextris, foemine verò in sinistris magis, inquit Galen. quod propter temperaturam, quæ statim ab initio calidior existit, fœtus masculus generatur. Calidior verò temperatura fœtibus aduenit maximè ob locum, qui est dextra vteri pars. hic autem locus ipse calidior existit propter hepatis vicinitatem. Et inferius, serosior, inquit, atque frigidior quæ in sinistro testiculo est feminis pars, atque ideo cõceptus in laeva vteri parte constitutus esset frigidior. Hoc igitur Mundinus benedixit, quòd spermatica vasa semen in matricem deferant. Illud tamè, quòd ex his fiant cotyledones, quæ à matrice veniant ad vmbilicũ, quibus nutriatur infans, falsum esse existimo. Nam sequeretur quod mulieres vtero gerentes nullam in coitu delectationem perciperent, si semen illud per cotyledones ad infantem transmitteretur. Igitur Galen. quinto decimo De vsu part. cap. 4. cum docet quomodo generetur embryon, ait, quod præter ἀγνιον, & ἀλλυτοισιν est extrinsecus appositum χωριον, hoc est secũda, totam subungens sublinens que matricẽ internã, vt nulla parte matrix tangatur à subiacentibus, & p hanc mediam copulatur

matri

matrici ipse foetus. In vnoquoque .n. orificio peruenientium intra matricem vasorum (per quæ & menstruum in ipsam matricem ferebatur) generatur, quo tempore vterus gestatur, aliud vas, arteria quidem in orificio arteriæ, vena vero in orificio venæ: vt sint ea quæ generantur numero æqualia orificijs, quæ intra matricem terminantur. Non dicit igitur Galen. quod per vasa spermatica alligetur vena, quia per ea non deferuntur menstrua: nec per ea foetus matrici alligatur. Sed deferunt sperma in generationem. Testiculi vero mulieris, de Galeni sententia, non solum facti sunt ad delectandum, verum etiam propter seminis generationem, quod concurrat ad foetus generationem. Declarat postremo cõmunionem matricis & mammillarum. Sanè voluit natura ex venis superioribus pectus nutriri: ex quibus tamen, his scilicet, quæ à vena caua oriuntur, duo rami ad matricem descendant, duo que à matrice ad mammas ascendant rursus, hoc autem ideo natura instituit, vt, siquãdo opus maximè sit nutriri foetum, sanguis descendat à pectore ad matricem, rursus que, quando vberiori lacte opus est, ascendat. atque ideo, cum foetus est inualidus, sanguis tunc per has venas cū māmillis cõmunicatur, & fit lac, cum vero non adest magna necessitas, sanguis non ita cum mammillis cõmunicatur. sed transit in menstrua, aut ad nutriendum foetum.

De anatomia matricis.

ET vt continuetur hic sermo si facis anatomiam in muliere post vasa spermatica

debes videre anatomiam matricis eius: sicut in alijs membris. Videas primo locum & colligantiam. Secundo figuram. Tertio quantitatem, Quarto substantiam. Quinto numerum partium eius, Sexto iuuentutem, & nocumenta eius.

Locum eius videbis, quia est situata in concavitate alchatim, & est circumdata concavitas illa spōdylib⁹ allauis, & caudē a parte posteriori, & a parte anteriori: pars quæ dicitur pecten siue femur, quia ipsa immediate est locata inter intestinum rectum, quod est sicut culcitra eius a parte posteriori, & vesicā ex parte anteriori: & specialiter quantum ad collum eius, quia eius collo supereminet collum vesicæ: licet concavitas eius altior sit concavitate vesicæ: inter dextrum autem & sinistrum est in medio posita directe.

Secundo videas colligantiam eius: quia magna est, quia colligantiam habet quasi cū omnibus membris superioribus: quia cum corde et hepate mediātibus venis et arteriis, cum cerebro ratione neruorum multorū: & per consequens cū stomacho ratione vtrorumq̃: cum membris quæ in medio sunt, vt cum diaphragmate, renib⁹ et, myrach: quia mediantibus his cum prædictis alligatur, & specialiter

specialiter cum māmillis, vi dixi: licet etiam cū eis sit colligantia mediantibus alijs venis, quæ oriuntur a vena cyli ascendēte, quæ oriuntur sub furcula vt infra dicitur. Est etiā colligantia eius cum membris inferioribus vt vesica per collum eius, et intestinū colon. Colligata etiam est anchis vel iuncturis amabus, sciæ per duo ligamenta grossa, & fortia alligantia matricem ad anchas, quæ iuxta matricem sunt lata, et grossa, et iuxta anchas subtilia, procedētia sicut cornua a capite animalis. Et ideo vocata sunt cornua matricis.

Figura eius est quadrangularis cum quadam rotunditate habens collum longum inferius: & causa huius figuræ fuit exigentia loci, & utilitas siue necessitas propter quam fuit creata, quæ postea dicētur, quia propter talem figurā habet distinctionem cellularū septem, quæ dicentur inferius.

Tertio videas de quantitate eius: quantitas eius proprie mediocris est secundū quantitatem vesicæ: variatur tamen ratione aliarum: quia maioratur & minoratur ratione coitus & impregnationis: quia mulier, quæ foecundauit, habet matricem maiorem, quā sterilis. Secundo ratione coitus: quia mulier vtens coitu maiorem habet matricem vir

gine, vel continentis, vt accidit viris in mem-
bro pudendo: eo quia operatio magnificat
membrum, secundum Gal. 6. de interiori-
bus. cap. vlti. Tertio ratione ætatis, quia iu-
uenis maiorem habet matricē, quā habeat
puella, & senilis. Quarto ratione comple-
xionis & humiditatis totius ista potes colli-
gere ex fen. 2 1. tertij. cap. præallegato. Et
propter istas quatuor causas mulier, quam
anatomizauit anno præterito scilicet anno
Christi. 1315. de mense Ianuarij maiorem in
duplo habuit matricem, quam illa quā ana-
tomizauit anno eodē de mense Martii. Po-
tuit etiā esse vna causa, quam ponit Auic.
scilicet quia prima erat tunc menstruata, &
in tēpore menstruationis etiā impingua-
tur & ingrassatur matrix, diuersificatur etiā
matrix in quantitate ratione generationis:
quia matrix animalis plurium generatiui
maior est quā matrix vnus generatiui. Et
propterea centies erat maior matrix porce
quā anatomizauit anno domini. 1316. quā
vnquā viderim in foemina humana: potuit
tamen esse alia causa, quia erat prægnans &
habebat in vtero. 13. porcellos, & in ea mon-
strauit anatomiam foetus siue prænantis,
quam tibi narrabo.

Quarto

Quarto videas eius substantiam. Substantia eius est nervosa & pelliculosa, vt possit dilatari ad foetum continendum: & ideo est frigida & sicca complexionis, & etiam substantia eius spissa multum, quae subtiliatur in dilatatione necessaria.

Quinto videre debes numerum partium eius: ipsa enim habet partes exteriores & interiores. Exteriores sunt latera eius quibus sunt alligati testiculi: & vasa seminaria iam dicta, & cornua eius, et collum cuius extremitas est vulua,

Et circa collum nota quod ipsum est longum in quantitate palmi, vt virga, latum & dilatabile: & ideo pelliculosum & rugosum rugas habens ad modum sanguisugarum: vt titillatio ei ex virga in coitu contingat & in extremitate coli eius intra vuluam est extremum coli vesicae versus superius: & in extremitate vuluae sunt duae pelliculae se eleuantes et deprimentes claudentes orificium dictum, vt prohibeant ingressum aeris & rerum extrinsecarum in collum matricis vel vesicae, sicut pellicula praeputii tuetur veterum: & ideo vocat eam Auicenna loco praerallegato praeputia matricis.

Partes intrinsecas videre potes eam scindendo

dendo per medium: & tunc videbis os eius, et concauitatē eius. Et os eius est neruosum multum factum ad modum oris catuli nuper nati: vel vt proprius loquar ad modum oris tinea antiquæ: & in superficie eius est velamē subtile in virginibus, qui in uiolatis rumpitur: & ideo sanguinatur. Concauitas vero eius habet septem cellulas: tres in parte dextra, & tres in parte sinistra: & vnā in summitate siue in medio eius: & istæ cellulæ non sunt nisi quædam concauitates in matrice existentes, in quibus potest sperma coagulari cum menstruo & contineri & aligari orificiis venarum.

Ex his omnibus apparent iuuaementa matricis: quia principaliter est facta propter conceptionem: & ex consequenti vt totum corpus superfluo sanguine indigesto mundificetur vel purgetur. Et hoc in homine: quia alia animalia fluxum menstruorū non patiuntur: quia tales superfluitates confirmūtur in eis: vt in pellibus, pilis, unguibus, & rostris, pennis, & huiusmodi, homo autem caruit his.

Et ex his patet quod multis passionibus est submissa, et multa membra per compassionem ei compatiuntur, quæ sint passiones ei propriæ

ei propriae, & accidentia, & causae, & curae longinquū esset narrare, & extra propriam intentionem: sed quere in locis praeallegatis appropriatis ut in tertio cañ. 21. fen.

Passiones, quae eidem compassiones existunt, sunt tot quot sunt membra, quibus est colligata, siue localiter alligata, quae sint illa iam dictum est, & vidisti.

Vnum tamen ex anatomia potes perpendere quod ponit Gal. 6. de interioribus. cap. 4. scilicet quod suffocatio matricis non fit: quia matrix corporaliter moueatur usque ad collum, gulam, & pulmonem: quia hoc est impossibile. sed hoc contingit siue accidit: quia ipsa non potest expellere vapores per partem inferiorem, propter aliquam causam mouetur, et constringitur in parte inferiori, ut expellat ad superiora. Et si isti vapores per colligantiam iam dictam perueniant ad stomachum faciunt, singultum & eructationem frequenter: & tunc mulieres dicunt quod habent matricem in stomacho. Si vero hi vapores perueniunt ad pulmonem uel ad diaphragma, et impediunt operationes eorum, scilicet anhelitum, dicunt mulieres quod habent matricem in gula: quia gula siue trachea arteria est ordinata ad anhelitum
 immediate

immediate. Si uero illi uapores perueniant ad cor, quod raro contingit, suffocationem patiuntur cum syncope: & tunc dicunt mulieres quod matrix earum peruenit ad cor. Verum est quod hæc suffocatio fit per compressionem ad diaphragma, propter alligantiam, quam habet ipsa matrix cum diaphragmate, & cum lumbis. Non enim ipsa peruenit ad ipsa membra, sed uapor. quomodo autem possit & per quas uias peruenire ad ipsa potuisti uidere. quæ sit cura, & cum quibus, quæras ab auctoribus: quia anatomia in his principaliter dat notitiam locorum.

CVRTII.

Post anatomiam uasorum feminalium, ea succedit, quæ est de Matrice in qua exponenda incipit Mundinus à situ, quod posita sit inter os quod sacrum dicimus, & os pectinis, de quibus suo loco dicemus. Est igitur matrix inter hæc ossa, & intestinum rectum, & uesicam; tamen secundum se totam tangere uidetur intestinum rectum, quando est mediocris quantitatis, & superiori uero parte excedit uesicam secundum collum. cuius positionis causa, cur scilicet ante quidem uesica, retro uero sit rectum intestinum, refertur à Galeno libro decimo quinto De usu part. cap. vlt. quoniam, scilicet, melius erat ipsas materias foetu gerendo extensas, ex posterioribus quidem partibus uelut substratum aliquod secundum dorsum, ex anterioribus

ribus vero tāquam propugnaculum habere: nam si nulla in medio locata esset particula, nocua fieret ei ossium circum iacentium vicinia. hæc igitur est eius rei causa, quā Mūdinus inturbat, quā refert potius. Non potuit autem in alia parte commodius collocari, quā in ventre inferiori, ob tres præcipuè vsus, quos refert Galen. quarto decimo De vsu part. cap. 3. Nam alibi esse non potuit, cum alij ventres sint ossei, non enim possent intumescere, cum vtero ferre oporteret. Præterea ideo posita fuit in inferiori ventre, atque in eius fine, vt facilius foetus emittat. Tum vero propter coitum, debebat enim esse longè à facie. Cur autē sit in media corporis parte declarat Galenus decimo quinto De vsu part. cap. 2. inquit enim Quod autem neque ex sinistris partib⁹ loci, vbi nunc est: neque à dextris, sit, hinc disces. Dictū enim est sæpius & antea quod quando vna particula non est alteri coniugata, eam, quæ in medio est, positionē requirit, præter Iecur, & Splen. quæ cum non sint gemina, non tamen sunt in medio. Quod ad colligantiam attinet, supinus mihi videtur ac negligēs Mundinus. inqt enim, quod alligatur cerebro, cordi, & hepatis. Sed hoc modo faciliè esset omnium membrorum coniunctionem afferre, nam & reliqua membra ita iunguntur, cerebro quidem per neruos, cordi per arterias, hepatis per venas. Sed hoc vniuersaliter cognoscendum est, in singulis autem membris propria est colligatio assignanda. Alligatur igitur intestino recto, vesicæ, dorso, & lumbis per mollia ligamenta, sed horum afferenda est ratio, Galen, in libro de anatomia matricis, &

quarto

quibus
alligat
matricis

quarto decimo De usu part. cap. 14. ait Matricem cum multis habere communionem, eorum autem quædã tantum tangit, vt intestina: non nulla ita annexa sunt, vt faciliè ab ipsa diuelli possint, vt dorsum, atq; eius lumbi, quibus cum ligamentis debilibus est adnexa: alia adnata, à quibus non ita faciliè potest separari, vt collum vesicæ, rectum intestinum, vasa seminalia, præterea venæ, & arteriæ, & quibus nutritur matrix. Ea autem ligamenta, quibus dorso, ac lumbis iungitur ideo mollia sunt, quoniam ea plurimum extendi oportet propter foetum, quod fieri minimè potuisset si dura essent. quæ causa est etiam vt matrix nunc ad dextram partem aut sinistram, aliquando inferius, aliàs superius moueatur. Est alia, præter eas quas retulimus, colligatio, de qua Galenus tractat quarto decimo libro De usu part. cap. 13. inquit enim. Venæ vero & arteriæ, non maximæ solum, sed etiam binæ, ad eas partes perueniunt. Vnum enim earum par ex renum regionibus prodit, quod in testiculos et matricum fundum scinditur. Alterum autem par ex vasis, quæ secundum os sacrum sunt, distribuitur, implâratum autem inferioribus partibus, vbi primùm in foeminis quidem est collum matricis, in masculis autem virga (*Καλὸν* vocant) explanatur. Quare autem vasa hæc geminata natura ad matricem produxerit, & quare ita magna, refertur à Galeno ratio eodem in loco. inquit enim, Utilitas autem eorum est alia quidem vt magnorum, alia vt duplicum. Quia enim non sibi ipsis solis nutrimentum, sed etiam conceptis foetibus matrices præparant, propterea
magnis

magnis vasis indigent. Quod autem geminata ea vasa sint delectatio in coitu causa est; natura etenim instituit vt sanguis ille decidat ab arteria, & emulgente vena sinistra parte, vt haberet serosum & impurum sanguinem, qui delectationē in coitu creter. Sed quoniam puriore etiam sanguine opus fuerat facta sunt alia etiam vasa ab osse sacro, quæ puriorem sanguinem in matricem deferant: eaque vasa seminalia ad fundum vsque matricis perueniunt, in eamque semen emittunt, alię verò venæ & arteriæ in matricis fundo implantantur, per quas fluant menstrua: atque ideo prægnante muliere potest quandoque menstruum exire absque villo foetus incommodo, quandoquidem potest menstruum, clausa etiam matrice, per illos egredi meatus, qui collo matricis terminantur. de qua re Galen. quinto Aphor. 60. ait quod si semel aut bis, parum menstrui sanguinis excernatur nihil de trimēti foetus plerūque caput. de hac eadem etiam re idem in libro de anatom. matricis, tractat. Nervus verò, qui ad matricem tendit, oritur à dorso, protenditurque plurimum ad collum matricis, ad eius vsque concavitatem, vt maiorem delectationem in coitu moueat. Figuram matricis ait Mundinus esse quadrangularem, cuius duas afferit causas, primam, quia locus eam figuram postulabat, Alteram, vtilitatem, vt posset in septem cellulas distingui. Verum non omnino primum illud verum est, quod figuræ sit quadrangularis, id enim exterius tantum accidit, nā interius rotunda est. Quod Galen. ipse asserit in libro de anatomia matricis, dicit enim eam vesicæ similē esse quoniam figura

contra illos
 quæ asserit
 villo patet
 mulieris
 mensura
 emittent
 in Coccyne

ea sit maximè capax, Et octavo De vsu part. cap. 11. ait omnes corporis meatus, venas, arterias, omnesque ventriculos sphaeræ futuros similes fuisse: verum, propter firmationes, quæ sunt eis super aliquas adiacentium corporum complantationes, certitudo & perfectio sphaeræ corrumpitur, rotunda verò figura adhuc remanet. Quare ratio Mundini nil valet, neque enim locus prohibet quominus sit rotundæ figuræ, & si non omnino sit sphaerica: etenim vesica, & rectum intestinum sunt prope matricem, neque tamen ea locus prohibet quin rotundam figuram seruent. Quod verò ait diuidi matricem in septem cellulas falsum esse posterius ostendemus. Quantitas matricis est mediocris, si mulier non sit grauida, ad similitudinem vesicæ, fit autem maior ob frequentem vsu coitus, quod de matribus vsu venire ait Galenus de locis affect. libro sexto, cap. vlt. crescitque, & minuitur ex ætatis varietate. Nam virginib⁹, & vetulis parua est, quod rectè declarat Galen. quartodecimo de vsu part. cap. 4. cum ait matricum opus, neque dum augentur adhuc animalia, neque iam senibus factis contingit probè fieri: in senescentibus enim, propter imbecillitatem virtutis non coquitur bene alimentum, vt amabile sit eis si ad propriam vtilitatem construi sufficit: in eis verò quæ augentur, virtus quidem est fortis, & propter hanc benignum et concoctum nutrimentum plurimum: conuenienter autem in duas actiones eo nutrimento vtitur, scilicet nutritionem & augmentationem, nihil dimittens superfluum. In solis igitur videntibus & florentibus, ceu augmento iam cessante, &

virtute

virtute adhuc forri existente benigni nutrimenti copiosa est abundātia. Et propter hoc natura quidem in ijs animalibus maximas efficit matrices: in imperfectis verò, & illis qui senuerunt, paruas. Ex quibus verbis facile cognosci potest, quā minime mirum sit, si viro & foemina adolescentulis existentibus, foetus imperfecti producuntur, etenim genitalia membra perfecta adhuc nō sunt, eō que nutrimento corpus adhuc eger. hac de causa cauendum est, ne tam citò nubant, præcipue mulieres, quæ materiam conferunt ad generationem. præterea matrix est maior quando profluunt menstrua, & quando mulier est grauida: tunc enim extenditur, & tenuis efficitur: atque ideo à conceptu maior remanet. Quod autem dicit Mundinus ex coitu matricem fieri ampliorem falsum est. quoniam non matrix, sed matricis collum exercetur in coitu, vt declarat Auic. 21. tertij, ca. 1. Matrix enim collum habet ad proportionem virgæ, qua vti consuevit. Ex his declarat Mundinus substantiam matricis, dicitque eam esse neruosam, & pelliculosam, vt extendi possit: de qua Auic. tractat, & Galen. locis paulo ante adductis. Illud tamen est animaduertendum, quod cum dico substantiam matricis esse neruosam nō intelligo quod multos habeat neruos, sed quia substantia eius ita extendi potest, ac si esset neruus: etenim vnum tantum habet neruum. His dictis, procedit ad declarandum numerum partium, dicitque quasdam partes esse exteriores, vt sunt vasa seminalia, testiculi, cornua illa, quibus alligatur anchis, & collum eius, quod durum est, & neruosum: de quo Galen. 14. lib. de

vsu partium cap. 4 hæc verba habet. Matricum
 collum (quod viam intro quidem spermatis, foras
 vero perfecti iam embryi præparauit natura) ad
 muliebrem pudendum desinit: & clauditur quidem,
 cum concepit animal ita exactè, vt neque mini-
 mum vel intus foras relaxet, vel foris intro accipi-
 at: aperitur autem in coitu, & tenditur tantum, vt
 per amplam viam allatum sperma facilè perueni-
 cat ad spatium matricum internum. In partu vero
 plurimum distenditur, vt totū hac via pertranseat
 embryon. Rationabiliter autem neruosum, & du-
 rum factum est à natura: neruosum quidem, vt
 plurimum vicissim contrahatur, & dilatetur: durū
 autem, ne quid patiatur in huiusmodi transmuta-
 tionibus. Sunt autem in eo quædam plicationes,
 & inuolutiones, quæ conferunt ne matrix ab aëre
 frigido corripiatur. Nam cum menstrua procidunt
 (tunc enim collū tenditur) matrix solet plurimum
 lædi ab ijs rebus, quæ solent mouere frigiditatem,
 propterea cum non est tempus coitus, nec partus,
 nec mensium, tūc collum matricis propter dictum
 vsu complicatur. Huius extremitas est vulua,
 Eadem autem sunt membra in viris, quæ & in
 mulieribus: vt docebat Galen. decimo quarto de
 vsu part. cap. 6. sed in virgæ, & vuluæ extremi-
 tate sunt præputia, quæ dicebat Galen. 15. de vsu
 part. cap. 3. facta sunt ad ornatum; præterea etiam,
 ne refrigerentur matricis obiecta sunt aëri. Scissa
 matrice apparet os eius, quod non dissimile est ori
 rincæ. Mund. ait hoc esse velum quoddam, quod
 rumpitur primo coitu: vnde etiam sanguis effluit.
 de hoc autem nihil meminit Galen. Auic. 21. tertij
 cap. 1.

vulua
cum gustu
matrix no
aperit, ne
q. q. foras
emittit, si
me dicit
Sal. 5. Ap
bo. si se
mel aut vis
pari mēst.
Sanguis ex
ernat nihil
dehinc factu
pleruq. caput
os matricis
in Rinca
simile est
cap. 1.

vltimū autē de q. loq. seu pellicula ē quam vulgō
 appellat il. pubisello.

cap. 1. ait, quòd cum virgines incipiunt coire venę, quę in eis sunt plicis, rumpuntur, facta extensione colli matricis. hoc idem Rasis attestatur 1. ad Almans. cap. 6. Auer. autem 1. collect. ait venulas illas facere pāniculum in ore matricis. sed ad hoc videndum necesse foret facere anatomiam virginitis vluę. Quod verò Mund. ait septem esse in matrice cellulas, falsum est. Nullas enim videre est, præterquam duas. nam si extrahatur illa membrana, quę est intra matricem, apparebunt duę partes matricis, quę sunt duę cellulę. san' ego nunquam alias vidi, præterquam septem concauitates, quę sunt ora venarum ad matricem transfunduntur; quas si velit appellare cellulas, cum eo mihi non erit certandum. Enimvero Galen. 14. de vsu part. cap. 4. ait, naturam ijs, quę duos foetus pariunt, duas etiam cellulas, & totidem mammas dedisse; alijs autem plures secundum numerum foetuum. Videndum nuñc est quot tunicas habeat (Nam Mund. tacet) Galen. 14. de vsu part. cap. vlt. quærit quare matrix vnā tantum habeat tunicam, in libro autem de anatom. matricis, dicit eam habere duas tunicas. Inquit enim vesicam habere substantiam durā: ideo non esse periculum, vt ab vrina vlceretur. propterea vnā tantum tunicam habuit. Itidem & vesicā felle: intestina autem quoniam digerūt, ac per ea transit cholera, natura instituit, vt duas haberēt tunicas, vt etiam si vna læderetur, altera tamen superesset. in matrice verò: ceu quę sanguine puro, & benigno nutritur, vna sufficit tunica: in qua omnem speciem vilorum natura fabricata est. Hęc enim sunt, Galen.

verba. quomodo igitur in libro de anatom. ma-
 tricis dicit eam duas habere tunicas. Dico quod
 quemadmodum dicunt nonnulli stomachum tres
 habere tunicas, quoniam inter duas habet mirach,
 quo operitur. tegmen autem illud non est de mem-
 bri essentia, ita etiam in matrice. nam pars illa di-
 citur esse de membri substantia, quæ conuenit ope-
 rationibus eius, matricis autem munus est semen
 attrahere, concipere, fortumque emittere: atq; hæc
 ope villorum facit. quare dicendum est, quod in
 stomacho & matrice tegmen illud dici tegmen
 non debet, est enim membrana quædam defendens.
 non pars matricis. Cum enim dicimus. matricem
 vnam habere tunicam. intelligendum est de ma-
 tricis propria substantia. Extracta autem matrice
 vult Auenz. lib. 2. tract. 5. cap. 4. posse mulierem
 viuere. necessaria enim (inquit) non est ad vitam
 indiuidui. Vtilitas matricis manifesta est, quod sit
 locus conceptionis. quod vero ait Mund. factam
 esse vt sanguis menstruus purgetur, falsum esse
 inquam, non enim ea de causa facta est, quoniam
 potuissent purgari menses per venas quemadmo-
 dum est de venis hemorrhoidalibus. Ponit postre-
 mo ægrotudines matricis. ex quibus illud norandū
 est, quod fallunt, qui dicunt matricem ascendere
 ad gulam, & caput. quorum opinionem refellit
 Galen. libro 6. de loc. affect. cap. 4. cum reddit cau-
 sam quare modo sursum, modo, in latus retrahi vi-
 deatur. nō enim est quod matrix ipsa ascendat. aut
 moueatur: sed quoniam ex materia quæ in ea cor-
 rumpitur extolluntur fumi ad diuersas corporis
 partes, hinc variæ oriuntur ægrotudines.

non dā
 error
 exprimit.
 ed longe
 liā eo m
 ecc Gal
 Hipp! m di morbis m hēz.

De

De anatomia didymorum.

ETiam narraui anatomiam vasorū sper-
 maticorum mulieris: & visa est conue-
 nientia ipsorum in viris & mulieribus quā-
 tum ad originem: Sed differentia est: quia
 cum in viris testiculi sint ad extra, sicut sunt
 in quolibet animali: quod debet esse moro-
 sum in coitu: sicut omnia quiadrupedia, pre-
 ter Eritium. vasa spermatica intra myrach
 non terminantur, sed egrediuntur myrach,
 & testiculis copulantur vt duobus suspenso-
 rijs: quia membra nobilia, vt sint tuta à no-
 cumentis extrinsecis, debent esse velata pan-
 niculis. Ista vasa non contenta in siphac con-
 tenta & velata sunt panniculis, vel pannicu-
 lo orto à siphac, qui nominatur didymus:
 cuius orificium est in fine illorum clausum
 secundum naturam existens. In processu ei-
 us secundum quantitatem vasorum dilata-
 tum existit, et in fine eius dilatatur ad quan-
 titatem testiculorum. Et in parte illa voca-
 tur bursa testiculorum siue oscheū. & sic ap-
 paret cuius figuræ sit iste didymus, & cuius
 quantitatis sit, Et numerus partium eius,
 substantia, positio, siue colligantia: apparet
 etiam iuuamentum eius: quia factus est ad
 continendum & custodiendum testiculos,

& vasa spermatica peruenientia ad eos.

Aegritudo igitur specialis eius, cuius cognitio & cura declaratur ex anatomia, est dilatatio orificii eius præter naturam, quæ causa est vt illa quæ continetur intra siphac descendant in oscheū: et talis descensus dicitur hernia: & quia illud quod descendere potest est ventositas, vel aquositas, vel intestinum. Hernia triplex est: ventosa, aquosa, & intestinalis. Carnosa autem non causatur ex descensu alicuius: Curantur autem hæ passionēs per emplastra cōstrictiua & ligationes secundum quod ponūt auctores. Sed illa quæ est intestinalis quando præcessit prædicta cura & non curatur chirurgia proprie curatur: & modum videas, quia supinatur homo, & intestina intromittuntur, siue ad proprium locum reducuntur. Postea testiculus ducitur superius donec sit in altiori loco in quo possit esse: & illum locum signa, quia tunc directe est supra os femoris: quia in loco illo debet fieri incisio vel perforatio & non supra locum illum. Quia tunc perforaretur myrach, & aliquod intestinorum. Non etiam debet fieri infra locum illum, quia remaneret post consolidationem illa eminentia magna præter naturam, à signato loco debet

bet fieri perforatio: & ista fit à quibusdam cum rasorio, & citius expediunt & vadunt circum circa excarnādo didymum & etiam testiculū ab oscheo. Postea ligant in parte superiori & abscindunt didymum & vasa spermatica cum testiculo, & consolidant postea. & ista cura cito fit. Et quidam sunt, qui solū excarnant didymum & nō testiculū, & suūt & ligāt in parte superiori, & ponunt medicina fortiter constrictiua & sic dimittunt. Et fit ista perforatio cum caustico rumpēte & adurēte cutim in loco illo: postea ponūt arsenicum quod corrodit, & causticat & constringit, adurēdo & cōtinue partes didymi corruptas extrahūt: postea vero cōsolidāt.

CVRTII.

Quæri solet quam ob causam homo testes habeat exterius: nonnulla vero animalia interiūs. cuius rei rationem reddit Arist. lib. 1. de generat. animal. cap. 4. his verbis. Restat vt melioris cuiuspiam notę gratia testes habeantur. Sed enim maximæ animalium parti munus nullum ferē aliud est nisi quod plantarum semen & fructus. Vt in radone cibi voraciora auidioraq; sunt, quibus intestinum rectum. sic ea quę testibus carent meatūsque tantum habent, aut non carent, sed intus habent, omnia propensiora celerioraq; ad venerem sunt. At vero quę castiora esse conuenit, nō vt in cibi vsu, in resino nō opus est recto: sic meatus illi

reuolutionem anfractibusque habent, ne libido ve-
 hemens crebraque excitetur. Galen. vero 14. de
 vsu part. cap. 11. causam huius reddens, quare natu-
 ra in homine posuerit testes exterius, ait. Quod
 quæ animalia plures generant fœtus, vt aues, acer-
 uare oportebat multum seminis, & propterea hæc
 vasa in loco calido locari melius erat, vt citius
 concoquerent, & elaborarent influentem sibi ipsis
 humorem, quare posita sunt propè diaphragma,
 inter cor, pulmonem, hepar, & splenem, vt multū
 seminis possint generare: homo vero quoniam
 testes habet satis per se calidos, & quia non opus
 est, vt tot fœtus generet: tum vero quia spatium
 quod est inter diaphragma minus est, quam in ce-
 teris animalibus: idcirco testes exterius positi sunt.
 continetur autem testes duobus vasis didymis ap-
 pellatis. nam membrana, que mirach dicitur, per-
 foratur, & inde exeunt vasa spermatica: peritoni-
 umque pcedens laxatur, vt sacculus, ad testiculos
 continendos. Apud quosdam nomen didymi signi-
 ficat testem ipsum, Nos autem accipimus didymū
 pro concauitate ea, quam peritonium protensum
 facit: in qua testes ipsi continentur. Sunt qui velint
 pāniculos eos, qui sunt in fundo appellari nomine
 oschei, aut seroti. Alij verò censent ὄρχηρον signifi-
 care cutim, quæ didymos & testiculos ambit. meli-
 us tamen est, vt dicamus eo nomine significari cuti-
 rim, quæ sacculum totum circumdat. Ad testiculo-
 rum verò motum sunt musculi, quoniam chordæ,
 secundum nonnullos, permisceantur cum didymis.
 Quod ad egritudines attinet, accidit didymis her-
 nia, quæ triplex est, ventosa scilicet, aquosa, & quæ
 intestinalis

intestinalis dicitur. fitq; cum meatus didymorū laxantur (Nam dum stricti sunt per eos nō transeūnt nisi seminalia) tunc enim transit aliquando omentū, quādoq; Intestina, aliās flatus, aut aqua. atq; his modis diuersæ fiunt species herniæ. Nonnunquam etiam fit hernia varicosa, que accidit cum venæ testium replentur. Idem est de hernia quæ carnosa dicitur. Hæ tamen posteriores herniæ species non fiunt propterea quod meatus aut laxentur, aut rumpantur. Huius curatio duplici modo fieri solet, vno quidē sine chyrurgia: cum scilicet ligatur imponiturq; emplastrum ex arietis pelle, quod adstringit. atq; is modus valet in pueris, in adultis non item. Alter modus est per chyrurgicū opus, cum facimus testiculū ascendere, incidimusq; neq; altius nec secantur intestina, neque inferius, tunc enim descenderet atq; intumesceret. quamobrem oportet secare vbi est primus didymus. Tum excarnatione facta ligare opus est. didymūq; vna cum testiculo extrahere, hoc enim modo nihil in testiculorum sacculum descendet. Alij vero omnino à sectione abstinere: verū applicant caustica atq; adstringunt. Sunt etiam qui applicent caustica potèntialia. Isti modi autem faciunt, vt testis deperdatur. Et præter hos alius item modus, cum acu perforatur & stringitur meatus ne quid descendat, verū difficilis est quia cum semel natura cepit laxare, difficile est adstringere, nisi testes abscindantur omnino.

De anatomia testiculorum, &
vasorum spermatis,

Ex

EXpedito didymo debes videre quod ponunt auctores: scilicet quod vasa spermatica sunt duplicia: scilicet præparantia, & differentia. Præparantia sunt quæ descendunt a locis prædictis: scilicet testiculis: & circa partem superiorem testiculorum inuoluuntur, & saccum quasi ibi faciunt. Non enim substantiam testiculorum ingrediuntur. & ista vasa sunt venosa & nervosa. Alia vero sunt quæ istis continuantur nervosa magis: & quâto plus ascendunt ad testiculos, magis sunt nervosa, & ascendunt vsq; ad locum ossis femoris, vbi incipit didymus egredi. Et tunc profundantur interius iuxta loca vesicæ vel colli eius: & tandem procedunt ad virgam, & ad meatum virgæ perueniunt in loco, qui est in foramine ossis femoris: & tunc per meatus qui sunt ibi duo, sicut vasa spermatica sunt duo, emittunt sperma quod apportatur a testiculis, quod ab eis generatum fuit in alijs vasis: & illud sperma emittunt in cannale virgæ, & postea virga extra emittit. Verum est quod illa foramina non bene poteris videre nisi quâdo anatomizas virgam.

Et ex his tibi de testiculis hominis & vasis spermaticis apparet figura & substantia: quia testiculi sunt glâdoli, & apparet numerus,

rus,

rus, quantitas, positio, colligãtia, & iuamẽ
tum eorum.

Et ex his apparet ægritudo: quia quando
inciduntur, uel appostemantur, uel oppilan
tur vasa, uel alia de causa materia spermatis
non peruenit, quod cessat coitus, sicut inter
dũ propter oppositas causas fit emissio sper
matis inuoluntaria: & maxime cõtingit, pp
ter spasmum uel propter mollificatiõẽ præ
dictorum vasorum.

CVRTII.

De uasis seminalibus dictum est plurimum in
anatomia matricis: quare nos solum differentiam
quandam declarabimus. ea autem quo ad originẽ
non differunt in mulieribus & uiris, vnum uero
illud est animaduercẽdum. quod pro fundamento
sumit Galen, contra Arist. qui dicebat testes esse
tanquam pondera vasorum seminalium, & quod
abscisis testibus. cor debile efficitur: quoniam ces
sat illa tensio, atque ea causa est quare ñ, qui carẽt
testibus sunt effæminatiores. Galen. uero ait, qua
ratione possunt testes & uasa seminalia tendere
cor, cum tortuose incedunt. ex qua inuolutione se
quitur quod materia in eis melius digeritur. dein
de transit ad testiculos. Idem 1. de semine cap. vlt.
& 14. de usu part. cap. vlt. ait naturam inuenisse
ἐπιδιδυμῶν, hoc est testium inuolucrum: quæ est
cutis ambiens didymos. de ea uero nihil Mundi.
dicit. atque illi cuti natura coniunxit uasa sper
matica: nõ cum carne glandulosa, quod ideo factũ
est,

est, ne sine medio res molles à dura tangantur. vasa enim seminalia dura sunt, quæ si essent sine medio alligata carni glandulosæ fieri nõ posset, quin ea læderetur. hac igitur de causa natura posuit cutim cum qua iunguntur vasa seminalia, ea scilicet quæ præparatoria dicuntur. Hoc loco dubitatur an vasa spermatica aperiantur, materiæque similis accipiatur in carne glandulosa, vt concoquatur: deinde ingrediatur uasa deferentia, pro qua re dicendū est, semen ingredi substantiam testium: Quapropter Arist. etiam 1. de generat. animal. cap. 4. ait quòd in auium genere, & quadrupedum eorum, quæ oua pariunt, testes excrementum recipiunt genitalia. Itaque tardiùs hīs, quàm piscibus semen prodit. patet hoc in auib⁹, cum tempore coitus testes multò habeant grandiores, quæ certo tempore coeant. At vbi id tēpus præterierit adeo exiguos habent, vt incertum ferè, an habeant, sit. cum tamē eo tempore, quo coeunt, gerant prægrandes. cuius rei signum est, quod semen intra se recipiunt: vt etiam concedatur, semen illud non intrare substantiam testium, sed tantum circa eorum carnem inuolui vas feminale: in eoque remanere semen: tunc potest caro testium agere & transmutare ipsum sanguinem in semen: sicut hepar conuertit chylum in sanguinem, tamen si chylus fortè non egrediatur venas. vasa vero deferentia descendunt, rursusque reuertuntur ad os vsq; pectinis. deinde intra ipsum veniunt, quousque ad radicem virgæ penetrent. Hunc autem processum dedit his vasis natura, vt materia magis concoquatur, dicunturque Græcis *μαρμαριται*, id est iuxta virgam adiacentia. Qui lam
appellant

appellant variciformes prope penem, quia sunt ampliora, vt dicit Galen. i. lib. de semine, cap. vlt. componuntur hæc vasa ex vena, arteria, & regente peritonio. Testes autem ipsi sunt glandulosæ carnes. Reliquum est exponere quem nobis præbeant vsum vasa ista: nam Arist. i. de generat. animal. cap. 4. vult non necessarios esse testes ad animalium generationem: sed tantum quia melius ita est. Galen. verò vult omnino quòd sint princeps membrum, sine quibus animalia generare minime possint. vtitur autem Arist. hoc præcipuè argumento. inquit enim. sed non necessarium id esse membrum ad generationem patet omnibus enim, quæ generant, adiunctum esset, si necessitatis ratio haberetur: nunc verò nec serpentibus, neque piscibus testes sunt: visi sunt enim cotre, plenosque seminis generalis habere suos meatus: sed hoc etiam Galen. concederet, quòd in ijs quæ testibus carent, testes non sint necessarii. de ijs verò quæ habent, vtrum necessarii sint, quæritur. sanè Arist. videtur velle eos non esse necessarios: affertque exemplum Tauri, qui cum statim à castratione inisset, impleuit. quare eum vsum præbent testes generationi, quomodo pondera textrices relis annectunt: his enim detractis, inquit, meatus intrò se retrahunt, hæc in re Auer. dicit, quòd si verum est, quod refert Arist. de Taurò, potest eius ratio defendi: si minus: nequaquam. ad hoc tamen Galen. diceret, quòd Taurus impleuit, quia erat iam semen conceptum in vasis. Quare, si velit Arist. semen generari absque testibus proculdubio fallitur. Reliquum

quum est declarare modum ægritudinis, quæ dicitur γονορρῆσις, cū scilicet inuitis etiam nobis effluit semen: declarauimus vasa seminalia preparatoria, & deferentia, quæ prope virgam laxantur, quò modo se habeant. in ijs semen contentum aliquando fluit inuito, sine virgæ tensione. Declaratū est etiam, quod venæ omnes habent duas tunicas, & tria villorum genera: ac per rectos quidem attrahunt, per transversos retinent, per obliquos expellunt. Ita vasa seminalia mediantribus villis transversis, cum se contrahunt, continent quod intra est claudentes meatus: cum autem expellere oportet, aperitur orificium inferius, pars vero superior circumtrahitur: atq; eo modo expellunt quod in eis est. Igitur duobus modis semen effluit, aut enim expellitur, aut à membro contineri non potest, Idem enim est, ac si dicamus seminis fluxum euenire aut propter debilem vim retentricem, aut vehementem expultricē: tamen si expellendi virtus utcumque valida sit, nūquam gonorrhœam producit. nūquam enim virtus, quantumuis vehemens, expellit non opportuno tempore. quo fit vt continuè nō accidat expulsio. quapropter relinquitur vt seminis fluxus ex infirma retinēdi virtute producatur. quemadmodum enim longinqua retentio non fit propter fortem retentricem, sed propter debilem expultricē (Nam facultas retinendi, quamuis validissima sit, non tamen præter debitum tempus continet) ita etiam expellendi virtus præter tempus non expellit. Hoc declarat Galen. 6. de loc. affect. cap. vlt. cum, inquit, fluxum superfluum ex infirma retentricē prouenire: Hæc autē potest ex

nimia

nimia quantitate fieri, quæ nō possit contineri. præ-
 terea etiam ex materiæ qualitate, quæ expultri-
 cem stimulet. Igitur si ex nimia quantitate semen
 effluat, exitus continuus minuit quantitatem, atq;
 eo modo per se ipsam curatur. si vero materia sit
 acuta, opus est frigidis, quibus qualitas illa laetitia
 remittatur. si sit infirma retentrix, opus est stipticis
 interius, per en hæmata applicatis, & exterius per
 decoctiones, & epithemata, quæ concentricam fa-
 cultatem restituant, eorūq; virtus astringat vil-
 los, semēque retineat. Quidam recentiores practi-
ci distinguunt: aut enim huiusmodi seminis fluxus,
 inquit, est cum tensione virgæ, aut non, quibus
 etiam ad stipulatur Mund. cum igitur Gonorrhœa
accidit cum spasmo, virga arrigitur: si secus neque
 ipsa arrigitur. verū hæc opinio aduersatur Galen.
 in 6. de loc. affect. cap. vlt. vbi definit gonor-
 rhœam esse seminis inuoluntarium exitū, absque
 tensione virgæ. quamobrem vasa spermatica pos-
 sunt spasmo affici sine tensione virgæ, et enim quod
 penis arrigatur, pendet ex alia causa. Declarat au-
tem Galen. quod ex tensione, & contractione in
vasis spermaticis accidit seminis fluxus nō volun-
tarius, quemadmodum enim in epilepsia nerui con-
 uelluntur, ita etiam vasa seminalia in eaque con-
 uulsionē expellunt. quare qui in epilepsiam inci-
 dunt, nō sæpenumero semen effluit, propter contra-
 ctionem scilicet vasorum spermaticorum, ex eaq;
 potest seminis emissio provenire. rarò tamen con-
 tingit, vt non connullis alijs partibus, hæc vasa
 conuellantur: quod si connullionē patiantur, oportet
 vti resoluentibus medicamentis, veruntamē

dispositio hæc rarò euenit, siquidem vt plurimum fluxus seminis nò voluntarius ex infirma retinendi virtute illorum vasorum prouenit.

De anatomia vesicæ.

His completis eleua renes, et vade excarnando vnum porum vretidem vel ambos, & videbis quod terminantur ad vesicã iuxta medium eius, & non est perforans vesicam directe vno foramine magno: sed foraminibus magis paruis & obliquis, a lateralibus procedentibus inter tunicam & tunicam, vel inter tunicam & coopertorium. Et hoc fuit factũ, vt quãdo vesicã repletur vrina, nò redeat vrina ad renes: imo quãto plus impleteretur, tanto plus foramina illa clauduntur, quia paries vnus tunicæ ad parietem alterius siue coopertorij applicatur.

Scinde ergo vesicã & videbis magnã eius concauitatẽ, quę neruosa est, et videbis eius collum carnosum & musculosum: vt temporibus determinatis, quãdo oportet, et homo vult, expellat vrinam: et quando est necessarium retinere retineat eam. Et quia musculosum est eius collũ si incidatur vesica in collo eius cõsolidari potest, si vero in fundo nò. Collum autem eius perforatum est foramine magno, per quod emittit vrinam ad canalem

nalem virgæ, & extra egredietur. Nam illud collum statim continuatum est cum preputio virgæ, vt potes videre. & sic ipsius velocè apparet locus, quantitas, siue colligantia, numerus, substantia, et iuuentum.

Aegritudines potest pati omnium generum vel modorum: vnā tamen patitur, quæ dicitur lithiasis. nā in concauitate eius potest generari lapis ex humoribus mucilaginosi congregatis in ea & condensatis a caliditate superflua. Et hic lapis curatur cum dissoluentibus ipsum vel per incisionem.

Nam hic lapis, situato homine debite ne possit se mouere sedendo, debet cum digito posito in anum, & cū manu alia posita super femur, conduci ad collum vesicæ & conductus ibi retineri: & postea debet fieri incisio in collo & cum traiectorio violenter extrahi: & hoc si lapis est magnus. Si vero paruus quod possit per cānale virgæ extrahi debet per compressionē factam cū digitis ex collo vesicæ conduci vsq; ad virgam: & si non egreditur cum traiectorio paruo debet educi.

CVRTII.

Poros vrenides nō ingredi vesicam directè, sed à latere, inquit Mund. Galen. sexto de anatomi. aggr. vehementer ab antiquis dubitarum fuisse dicebat, ex quamam substantia fiare ij pori: vulcæ

ij, se quod hæc vasa habeant vnam tunicam tantum, omiſſa ea, quæ tegit: atque ij pori eandem habent ſubſtantiam, quam & veſica: taléſq; ſunt, vt per eos inſletur veſica: quæ ſi comprimatur, nunquam tamen aër regredi poterit. Idem 5. libro de vſu part. cap. 13. hos meatus indicium eſſe ait pro uidentia ſimul, quæ eſt ad animalia, & eximiæ cuiuſdam ſapientia creatoris. Quoniam autem dictum eſt, veſicam vnam tantum habere tunicam, poſſet aliquis merito dubitare, qua ratione in vna tunica tanta arte potuerint iſti meatus collocari. quandoquidẽ etiam Auic. 18. terrij, duas illi in eſſe tunicas aſſerit. Poſſumus dicere illos meatus, quæ parte applicantur veſicæ, dilatari: atq; hoc modo videri eam habere duas tunicas, illiq; intra peritonium veſicam ingrediuntur, atq; ita ingrediuntur, vt aër quidem per eos externè in veſicam demitti poſſit, nõ tamen per eodem regredi. De collo matricis diminutè loquitur Munſ. quod ſcilicet attinet ad muſculum colli. de quo Galen. lib. 5. de vſu part. cap. vlt. ait, veſica non valde magno eget auxilio muſculi, cum claudi poſſit etiam ſine muſculo. vt autẽ, quicquid vtiq; ex ea exprimente, in vreticum incidit porum, ſufficienter obliquum, hoc non remaneat illi amplius, muſculum hunc, qui ex tranſuerſis villis cõſtat, extrorſum ei poro appoſuit. mox autem ita debebat vtrique & clauſioni oris veſicæ fieri auxiliator. veſica igitur poſt ſe ipſam naturaliter aſtringere, atque ideo non neceſſe fuit muſculum habere, quo aſtingeretur. muſculus vero, qui eſt in recto inteſtino, eſt ad aſtringendum præcipue inſtitutus, cum inteſtina

careant

careant villis. Qui verò musculus est in collo vesicę ea de causa factus est, quoniam collum vesicę contortum est, in similitudinem literę σ , vrinęq; transiens per collum non rota transiret, nisi musculus comprimeret. Factus est etiam ea de causa, vt celerius emittatur vrina: quia vtilitatem hęc musculi, erigentis flexionem colli vesicę, sequitur vt celerius vrina eijciatur. Dicit quispiam, quomodo cognosci potest, collum vesicę esse tortuosum? Respondeo, quod debemus imaginari manū esse os pectinis, vesicam esse in fundo manus, radicem virgę: superius ab osse pectinis, quare si collum vesicę debuit iungi cum radice virgę, oportuit vt flecteretur, in similitudinem literę σ , illud tamen est verum, quòd in mulieribus tantum non flectitur collum vesicę: quia parum ascendit: atq; ideo in viris natura instituit musculum, cuius compressio prodesset ad expellendam vrinam. hoc tamen, Galen. ait, non esse factum propter aliquam præcipuam necessitatem: sed propter ea quę necessitatē sequuntur: etenim si debet esse exterius ab osse pectinis, collumque vesicę iungi virgę: collū oportuit esse tortuosum. Igitur musculum habere debuit. Sunt qui dicant mulieres vrinā, vt viri, tãdiu non continere, quia non habent collum vesicę tortuosum, verum illa colli flexio non facit ad retentionem, sed villi vesicę. vnde quæritur, cur foeminę cum mingunt inflectantur. Cuius ratio sumitur ex anatomia, quia dum flectuntur matrix comprimit vesicam, & ideo facilius mingunt. Cum vero stant rectę, comprimitur à matrice collum vesicę, & ideo nō possunt mingere. Sunt qui dicant,

quòd vrina sponte exit. & quòd possimus cum liber, mingere, quoniam possumus mouere musculū colli vesicę, verum Galen. 6. de loc. affect. cap. 4. ait, quod musculi illius munus non est laxare vesicam: atque ideo non possumus dilatare musculum ad expellendum vrinam. hinc sequitur, quòd emissio vringę fit & naturaliter, & voluntario. oportet enim, quod musculus non premat collum vesicę, ipsa autem infurgat ad expellendum. quo fit, vt cum musculus ille paralyticus paritur, exeat vrina nobis etiam inuitis. quod item contingit, cum musculus ani paralyticus paritur, exeunt feces, etiam si nos nolimus. Nervi, qui ad vesicam veniunt vsum proprium afferunt, vt scilicet multum sentiat: quoniam ad eam cum vrina cholera defertur: Præterea venę veniunt ad vesicam, quę nutrimentum ipsi afferunt, quoniam sola vrina ali non potest. Nunc vesicę ægritudines cognoscamus, quę varię sunt. Est enim ἰσχυρία vringę suppressio: cum scilicet ea emitti non potest. ἀσχετία, id est vringę stillicidium, cū guttatim emittitur. δυσχετία, vringę difficultas. Galen. lib. 6. de loc. affect. cap. 4. viam tradit, qua cognoscamus causas harum ægritudinum. si enim, inquit, homo non potest vrinam emittere; id contingit, aut quia sensus ei deest, quo sentiat nocumentum, aut propter virtutis imbecillitatem, aut quia obstructa est via, aut quia à superioribus vrinam non recipit. In primis si sit vacua manifestè cognoscitur. si via obstructa est, hinc signum capies, quod in pectine apparet grauedo quędam: nec non etiam si immitteras in vesica syringam, ac comprimas, exieritque vrina, manifestè cognosces,

expultricę

expultricem vim esse infirmā. quod si virtus sentiendi sit ablata, nō sentiet vrinam: si vero sit obstructio, cognoscere poteris, si immittere volueris syringā, ea vero penetrare minimè poterit. quare qui cognoscit modū quo vesica operatur, cum cessat operatio, causam huius cessationis facile comprehendet. Quomodo vero ad vesicā veniat vrina dictū est, quod non trahit vesica ipsam à renibus, sed renes potius eam ad vesicā demittunt. His dictis videamus quomodo cognoscere possimus, lapis ne sit in vesica, an nō: hoc autem cognoscitur ex situ colli vesicæ, quod recto intestino adhæret. nam si quis immittat digitū in anum, alia autem manu supra pectinem premat, sentiet facile, si ibi sit lapis. quod si fuerit, debemus tunc lapidē ad collū vesicæ trudere: ac si parvus quidē existat, extrahemus illū per instrumentum, quod trajectorium dicitur. si verò magnus sit incidendū erit collum vesicæ iuxta radicē, atque inde extrahendus lapis. Circa hoc collum vesicæ sunt glandulosæ carnes institutæ ad serosæ humiditatis generationē: cuius usus est, ut delectationē præbeat in coitu: ut ait Galen. 14. de vſu part. cap. 9. & 11. cum inquit, Quod vero in corporibus, quæ à d. v. d. n. vocantur, generatur humidum, ad vreticum porū expellitur: in masculis vero simul cum spermate. vilitates autem eius sunt, & ad veneream excitare copulationem, & in coitu delectare, & vreticum madefacere potum.

De anatomia virgæ.

VLtimo vero est virga continuata cū collo vesicæ carnosio colligata multis liga-

mentis & chordis, quæ oriuntur ab ossè pectinis, cum nervis ortis a nucha: & ideo valde sensibilis & extensibilis est: cōtinuata est etiam cum maximis venis & arterijs ortis à vena descendēte: & arteria in loco vbi bifurcatur ad duas anchas: quia ad linguā & etiā virgā veniunt maiores venæ & arteriæ quā aliud membrum eiusdē quantitatis. Et ideo in locis perineoi inuolutæ sunt istę venę & arteriæ, & sunt magnæ: & ibi est locus siue principiū virgæ: & propter hoc venę sunt sicut radices virgæ: & propter istas virga est tota cavernosa, & suæ cavernositates replentur vêtositate generata in prædictis arterijs: & quādo vêtositate replētur erigitur virga.

Ut melius anatomiam eius videas, debes separare ossa femoris, & eleuare virgam cū vesica, & intestino recto vel sine illis, & diuidere virgam per longitudinem vsq; ad eius annalem: & tunc in principio eius apparebunt duo foramina prædicta: apparebunt etiam cavernositates eius.

Et ex his vides quantitātē eius: quia quantitas siue longitudo eius est vnus palmi, sicut longitudo collis matricis.

Apparet etiam substantia eius: quia nervosa est præter extremitatem eius quę voca-

tur præputium.

Apparēt etiam numerus partiū eius: apparet positio, & colligantia.

Figura vero oblōga: quia virga est in homine absoluta & non applicata ventri, sicut in quadrupedibus: & causa fuit, quia homines in coeundo non coninguntur secundum dorsalia, sed amplexando.

CVRTII.

Plurimum diminutus est Mundi. cum causas narrat tensionis virgæ. Ego autem primū declarabo quæ sit virgæ substantia secundum Galeni mentem lib. 15. de vsu part. cap. 1. cum situm eius declarat, oportuit autem eam esse aliquando tensam, quandoque nonnam si tensa semper fuisset, preterquam quod facile pateretur, adhuc inutilis esset, ac vsui inepta in reliqua vita vniuersa, in vno solo tempore, colus scilicet, vtilis futura, laxata autē si semper esset, inutilis omnifariam semper fuisset. Quippè quod id cuius gratia factū est nunquam agere posset, pars autem, quæ sufficiat ad erectionem primò vena nō fuit apta, quoniam est mollis. Dicit quispiam arteriam potuisse sufficere cui etiam opinioni assentiri videtur Mundi. verū Galen. contradicit: quoniam arteria dilatur, & constringitur illico, quare non diutius esse posset virga erecta. Sed neq; neruosum potuit pendendum fieri, quoniam qui vocati propriè sunt nerui, præterquam quod nullam habent perspicuam, & sensibilem concauitatem, neq; dilatari, neq;

contrahi possunt, mollities etiam non est apta. Ligamenta verò duritie quidem ad tensionem sunt apta, sed caua non sunt. Qui autem ab Hipp. dicuntur *τένοντες*, nos verò tendines vocare possumus; ipsa etiam caua nō sunt, & minus dura sunt quàm ligamenta. Quare nullum genus nerui ad pudendi cōstructionem relinquitur vtile. Propterea inquit Galen. natura inuenit proprium corpus, in quo cōfusa est substantia, & carnis, & ligamentorum, & neruorum habentium concauitates quasdam, quæ cum replentur aëre, virga arrigitur, cuiusmodi substantiam in nulla alia corporis parte est inuenirè. Qua re autem positum in eo loco fuerit pudè dum; inquit Galen. quòd substantia eius, cum sit ex ligamentis, nō potuit alibi collocari; quoniam ab ossibus oritur. Ergo supra ossa pectinis non erat locus, quoniam non oriuntur inde ligamenta, neq; infra, quoniam incommodum fuisset, & dum sedemus, & egerimus. Dicit quispiam, quòd potuisset locari inferius, & rectum esse. Responder Gale. id fieri non potuisse, quoniam debet erigi tempore coitus tantum. Inquit Mund. ad virgam venire venas, & arterias. Id verum est, nam eget venis quidem, vt nutriatur; arterijs verò, vt per eas spiritū, atque aërem accipiat. Quare autem arteriæ in caua sint, vt virga tendatur, tractat Galen. aitque; quod possumus animo concipere arterias illas impellere aërem in virgæ cauitates: quæ arteriæ desinunt in adeò angustas vias, vt sanguis exire minimè possit, sed tantum aër & spiritus. transit autem iste aër, aut quia arteria impellat, aut quia trahatur à virga, cum enim virga dilatatur trahitur

aër ille ex arterijs, nè quid vacuum relinquatur. Possumus etiam dicere, quod arteriæ impellant aërem in cōcavitates virgæ. Sed melius est, inquit Galen. vt dicamus penem propria virtute se extendere, ad quam extensionem aër ingrediatur: quod etiam ratione probatur, nam quemadmodū stomachus primo attrahit propter se, deinde ad alia expellit: sic etiam virga prima est, quæ agat, deinde arteriæ impellunt aërem, motus autem iste sequitur imaginationem. nam cum quis animo res concipit venereas, penis arripitur. Igitur motus naturalis sequitur imaginationem: non tamen sequitur necessario, quemadmodum motus stomachi in vomitu sequitur imaginationem, sed non necessario. Ex hoc apparet, quod antea dicebamus de feminis fluxu, quod & si aliqua materia faciat conuulsionem in vasis seminalibus, non idcirco tamē virga arripitur, nam potest quidem materia conuellere vasa, virgam tamen non tendi. Nunc deinceps videamus reliquas virgæ partes, Galen. enim 15. de vsu part. cap. 3. inquit. decet exactè pudendū tendi in coitibus: non enim sanè, vt forte putaret aliquis, gratia solius coitus: sed vt distendatur, & dilateretur porus, quo sperma longissimè iaculemur, vtile est tendi pudendum. hanc autē vim in parte interiori esse Galen. ait, quo in loco est meatus in rectum ductus, per quem trāsit vrina, & semen. In superiori autē parte est illud corpus carulentum, à lateribus vero sunt muscoli sed dubitabit aliquis, quid faciant muscoli, cum nō pareant voluntati. Dico ego, q̄ muscoli illi faciunt, vt cum virga arrecta est, possimus eam voluntario mouere;

& sursum,

& sursum, & deorsum. Extremitas v. irgæ duas habet partes. nam pellicula præputium appellatur, pars vero carnosâ dicitur $\beta\alpha\lambda\alpha\mu\sigma$ id est glans, quæ facit, vt maior sit in coitu delectatio. penis autem debet esse ad proportionem longitudinis colli matricis: quo fit vt nimia eius breuitas impediât generationem, quoniam immittitur semen in collum matricis, spiritusque seminis ante exhalant, quàm ingrediantur matricem. sed neque nimis longum eum esse oportet: nam tangendo fundum matricis dispergitur semē, & spiritus item exhalant. Dicit hoc loco Mund. quod si secetur virga media, inueniuntur duo meatus vasorum seminalium, verum deberet etiam inueniri meatus, per quem transferrur humiditas illa, quæ facit delectationē in coitu.

De anatomia ani.

ET si cum virga eleuasti intestinū vel extremitatē intestini recti: cuius anatomiam dimisimus supra: tunc cognosce in illo intestino siue extremitate eius, quæ dicitur anus, musculos mouentes, siue aperientes, & constringētes. Et cōsidera quinque venas hemorrhoidales, quæ in extremitate eius sūt magis profunda in quibusdā periodis determinatis aperiantur: & fit fluxus hemorrhoidarū. Et in his cōpleta est anatomia membrorū naturalium, quæ in primo vētre continentur.

C V R T I I.

Errat hoc loco Mund. cum credit, in intestino recto esse musculum, qui dilaret, atque aperiat, quoniam

quoniam intestina satis per se laxantur. Galen² quoq; 4. de vsu part. cap. 19. ait, musculum ani esse ad contringendum, nō laxandum. vnde etiam nomen accepit, nam Græcis σφιγκτικὴ dicitur, sunt præter hunc duo alij musculi altiores, quorum munus est, vt rectum intestinum sursum contineant, quod si quandoque relaxantur ob nimiam humiditatem, tunc rectum exit intestinū. Quare Mund. errare reprehenditur, cum dicit vnum esse musculum astringentem, alios duos aperientes. Nunc videndum est venas hæmorrhoidales, per quas solet sanguis prauus expurgari. Dubitari autem solet vnde ortum trahant, aut ex vena caua, aut porta. Præterea an sanguis ille veniat ex solis venis, an etiam ex arterijs. Dicendum est, quod ramus vnus venę portę demittitur ad intestinum rectū. Auic. tamen dicit, quod postquam vena caua diuisa est in duas partes, ex inferiori parte mittit ramum vnum ad intestinū rectum. Quare colligi potest, ad intestinum rectum venire venas & à caua, & à vena portæ: hoc autē accipitur ex Galen. in lib. de anatom. matricis. sed dicit quispiam, per quas igitur venas excernetur sanguis ille? Nam videtur quidem, quod transeat per ramum portę terminatū cum recto intestino, quoniam per eum transit melancholicus humor. si tamen considerauerit aliquis vsum venę portę, aliter sentiet. Nam porta præcipuè ad attrahendum facta est si quid boni reliquum est in recto intestino: non ad expellendum. In hac dubitatione crediderim ego, quod per vtrasq; venas possit hæmorrhoidalis sanguis fluere, Ex 3, de facul. natural. cap. 13, tamen si raro contingat

contingat vt per ramum portæ effluat: quoniam, vt diximus, ad attrahendum est institutus. quare nō incommodum erit, si dicamus per venā cauam effluere, atque hoc, in mulieribus præcipue: quoniam in eis sanguis non bene depuratur, cum sanguis venæ cauæ sit melancholicus. quod manifestius patet ex Galen. & Auic. dictis. qui cum loquuntur de ramo venæ portæ, qui desinit in rectum intestinum, eum dicunt esse factum ad attrahendum si quid boni est in intestino recto. non igitur ad expellendum factus est. qui vero ramus ex vena caua transit ad musculos intestini recti, ducit sanguinem ibi in complexione melancholica. etsi necessitatis tempore non sit impossibile trahi etiam ex vena portæ. cum vero dicebatur, nunquid ex venis solis, an etiam ex arterijs veniat ille sanguis: dicendum est, non solum venas, sed etiam arterias terminari ad rectum intestinū. quando etiam Auic. ponat ibi desinere artenas. quod non negat Gale. in libro de anatomia arteriarum, ipsaq; experientia attestatur. Quidam enim hæmorrhoin patientes, dicunt se sentire aërem exeuntem cum sonitu. Iste vero aër nō potest esse in venis, sed in arterijs. Quare colligentes dicta de ventre inferiori apparet omnia membra reduci ad opus nutritionis. Nam quedam digerunt, deferuntque nutrimentū, cuiusmodi sunt stomachus, hepar, & venæ. Alia facta sunt ad depurandas superfluitates, vt splen, vesica fellis, & renes, nōnulla ea de causa instituta sunt, vt illis medijs superfluitates oportunè exeant, quemadmodum sunt muscoli colli vesicæ, & intestini recti, & muscoli ventris, qui omnes

iuuant

suuant ad expellendum. itaque constat omnia hæc membra facta esse pro nutritione. Atq; hæc dicta sint de anatomia ventris inferioris.

De anatomia ventris mediij.

HIs expeditis incipe excoriare ventrē mediū, vsq; ad principium colli: quia vsque ad principium capitis sunt membra spiritualia. Et nota quod sicut primus, ita iste habet duplices partes: scilicet partes continentēs, & membra contenta. membra continentia sunt membra pectoris, & mēbra pectoris sūt duplices partes: scilicet intrinsecæ & extrinsecæ. Exteriores quædam sunt directæ, & quædam laterales. Directæ sunt siue vocantur partes furculæ, & istę sunt duę furculæ: scilicet superior & inferior. Laterales vero partes vocantur latera pectoris, dextrū scilicet, & sinistrum. Intrinsecæ autē partes sunt quinque: scilicet cutis, pinguedo, māmille, muscoli, ossa, & cartilagines.

CVRTII.

Nunc explicanda est anatomia ventris mediij. In quō Mund. ait duplices esse partes, continentēs scilicet, & contentas. & illæ quidem diuiduntur in partes exteriores, & interiores. Licet autem nonnulli per thoracem intelligāt totum truncum corporis, à collo vsque ad pedes: melius tamē est, vt intelligamus quod continetur à diaphragmate & furcula superiori, & inferiori, per furculas autē sunt

sunt qui intelligant totū illud, quod ex costis constat. alij autem partem eam furculam esse volunt, quæ aliàs Iugulum appellatur. Auct̄or Introduc̄torij partes vbi sunt mammillæ appellat latera, in quorum medio est pectus. huius rursus medium vsq; ad cartilaginem, sub qua ventriculi os delitescit *σερρυ* Græcis dicitur. partes vero exteriores sunt cutis, pinguedo, mammillæ, musculi, &c.

De anatomia mammillarum.

Mammillarum primo videas figuram, quia figuram habent cucurbitæ rotundæ: quia debent esse capaces sanguinis, qui debet cōverti in lac. Quia ut ponit Gal. 7. de. v. p. ca. 22. & etiam octauo de iuu. mē. c. 4. sunt scuta cordis, & ideo debuerunt habere figuram tutam a nocumentis. talis autem est rotunda. Habuerunt etiam papillas, ut foetus nuper natus possit sugere lac.

Ex his secundo uideas substantiam, quia ipsæ carnes habent glandosas: quia sanguis superfluus bene decoctus in eis debet conuerſi in lac: & ista conuersio est per infrigidationem eius: et ideo carnē habuerūt glādosam.

Tertio uideas quātitatem, tamen primo scias quod in muliere sunt maiores quam in uiro: quia in muliere sunt factæ ppter duo. unum est ut generent lac, in uiro autem nō. & ideo in muliere fuerunt magnæ. Itē in mu-

liere

liere sunt factę magne, ut caliditatem, quam recipiunt a corde, ad cor reducant reuerberando, & hoc est magis necessariũ in mulieribus, quia minus habent de caliditate circa cor quam uiri.

Quarto nota numerũ: quia duę fuerunt in homine sicut in omni animali, quod generat unum uel duo. In animalibus autẽ polygenis siue, plura generantibus, plures sunt mammillę.

Quinto uide locum & colligantiã: primo locum, nam in homine sunt situatę in pectore & in alijs animalibus non sunt situatę in pectore. & causa quare in alijs animalibus nõ sunt situatę in pectore, est vna, quã dat Gal. ca. præallegato: quia mãmillę sunt factę propter generationẽ lactis. Lac autẽ generatur ex superfluitate sanguinis bene digesti, multa tamen quantitas talis superflui in alijs animalibus trãsit in cornibus, seu in generationem cornuum, crinium, & dentiũ, & huiusmodi. Aliã causam dat Aristo. in lib. de partibus animalium: quia alia animalia habent ascellas vel tibias anteriores quasi ad inuicem complicatas: & ideo peçt⁹ habent strictum, propter quod mammillę eorum in pectore eorum non potuerunt lo-

cari: & ideo habuerunt iuxta anchas posteriores, si sint animalia generantia vnū tantum: vel dispersas per ventrē, si generant plura: vt in porca & in cane. homo autem cum habeat pectus latum habuit mammillas locatas in pectore. Quare cum hoc habent iuuamenta, nam lac debet in eis generari ex sanguine subtiliato & bene digesto. melior autē digestio fit circa pectus in mammillis propter calorem existentem in eis fortiorē, quam in omnibus aliis partibus. & propter eandē causam natura ordinauit venas, quę veniūt a matrice, vt ibidem dixit Gal. procedere tortuose ad hoc, vt sanguis cōtinue subtilietur, & bene digeratur. Secundum iuuamentum fuit quia sunt sicut scutum cordis, & in homine cor debet bene tueri, quia est sine pelle. Tertium iuuamentum est: quia caliditatem siue calorem recipiunt a membris spiritalibus, & receptum reuerberant ad ipsum sicut vestimentum: vt etiā ibi ponit Galen.

Et ex his apparet colligantia earum: quia ipsę colligatę sunt cum corde & hepate per venam ascendentem, a qua iuxta furculam ramificantur rami supra dorsum, & inter costas tendūt ad mammillas, Colligantur etiā cum

cum matrice mediantibus, venis quæ ascen-
dunt a matrice ad mammillas de quibus di-
ctum est supra. Ex iuuamētis autem potes
videre nocumenta.

CVRTII.

Notat Mund. figurā mammillarum, cuius dupli-
cem reddit causam, Inquit enim, quia debent esse
capaces sanguinis, qui debet conuerſi in lac. alie-
ra, quia sunt scutum cordis. ideo debent habere fi-
guram turam a nocumentis, qualis est figura orbī
circularis. Verum aliam causam reddit Gal. omni-
bus vasis communem, quam etiam superius retul-
imus. quod scilicet natura quantum potuit omnia
vasa in nobis fecit rotunda quia minus sunt nocu-
mentis obnoxia. quod vero ait rotundas esse vt
sint lactis capaces, verū esset, si cauitas illa in qua
continetur lac esset orbiculata, nūc vero cum nō
contineant lac nisi in venis suis, manifestū est, hāc
causam esse falsam. quare relinquitur illa tantum
vniuersalis causa, quod vasa sint rotunda, vt com-
modius resistant rebus noxijs. causam vero papil-
læ eius refert Mund. quam Gal. ideo omisit, quod
omnibus esset nota. Deinceps substantiam mam-
millarum declarat, aitq; eas constare ex glandu-
losa carne, vt sanguinem refrigerent, & in lac con-
uertant. Auic. 12. terij. cap. 1. dicit mammillas con-
stare ex glandulosa carne, & neruis, cui etiā Ra-
fis assentitur. Gal. vero 16. de vsu part. cap. 2. distin-
guit carnes has, inquitq; quasdam esse ad replen-
das vacuitates, vt sub alis. alię vero pro genera-
tione alicuius humiditatis, vt quę sunt in gutture.

& quę sunt in mammillis. nam illę quidem saliuā generant, hę vero lac. differunt tamen; quoniā ea quę est in mammillis habet neruos, & arterias, & sentit, & generat lac. quęadmodū hepar generat sanguinem per venas in quibus chylus continetur. Pręterea vtrum sanguis recipiatur in venis mammillarum vt in eis conuertatur in lac, aut cōtineatur in carne glandulosa. Nam si Auic. credimus, dicendum est, quemadmodum de hepate diximus, oportere sanguinem illum recipi in corpus mammillarum, quo pacto chylus recipitur in Iecur, vt in sanguinem conuertatur. Est autē mamillarum corpus glandulosum: quoniā inquit Mund. debuerunt generare lac refrigerato sanguine. sed tamen non est hęc ratio absolurē intelligēda, quoniam etiam ossa sanguine frigido nutriuntur, non tamen sunt carnes glandulosę, quę sanguinem illū frigidum efficiant. Dicendum igitur est carnē māmillarum albam, & glandulosam esse debere: vt lac sibi simile reddat, & dealbet, nam aliqua sanguinis substantia quę aërea est mutatur in aqueā. atq; ita fit alba. Partitur tamē instantiam hęc causa, quia ossa non habent sanguinem, quare si eo debent nutriri, opus est vt albescat, quod vt fiat nō omnino necessarium est aëream partem in aqueā transmutari. quapropter, quęrendum adhuc restat quomodo sanguis ille albescat, & fiat lac. Ego vero ita dicerem, opus esse si ex sanguine lac generandum est, sanguinem transmutari, & denuo concoqui. Concedo itaq; carnem illam glandulosam refrigerare non nihil sanguinem, ob eamq; refrigerationem, & vltiorem actionem, non quidem
per

per calorem intensum, sed aliquem tamen calorem fieri sanguinem illum album, transireque in lac, non propter simplicem refrigerationem, sed ob refrigerationem, cum nouo quodam mitionis modo. Inquit preterea Mund. videndam esse mammillarum quantitatem. In qua exponenda rationem adducit Arist. & Gal. perperam, cetera recte. Cum igitur inquit considerandam esse in mammillis quantitatem, duplicem affert rationem, quam ob rem mulieribus maiores sint mammillae, quam hominibus Galenus septimo de usu partium capite ultimo & inquit mammillas factas esse propter lactis generationem. & quoniam hoc minus est mulierum, idcirco in eis maiores factae sunt, habent etiam illam utilitatem ut calefaciant cor, quod in illis frigidius est. Quod vero ad numerum partium attingit, inquit Mund. ea animalia, quae unum duosue foetus tantum generant, duas habere mammillas, quae vero plures producunt, his etiam plures mammillas inesse. Gal. quoque inquit in animalibus tot esse sinus in matrice, & tot mammillas, quot sunt foetus. Nunc videndum est, quo in loco corporis sitae sint, nam Mund. fallitur cum ait, in homine mammillas esse in pectore, in alijs non item. Dicet haec Gal. quod in animalibus, in quibus natura usata est superfluitatibus partis superioris, vel cornibus vel crinibus, instituit in his mamas inter coxas: cuius ratio est secundum Arist. & Gal. quod natura debuit eas collocare eo in loco, in quo nutrimentum abundans non consumitur, verum ea animalia nihil habent nutrimenti, quod non in eas partes superfluas consumatur, quare merito mamas inferius

inferius habuerunt locatas. canes verò, & reliqua animalia, quibus nulla superflua pars excedit superius, si plura pariant, plures quidem habent mammillas, sed duas tamen in pectore. Arist. verò. 4. de part. animal. cap. vltimo ait, binę homini mamme, quoniam binę sunt partes, dextra, & sinistra, duriusculę spatio interposito determinantur: quòd & costę eodē loco sibi coeant sine vlla molestia. Ceteris animalibus mamme in pectore haberi inter crura nō possunt, ita enim gressum impedirēt. Gal. 7. de vsu part. cap. vltimo idē ferè dicit, quod Arist. Quòd scilicet in alijs animalibus non poterint esse in pectore, è regione pedum anteriorum. Tamen si quedam habeant, vt elephas, & alia, que habent priores tantum mammillas in pectore, que plus lactis continēt. Perperam igitur Mund. rationem Arist. & Gal. intellexit. Prosequitur deinde vsum afferens mammillarum. Gal. & Arist. locis paulò ante adductis, tres afferunt causas, quibus natura mammillas in pectore instituit primo, quoniam hic locus omnium mammis est familiarissimus, si nihil aliud prohibeat, Deinde, quoniā, cum cor ossi pectoris subiacet, tegmen quoddam cordi ipsi mamme fiunt, vtrinque ei appositę. Tertio, quoniam benigni nutrimenti excrementum hoc loco in hominibus aceruatur. In brutis autē posuit natura mammas in posteriori parte, quoniam nō erat materia ante pro ipsis mammillis, cum in cornua, & crines consumatur. Alia præterea potest afferri ratio, quamobrē natura non posuerit eas brutis in pectore, quia scilicet rectè non incedunt: atque ita pectus non est nocuentis obnoxium, quemadmodum

modum hominibus. quare nil opus fuit eas ibi poni, præcipue in brutis his, quibus materia in aliud consumitur. Nam quibus ea materia non consumitur, ut canibus, ut suis primæ mammillæ, ut dictum est, sunt in pectore, quare ea Mund. ratio non valet, cum inquit, hominem habere mammillas in pectore, quoniã pars ea non sit pilosa. Hac in re Arist. & Gal. dissentiunt, cum enim mammillæ duos habeant usus. Lactis scilicet generationem, & cordis defensionem. Arist. 4. de part. animal. cap. 10 ait naturam instituisse mammillas in pectore, ut sint tamquam scutum cordis, illis tamen abuti ad alterum opus, lactis scilicet generationem. Gal. autem contradicit, vult enim primò factas esse ad lac generandum. In hac controuersia non possumus vti ea regula, quam in predicam. docet Arist. et quã nos initio retulimus, quòd scilicet id prius sit, quo posito aliud ponitur, & quo ablato aufertur: nam in aliquibus sunt mammillæ, in quibus non generatur lac, ut in viris, Sed neq; in omnibus animalibus mammillæ cor tuentur, cum in quibusdam prope cor non sint. crediderim tamen ego probabiliorẽ esse Gal. sententiam: nempe quòd sint factæ ad lactis generationem. nam si in viris mammillæ essent ad tuendum cor, eas natura maiores fecisset, ut commodiùs munus illud obirent. Nunc verò cum videamus eas in viris esse paruas, foeminis verò maiores quæ lac generant, iure reprehendi meã sententia non poterit, si quis dicat mammillas præcipuè ob lactis generationem à natura fuisse institutas. Idem ex earum substantia colligi potest, quæ venis et arterijs est referta, quarum

vsus non alius est, quam vt sanguinem in lac conuertant. Declarat postremo colligationem, in qua pleriq; cum iniuste damnant, Textus enim est corruptus: nam vbi legitur supra dorsum, legi debet, supra dorsum per pectus. Verum enim est, quod ille veng non veniunt per dorsum, sed supra dorsum & iunguntur mammillis, colligantur autem cum matrice, quomodo diximus paulò ante, quo fit, ut que mulieres lactant, non concipiunt. quare qui volunt, vt foemine concipiant, curare debent, vt non lactent, Arist. 7. de histor. animal. cap. 11. ait vbera tota fungosa ita esse, vt si in poculo pilum forte hauserit mulier, dolor moueatur in mammillis, quod malum pilare appellant, nec sedatur, donec pilus vel pressus exeat sponge, vel cum lacte exurgatur, ego verò nusquam apud Gal. aut Auic. huius mentionem factam inuenio: qui forte non concederent pilum eorum illuc ire, quod si forte id fit, generatur ibi quem admodum in renibus.

De anatomia musculorum pectoris.

Post māmillas sunt musculi, musculos autem omnes pectoris in anatomia ista discernere non potes: licet tamen omnes nō discernantur: tamen debes scire, quod istorū musculorum quidam sunt tantum dilatantes, & quidam dilatantes et constringentes.

Dilatantes tantum sunt duo musculi diaphragmatis, qui sunt in inferioribus pectoris. Sunt etiā duo musculi dilatantes tantū qui sunt in collo, sed diaphragma dilatatur
in parte

in parte inferiori, vbi est spaciositas magna. sed illi qui sunt in collo dilatant concauitatē superiorē, quę est parua. Sunt etiam musculi qui sunt in dorso, vbi est origo costarū, & incipiunt iuxta originē primę costę. Sunt & multi alii musculi parui. Musculi vero, qui sunt dilatātes & constringētes, sunt musculi qui inter costas sunt locati: quia inter quilibet duas costas sunt duo musculi: quorum vnus habet villos latitudinales, et alius transversales. Post musculos sunt ossa.

CVRTII.

Aduertendum est primo operationem pectoris esse dilatare, & astringere, qui motus quoniam est contrarius, ideo fit per musculos. Sed queritur quo modo ad motū pectoris moueatur pulmo. Arist. 3. de part. animal. cap. 6. inquit pulmonem spirandi officio delegatū esse, eūque originem sui motus ex corde accipere. Idem vult. Auer. in paraphr. & 2. collect. cap. 19. quo in loco nidditur respondere rationi Galeni. Ipse autē Galen. in lib. de motu pectoris & pulmonis inquit, pulmonē moueri vacui necessitate, quod hac ratione probat: his enim quibus pectus vulneratum est, ipsum quidem pectus mouetur, pulmo non item: quod faceret si propria moueretur vi, hoc argumentum soluit Auer. atque, vulnerato pectore pulmonem non moueri. quoniam aëris aduentu refrigeratur, a mitique virtutē vt moueri nequeat. Sed pace Auer. nihil valet hęc ratio contra Gal. quoniam pectus

ex vulnere maius accipit incommodum & detrimentum quam faciat pulmo: mouetur nihilominus pectus non pulmo. præterea si ob aërem frigidum amitteret vltimam morricem, pulmo nunquam moueretur, quoniam etiam dum optimè constitutus est aërem frigidum attrahit à quo tamen non leditur, quod si ponamus aërem esse calidum, & non refrigerare pulmonem, neque tunc ledetur pulmo. Tamen aperto vulnere non mouebitur. quod si claudatur vulnus, statim mouebitur: quod non tã cito facere posset, si lesus fuisset, quare relinquitur, vt vacui necessitate moueatur. Tres autem sunt musculi, vt refert Gal. in lib. de causis respirationis. & .7. de vsu part. cap. 20. est autem primo inspiratio & respiratio: & vox duplex naturalis & violenta, illa quidem fit secundum consuetudinẽ, hæc vero præter vsum magna. Inter duodecim costas vndena esse interstitia ex vtraque parte dicit Gal. in quibus sunt musculi, atque ita duo & viginti omnes erunt musculi qui $\mu\sigma\sigma\omicron\pi\lambda\acute{\epsilon}\nu\epsilon\iota\omicron\iota$ dicuntur. præter eos vero duo sunt in parte superiori, & totidem in inferiori. est quoque diaphragma. tres verò sunt musculi colli, & septem in dorso. octo in vtre inferiori. atque ita vniuersi quatuor sunt & quadraginta. sunt qui diuidant singulos musculos, qui sunt inter costas, in quatuor. faciuntque musculos hos octo & octoginta. hic tamen est error. nã dicebat Gal. hos musculos habere villos trãuersos non rectos, vt alij musculi. hos autem villos procedere ait, quo modo costæ: adeo vt a dorso vsque ad medium procedant villi sursum deorsum. In sequenti autem parte deorsum sursum. in anteriori

anteriori vero opposito modo villos habent quā in posteriori. hinc Auic. & qui Auic. securi sunt distinguunt musculos iuxta hæc quatuor genera villorum qui sibi ipsis sunt oppositi. quod si verū esset, quod ratione diuersorum villorum possent separari musculi isti, hoc tamen verum esset in costis solum quæ mendosæ non sunt. nam qui villi inter mendosas costas sunt, nō diuersi fiunt ex Gal. 7. de vsu part. cap. 20. quare non est dicendum tot esse hos musculos, quot isti arbitrati sunt. Præterea Gal. vnum musculum tantum vocat, secundū longitudinem totā costę, etiam si diuersos villos habeat. Verum tamen est, quod Gal. vult musculos interiores laxare, exteriores verò astringere: quapropter vniuersi, vt dictum est, quatuor erunt & quadraginta. Vt autem redeamus vnde digressifumus, cum pectus nil præter consuetudinē mouetur laxatur ve, laxatio illa à diaphragmate tantum puenit: si autē violēter, nō à diaphragmate solum, sed etiā musculis mesopleurijs interioribus, & musculis colli dilatatur. Cū verò pro naturali respiratione pectus astringitur, id fit ab octo musculis ventris inferioris, per impressionem. Violēta verò respiratio fit & ab octo musculis mesopleurijs exterioribus, quod ita esse hinc cognosci potest, quod in pleuresi si fuerit abscessus in musculis exterioribus, dolor fit maior in astringitione, si uerò sit in interioribus, dolor fit in relaxatione.

De anatomia ossium pectoris.

○ Ssa autem pectoris fuerunt plura, & nō vnum continuum vt possit dilatari & con

& constringi: nam debet esse in cōtinuo motu. Sed ad motum localem & voluntarium requiruntur muscoli mouentes: et requiruntur ossa, quę sunt sustentaculum musculorū. Et hæc est causa vna, quare iste venter non fuit tantum musculosus vt primus, nec tantum ossuosus vt vltimus.

Ista ergo ossa fuerunt duplicitia, scilicet costę, et ossa thoracis, Costę sunt, 12. septem verę, & quinque mendosę. Verę sunt quę cum ossibus thoracis sunt continuatę ad cooperiendum & complendum pectus. Et causa, quare vna costa non attingit alteram in extremitatibus, est illa quę dicta est, vt pectus possit melius dilatari & cōstringi: ossa tamē thoracis sunt septem, continuata septem costis veris. Inter tamen ista ossa & costas sunt cartilaginee continuantes vnum cum alio.

Ex his autem cartilaginibus cum ossibus suis cōponitur vnum membrum quod vocatur furcula pectoris: quia ad modum furculę est bifurcata & figurata: & in extremitate eius directa est quedam scutalis cartilago, vocata pomū granatum, facta ad custodiendum os stomachi: à lateribus autem in costis mendosis sunt cartilaginee, vt mollis cum duro melior fiat coniunctio: verum
est quod

est quod omnia ista melius apparebunt si incidatur pectus, ubi sunt teneritates costarū & à latere dextro & sinistro. & tunc apparebunt tibi omnia que sunt interiorius contenta.

CVRTII.

Galenus tertio decimo De vsu part. cap. 6. cum causam magnitudinis thoracis explicat, ita ait, omnes igitur corporis particulæ cum proportionalem habeant inter se magnitudinem, oportuit et thoracem habere magnitudinem non sibi ipsi soli congruam, sed etiam alijs. Si enim rectè demonstratum est neque respirationem, neque vocem absque thorace fieri posse ac etiam ipsius munimēto, primū quidem cor, deinde autem & pulmonem egere, ad has quatuor intentiones ac scopos aspice re necessarium fuit naturam thoracem conditurā, scilicet vocem, respirationem, magnitudinem cordis, magnitudinem pulmonis. Quare autem duodecim sint spondyli, refert idem eodem libro, cap. 7. inquit enim, Semper spondyli inferiores tantò maiores superiacentibus sunt, quantum opus est ut hos sine molestia illi portent, hi verò nec molestè nec grauatim portentur à sublocatis. Verūm his tā magnis duodecim thorax totus indiguit, contingit enim hæcenus congruere & concordare numerum spondylorum, & magnitudinem paulatim crescētem, & totius thoracis generationem: quare quot sunt spondyli tot etiam sunt costę, tantam autem oportuit spondylorum & costarum esse magnitudinem, quantam pectus habere necessarium fuerat, ut pulmonem contineret, qui pro cordis aspiratione

aspiratione aërem susciperet. Ex costis septem veræ sunt, quinque nothæ, quas mendosas appellant. Has, inquit Mundinus, ea de causa natura inter se distare voluit, vt pectus dilatarî possit. Verum hæc ratio non est de mente Galeni, aut Auic. prior igitur ratio est hæc, vt possit stomachus de bitam quantitatem cibi semel sumere. Septem verò costæ, quæ veræ dicuntur, in extremitate habent cartilagineam quandam: In quarum medio est os, quod Græcis *κέλευρον* dicitur, quod in septem ossa discernitur, secundum numerum costarum, quæ vere sunt, ea tamen adeo iuncta sunt, vt vnum tantum videri possit: Albertus vocat asserem: qui etiam causam reddit, quamobrem natura hæc ossa ita coniunxerit. ossa enim, inquit, per cartilagineas iunguntur, ea præcipuè quæ moueri debent, idcirco hæc etiam cartilagine iuncta sunt. Mendosæ autem costæ cartilagineam in extremis habent, nõ vt ait Mund. ne durum tangat molle sine medio: sed vt ait Galen. 7. de vsu part. cap. 21. cartilago nothis costis copiosa in vtraque extremitate circumfusa est, gratia dyspatæ, minimè enim frangitur, & rumpitur pressa cartilago. Quare melius fuit partes magis prominentes ex tali substantia fieri, quàm ex ossibus. Falsum est autem dicere factam esse, ne durum tangat molle sine medio, quoniam & ossa tangunt carnem, & panniculum sine medio. Subiungit præterea Mund. in furcula inferiori esse cartilagineam, quam Galen. loco superius citato appellat ab ensis similitudine *ἐξ οὐδ' ὄν*. cuius vsus est, vt sit propugnaculum oris ventris, & partis phrenon, quæ est ibi, & cordis, quare ossa thoracis erunt vnum

vnum & triginta. viginti quatuor scilicet costę, & septem ossa sterni, quę sunt in medio additis duabus furculis, quę clauę dicuntur. quarum superior iugulū appellatur. his præterea iunguntur duo ossa, quę si addamus, erunt omnia tria & triginta. Cur verò has clauę natura fecerit, refertur à Galen. ratio. 13. de vsu partium. cap. 10. & 11. quòd scilicet natura hæc duo ossa fecit, vt totam homoplatham. firmarent; nam nisi hæc esset à pectore remota, nõ posset manus tam vario moueri motu. Alber. 1. de natura animalium. numerum ossium redigit ad quadraginta duo. ponit enim viginti quatuor costas, duas clauę, sternum vnus ossis nomine commemorat, & cartilagine quindecim. Hoc igitur discrimen est, quòd ipse cartilagine inter ossa recenset, & sternum pro vno osse accipit. Nos autē illas quidē non accipimus pro ossibus: hoc verò in septē diuidimus, iuxta septē costarū conjugationes.

De anatomia panniculorum pectoris, scilicet diaphragmatis, pleurę, & mediastini.

Membra autē contenta in pectore sunt panniculi, cor, pulmo, & orta ab eis. panniculi autem sunt tres: scilicet mediastinus, qui diuidit concauitatem pectoris per medium ab anteriori ad posterius: propterea diuidit pulmonem per medium. Et iste panniculus non est neruosus, nec continuus & vere vnus vt alii. Et iste factus propter iuuamenium commune: scilicet vt si nocita fuerit

fuerit pars dextra vel sinistra pulmonis non communicet nocumentum alteri parti. factus est etiam, vt suspendat pulmonem ad pectus. Item est factus, vt si propter causam aliquā fiat empima, hoc est quod aggreget sanies in pectore, vt illa sanies non regurgitet ad aliam partem.

Postea est pleura. Pleura autem est panniculus substantia durus & neruosus: in quā titate magnus: cooperiens omnes costas interius: & ideo colligantiam habet cum omnibus mēbris cōtēntis in cōcauitate pectoris.

Iuuamenta sunt cooperire membra prædicta: & vt ab ipso panniculi prædictorum membrorum ortum habeāt: vt ponit Auic. fen prima primi canonis. ca. de membris.

Passiones omnium modorum & generū potest pati: maxime tamen patitur passionē apostemosam, quæ vocatur pleurefis. Verū est quod pleurefis est duplex, scilicet vera, et non vera. Non vera est illa quæ fit in musculis, qui sunt intra costas: cuius acumē est versus cutim extrinsecam. Vera fit in hoc panniculo ex substantia cuius potes videre quod illud apostema vt plurimum est choleriçū, propter quod ipsum acuta febris ratiōe loci consequitur: quia propinquius, & vicinius
cordi

cordi fit febris illa acuta ratione humoris calidi. Vide etiam quod ad tale apostema propter sensibilitatē pāniculi cōsequitur dolor pungitius lateris, quia huic panniculo attribuentur magis latera quam pars anterior. sed pars anterior magis apropiatur panniculo mediastino: & propterea dolor consequens peripleumoniam est anterior. iste lateralis fit etiam quia comprimit pulmonē, & impedit dilatationem eius: & malitia anhelitus, & tussis sequitur tunc quia eminentia apostematis stimulat & aliqua violentia, & ærugo quæ emanat ab hoc apostemate pporositates panniculi: & hæc est causa quare in pleuresi fit screatus in principio rubeus, postea albus vel saniosus secundū quod materia maturatur. Et ideo apparēs in principio subrubeus inchoantem abbreuiat: vt ponit Hipp. primo, aphorism. paroxismos & consistentias &cet. Et causa est: quia tunc significatur quod materia est subtilis, & pāniculus est rarus, & quod virtus est fortis. Quomodo autem ista materia virulenta et saniosa per pulmonem expellatur & screatus in anatomia pulmonis declarabitur.

CVRTII.

Declarans Mund. anatomiam eorum, quæ in
 p pectore

pectore cōtinētur, incipit primò à panniculis: inter quos primùm de eo tractat, qui à ipso Media stinum dicitur, qui diuidit pectus in dextrum & sinistrum, et pulmonē etiā ipsū, adeo vt pars dextra à sinistra separetur. Huius prima vtilitas est secundum Mund. vt distinguat pectus, quam vtilitatem refert Galen. 6. de vsu part. cap. 3. cum inquit, Vtilitas huius prima quidem, & maxima est, vt duos ventres thoracis efficiat, si quando vulnere magno in alteram eius partē recepto perierit respirationis opus, quod per illam partem fiebat, nisi quis venter seruatus saltem dimidiam actionem custodiat: propter quod & semiuocale, & semispirans in magnis vulneribus in alteram partem thoracis penetrantibus sic animal. Alia inquit Mund. vtilitas est, vt suspendat pulmonem ad pectus. sed in hoc Mund. deficere videtur, quia non per hunc panniculum solū alligatur pulmo: sed etiā per omnia alia, quæ in pectore sunt. Galen. verò eodē in loco inquit, Membra ventris mediī operiri à pleura, qui idem est ac ille, quem nostri Media stinum vocāt, quemadmodum omnia membra capitis operiuntur à dura matre, ita etiā media stinum non solū pro alligando pulmone factus est, sed etiā pro alligandis omnibus membris ventris mediī. Illud tamē rectè dixit Mund. hunc panniculum non esse verè vnum continuum: intercipit enim cor, & vnit dorso: ita quod est in medio huius panniculi. Hinc docebat Galen. quomodo fieri possit, vt viuente animali cor detegatur, nullo in pulmonem illato detrimento. quemadmodū septimo de anatomi. aggr. refert de quodā pue-
ro

ro, cui sternum læsum fuerat, Ipse autem aperuit tunicam cordis, viditque motum eius, incidebat enim vnum ex septem ossibus sterni, dimittebaturque panniculum super eo integrum, a motu vero osse, digitis separabat media stinum: atque ita animali viuere cor videbat. Ex hoc solui posset illa quæstio, vtrum quando cor dilatatur, arteriæ astringantur: nam tangendo pulsum, eodemque tempore videndo motum cordis, hoc cognoscere tur. Substantia eius est dura, vt defendat subtilis, vt sine pondere tangat. Quantitas eius patet, quoniam extenditur secundum quantitatem pectoris. Fallitur vero Mund. qui credit non idem esse pleuram, & media stinum. Galen. enim 7. de vsu part. cap. 21. idem dicit de pleura, quod antea lib. 6. ca. 3. dixerat de mediastino. has vero utilitates pleuræ refert Galen. lib. 7. quas superius retulimus. Deinceps Mund. ait hunc panniculum pari dolorem lateris, qui pleuritis dicitur. ea autè affectio duplex est, vera, & non vera. Vera quidem est, quando abscessus fit in eo pāniculo: non vera autem, cum abscessus est in musculis mesopleurijs, quæ exterius acutum mouet dolorem, non versus pleuram: ita enim inquit Mund. quasi quòd tunc vera sit pleuritis, cum versus pleuram sentitur. Galen. autem. 5. de loc. affect. cap. 3. inquit pleuritim esse, quando pleura patitur primario affectu, & non muscoli, potest tamen peruenire etiam ad musculos: Non vera autem pleuritis dicitur, cum muscoli primò laborant, non curat autem Galen. inflammationem habeat intrane, aut extra. harum cognitio sumitur ex pulsu, quando enim principaliter pleura laborat,

rat, plurimum pulsus est intensus, cuius rei ratio hæc est, quoniam pleura arterias tægit, quæ, stante eo abscessu, tenduntur. si verò pleuritis sit in musculis, non tantum tenduntur arteriæ. quò fit, ut pulsus non adeòensus sit: nam inter costas singulas sunt duo muscoli, vnus interior, alter exterior. si igitur abscessus sit in musculis exterioribus, pleuritis nõ est, nec vera, nec non vera: sed dicitur phlegmon, si verò sit in musculis interioribus dicitur pleuritis non vera. quòd si fuerit in pleura ipsa, dicitur tunc vera pleuritis. Ita enim declarabat Gal. 5. de loc. affect. cap. 3. Dicit deinde quod abscessus ille, qui in pleura factus est, cum sit substãtia dura, et tensa, nõ suscipit materiam melancholicam, nec phlegmaticã, sed cholericam, ex lib. 6. aphor. 33. & Auic. decima tertij cap. proprio. Declarat postea, quomodo ex hoc panniculo quatuor sequatur signa pleuritidis. primò enim sequitur febris acuta, ex. 2. de crisi bus cap. 10. & in lib. de const. art. med. & 5. de loc. affect. cap. 3. inquit autẽ febrem acutã consequi ratione loci, quia cordi propinquus est, quòd si esset materia pituitosa non generaret febrem acutam. quare febris acuta fit propter materiam calidam, & cordi proximam. Alterum signũ est, quia est dolor pungens: debemus autem per dolorem pungentẽ intelligere cum dolor est in centro, veluti acus, qui tamen circũ extendatur, quod ratione apostematis fit, & panniculi suscipientis. Rogabit hic quispiam cur, stante phlegmone in pleuritide, non esse debeat pulsatilis dolor: cum Galen. 2. de loc. affect. longo processu velle videatur proprium phlegmonis esse dolorem pulsatilẽ.

Inquit

si fiat
abscessus
in musculis
nõ est pleu-
ritis.

qui pleuritis
de laborat
signa
sunt.

unde et loca
de causa fit.
a cute.

p. 517
2. m. sig.

Inquit enim Galen. nec in peripneumonia, nec pleuritide cur non accidat pulsabilis dolor, cum in quo membro sint arteriæ, ibique sit dolor, loca inter arterias replentur, & cum arteriæ dilatantur, circumiacentes premunt partes: atque pulsabilis ita fit dolor. verum in pleura non sunt arteriæ, atque ideo in eius affectione non potest huiusmodi dolor euenire. si verò sit dolor prope musculos inter costas, arteriæ magis distant: quare etiam si maximè dilantur non possunt premere, nullus igitur sequetur pulsabilis dolor. quod si sit abscessus inter musculos, tunc is dolor sentitur non pungens, quoniam ibi sunt arteriæ. in pulmone verò non est pulsabilis dolor. quò fit, ut cum in apostemate sentitur pulsatio, signum sit suppurationis, inde cognoscimus abscessum esse magnum, quod resolui non possit, sed oportet ut in saniem desinat. Dicit hoc loco Mund. pleuresim esse dolorem in latere, quoniam pleura magis est in latere. Igitur si sit apostema in media stino non erit pleuritis: hoc enim contra Auic. est, qui decima tertij tracta. 4. cap. proprio de pleuresi vult, pleuritidem esse siue sit in media stino, seu in pleura: quinimo magis acuta est in media stino, quàm in pleura. cū vero declarat Mund. tertium signum pleuritidis, inquit, quod pleuritidē consequitur difficultas anhelitus, quia premit pulmonem, sequitur autem illam opinionē, quæ vult pulmonem ex se moueri. ego vero iam declaravi motum pulmonis fieri à pectore, quare cum dilatatur pectus, fit dolor: & quoniam virtus propter dolorē non audet plurimum dilatari, idcirco oportet frequenter id fieri. non autem ita accidit, quia

pulmo detrimentum capiat ab apostemate, pul-
 moni enim nullus inest sensus. Postremum signum
 quod affert Mund. est tussis, & hæc quidē necessa-
 rio eam ægritudinem consequitur, estq; vel sicca,
 vel etiam sputo admista: liquidem necesse est ali-
 quam materiæ portionem resudare ad pulmonē:
 quæ, si multa sit, stimulat ad tussim, & expuitur. si
 vero sit pauca, ciet quidem tussim, non tamen ex-
 puitur. Præterea materia ciet tussim ob sui viru-
 lentiam, Hinc declarat dictum Hipp. 1. aphor. 12.
 vbi inquit Accessiones vero, & constitutiones
 morbi indicabunt. &c. quia cum materia est mul-
 ta, & penetrat fit spurum: sed si pellicula sit densa,
 materia vero crassa, ea expui non poterit. Ideoque
 illa pleuritis aut diuturna erit, aut mortalis. opti-
 mum igitur signum est, cum in pleuritide materia
 ea statim expuitur. per quam autem viam expua-
 tur, dicemus inferius. Nunc illud consideremus,
 quod ait Galen. 6. de loc. affect. cap. 4. videmus
 quandoque sanie in pectore existentem excerni
 cum vrina, quandoque per egestiones, quod vero
 per vrinam emittatur, ea ratio est, quia in pulmōe
 est arteria venalis, quam potest sanies ingredi, per
 eamq; penetrare ad cor, inde ad arteriam aortam,
 & ab aorta ad emulgentes, atque hoc modo tran-
 sire ad renes. Illud vero difficilius est quomodo
 ad intestina transeat. Certum est autem, venam
 cauam venire ab hepate ad cor; dicemus igitur
 per hanc ingredi sanie. sed si hoc verum esset, di-
 cet aliquis, oporteret vt prius veniret in Iecur,
 quàm ingrederetur venam portam: Propterea in-
 quit Galen. accidere nonnunquã, vt antequam à
 vena

venâ cava, veniat ad Iecur, demittatur vna vena ad portam, per quam venam materia hæc potest transire ad intestina, neque peruenire ad Iecur: tamen si hoc raro eueniat: ego vero semel tantum vidi. Præter ea est aliud signum, pulsus scilicet, qui ferrinus dicitur, quod diuersus sit ad modum dentium ferræ. & hoc ratione extensionis arteriæ prouenit, & doloris, & infirmæ virtutis. Illud vero ex hac anatomia potest colligi, Quare Pleuriticis aliqui in latus, in quo est abscessus, melius cubent; aliqui vero secus. Nam cum materia est in musculis intercostalibus, si recumbat æger in latus apostematis, premeretur apostema. Si vero in pleura dolor fuerit, si in latus, quod dolet, decumbat, abscessus non premeretur, quoniam nihil ei est suprapositum. quibus si in latus non patiens recumbat, tunc sentitur dolor: quoniam abscessus, qui pendet premitur à costis. Quod si doleat vtraque pars, sciendum est vtranque partem abscessu esse affectam: qui si fuerit altior, dolorẽ etiam in parte superiori mouebit, iuxta furculam. Si vero inferior, inferiorẽ partem vexabit, iuxta hypochondria.

De anatomia diaphragmatis.

Tertius panniculus est diaphragma, qui potest etiam dici musculus. eius situs in corpore est in fine pectoris & costarum, altius existens tamen in parte anteriori, quam posteriori. nam quãtum ad partem eius carnosam est cõtinuatum cum cartilaginibus costarum mendosarum. Et in parte poste-

riori cum spondyli duodecima & spondyli-
bus renum.

Et eius utilitas fuit ex situ eius. Primo vt diuideret spiritualia a naturalibus: ne a cibo hora digestionis, & a face vapores eleuati puenirēt ad membra spiritualia, quia impedirent mentem & rationem. Et ex hoc satis apparet: quia quando ægritudinem patitur vt apostema, leditur mens: ideo alio nomine vocatum est metafrenum, quia frenum est mentis: sicut vocatū est diazoma ab Arist. quia zona cingens per medium: non quod directe latitudinaliter cingat, sed oblique, vt dictū est. Et causa siue utilitas huius obliquitatis fuit illud quod dictum fuit capitulo de anatomia myrach: quia ex hoc cum myrach comprimuntur hora expulsionis superfluitates in intestinis, ac si esset inter assides torcular is cuiusdam.

Quātum vero ad partem mediam eius, quæ est neruosa & panniculosa colligatum est cum pulmone, vt ipsum moueat motu anhelitus mediantibus neruis, qui ad ipsum veniunt à cerebro & nuca. Et ex hoc apparet quare diuersificatum est diaphragma ab alijs musculis quia alii musculi in loco vbi ossibus applicantur sunt cordosi, & in alijs partibus

tibus carnosī: diaphragma vero est econtra-
rio. causa est, quia diaphragma principaliter
habet mouere pulmonem, & non costas.
nūc autē omnis musculus quantum ad chor-
dā eius debet esse cōtinuatus cum membro
quod debet mouere, & cum alio quantum
ad partem eius carnosam.

Et ex his apparet quę sit figura eius, quia
rotunda oblonga. Apparet etiam quę sit
substantia eius, quia musculosa, & cordosa.
apparet etiam quantitas eius.

Iuramenta sunt tria quę declarata patēt
ex dictis. Primum est vt sit principium mo-
tus anhelitus. Secundum est vt diuidat inter
membra spiritualia & naturalia. Tertium
est vt iuuet intestina & myrach ad expellen-
dum, quę in intestinis sunt contenta. Et ex
secundo iuramento apparet, quare ad apo-
stema eius sequitur alienatio mentis, sicut
ad phrenesim. Signa distinctiua perquire à
Galen. 5. de interioribus, c. de passionibus
diaphragmatis. cap. 4.

CVR TII.

Colligunt nonnulli peruersè ex dictis Galeni
in septimo De vsu part. cap. 21. Galenum velle,
quod se extendat diaphragma etiam extra costas.
Verum neque id verum est, neque id Galenus sen-
tit. neque enim terminatur diaphragma cum extre-

mitate costarum notharum. Cuius reddens ratio-
nem Galenus inquit, Cur non ab extremis nothis
costis enascuntur phrenes, sed descendit quædam
earum porcio ad hypochondrium, vt seps. Custo-
dit enim hæc seps tum ipsas phrenas, tum hepar, &
multa alia quæ ibi sunt. Vfus diaphragmatis est,
vt cerebrum à vaporibus tueatur, qui à conco-
ctione attolluntur. dicitur autem Græco vocabu-
lo διχρηγμια, idest distinguens. Hoc veteres. &
Plato ipse vt inquit Galen. quinto de locis affect.
cap. 4. appellabant φρένας, quoniam eo affecto,
mens lædatur. Qui vero aliquo post tempore dia-
phragma dixerunt, opinati sunt à natura ea de cau-
sa fuisse inuentum, vt spiritalia membra, à natura
libus distinguat, hinc etiã latinis septum transuersum
est appellatum. Aristoteles διχρωμα vocat, quo-
niam cum reliquis credidit etiam ipse ob eam ratio-
nem vtilitatem factum esse, vt scilicet naturalia
membra à spiritalibus distingueret. Quod vero
ait Mundinus appellari phrenes quoniam sint fre-
num mētis, ridicula est etymologia, si velit dictio-
nem Græcam, qua veteres ante Platonem vsi sint,
à Latina habere originem. Qui vero primarium
vsum diaphragmatis esse volunt, vt superiores par-
tes ab inferioribus distinguat, falluntur. Nam satis
à peritonio & pleura distingui potuissent: siquidẽ
peritonium tegit in parte quidem inferiori dia-
phragma, in superiori autem pleuram. Quare eius
princeps operatio est, quæ à Gal. refertur septimo
libro de vsu part. cap. 21. nempe vt dilatet pectus
cui etiam Aueroës in paraphrasi de animalib.
assentitur, aitque pro hoc vno habendas esse Ga-
leno

leno gratias, quod diaphragmatis vsu inuenerit
 primarium. Confert præterea diaphragma ad ex-
 cemenda ea, quæ in intestinis sunt, vt etiam iã
 antea diximus. Alligatur vero duodecima spõdy-
 li pectoris, Alligatur etiam pulmone, non quidem,
 vt inquit Mundinus, vt mouearur. quoniam, vt
 dictum est, mouetur vacui necessitate: verum est
 alligatum pulmone, vt ipse magis firmetur, quod
 hinc apparet, nam partes aliæ pulmonis, quæ non
 sunt diaphragmati alligatæ mouentur. Diaphrag-
 matis pars, quæ costis adhæret, carnulenta est, me-
 dia verò neruosa, quod institutum esse vult Mun-
 dinus ea de causa, quoniam pulmonem mouere de-
 bet: idè neruosa pars pulmone adhæret, carnulen-
 ta verò costis. Verum hoc falsum esse, & ex su-
 perius paulò allata ratione, & Galeno decimoter-
 tio de vsu part. cap. 5. Cur verò in hoc carnulenta
 substantia à lateribus, neruosa autem in medio sit
 instituta, rationem reddit Galen. nempe quòd à
 cerebro veniunt nerui ad medium, quare merito
 ea pars neruosa fuit. Aristoteles autem tertio de
 partib. animal. cap. 10. eam fuisse causam ait cur
 neruosa substantia esset in medio, vt scilicet me-
 liùs superiora defenderet. Illud præterea addit, ictu
 traiectũ diaphragma risum mouisse aliquando, sci-
 licet ex calore, quem moueat vulnus. hinc apparet
 causa, quare si quis sub alis cõgatur, rideat, id enim
 accidit quoniam ex eo motu calefit diaphragma,
 quia motus celeriter ad eum locum peruenit, qui
 quanquam leuiter calefaciat, aperit tamen & men-
 tem mouet præter voluntatem. Hoc loco nonnul-
 li distinguunt risum, duplicemque illum faciunt,

verum

verum, & fictum: verus quidem risus est quando res, quæ delectet, præcedit: fictus verò cum secus, sed tantum labra mouentur simulatè, propterea dicendum est risum illum, quem sardoa herba faciat, esse fictum. Restat videndum ægritudines diaphragmaticas autem recenset Galen. lib. quinto de locis affectis, cap. 4. nam diaphragmate læso fit delirium non multum ab simile à phrenitide: phrenitis autem nunquam cessat, etiam si remittatur febris, pariter quoque delirium: quod diaphragmate læso euenit, vel cessante febre, procedit. Cum verò dicimus, diaphragma, cum in eo est abscessus non perficere suam operationem, nõ est intelligendum, quod non diuidat adhuc spiritalia membra à naturalibus, quoniam id falsum est, sed operatio impeditur, quia in eo sunt multi nerui, per quas passio communicat cum cerebro.

De anatomia cordis.

ELeuatis pānticulis apparebit tibi pulmo in cuius medio existit cor velatum pinulis pulmonis, vt ab ipso aëre attracto refrigeretur calor, & spiritus qui in eo generatur, & temperetur.

Cuius cordis primo apparet situs & locus, quia est in medio anterioris & posterioris, dextri & sinistri, quantum ad cuspidem eius declinans versus sinistrum: quantum vero ad radicem eius versus dextrū, vt possit bene insuflare calorē & spiritum versus dextram

dextram partem quę calidior esse debet sinistra. Est etiam in medio superioris & inferioris amotis extremis, & sic fuit locatum: quia sicut princeps & prima radix omnium membrorum.

Quę sit colligantia eius consequenter apparebit, sicut apparebit quantitas eius: quia non nimis magnum neque paruum: maius tamen est in homine quam in aliquo alio animali eiusdem quantitatis: quia plus habet de calore in quanto.

Apparebit etiam figura quia est figurę pinealis vel pyramidalis: quia huiusmodi figurę debet esse omne quod est excedentis caliditatis, quia propria figura primi calidi est figura pyramidalis. Est etiã alia ratio, distinctio ventriculorum eius, & ortorũ ab ipso.

Quarto debes videre numerũ partium eius: & ex hoc tibi apparebit quę sit substantia eius, & complexio, & iuamentum. Numerus vero partium eius est: quia partium eius quędam sunt extra substantiam eius, quędam vero sunt de substantia eius. Extra substantiam eius sunt casula cordis, & orta ab eo, quę postea apparebunt.

Casula eius neruea siue pellicularis est dilatata multum facta ad tuẽdum cor à nocivis

ciuis: & ne contangatur ab aliis membris in hora suæ expansionis: & causa quare non est continua cum corde fuit, ne cor in sui motu impediretur propter aggrauationem: fuit etiam alia causa vt contineret quandam aquositatem, qua humectaretur cor & roraretur ne propter superfluum & continuum eius motū exsiccaretur: & ideo semp in hac casula reperitur aquositas: & ideo si exsiccatur hæc casula, vel priuatur tali aquositate, ad marasmum deuenit: sicut si fit superflua, in iectigationem, et tremorem, et cardiacā passionem cadit cor: vt ponit Galen. quinto de interioribus. cap. 2.

Partes autem essentielles cordis: quædam sunt extrinsecæ: quædam intrinsecæ. Extrinsecæ sunt pinguedo, additamēta cordis, siue auriculæ cordis, & orta ab eo.

Pinguedo satis apparet in superficie exteriori cordis, propter finem potius, quā ex parte agētis: quia pinguedo generatur a frigido aut calido diminuto, cor autē est calidissimum: sed generata est propter finē vt cor propter vehemētem & continuum motum non exsiccetur.

Additamenta cordis sunt quædam partes pelliculares aptæ ad dilatandum & cōstringendum

pinguedo generatur a frigido aut calido diminuto.

gendum: genitę ad hoc, vt quando in corpore nostro generatur multū de sanguine, vel de spiritu in ventriculo sinistro, dilatētur, vt contineant sanguinem multum, vel spiritū multum, qui interdum generatur.

Sed tu obiċies sicut obiċit Gal. loco pre allegato. Quare natura nō fecit cor ita magnum quod posset continere omnem multitudinem sanguinis & spiritus: sed fecit illa additamenta.

Dico quod prima causa fuit: quia si cor fuisset valde magnum, esset causa debilitatis virtutum propter dispersionem spiritus. Et propterea animalia quę habent corda magna sunt timida, vt lepus, & ceruus.

Secunda causa fuit: quia cum non semp generetur in nobis multa quantitas spiritus & etiam sanguinis, cum cor fuisset magnū, vt plurimum concauitas cordis extitisset vacua: sed quia istę auriculę possunt faciliter contrahi quando nō sunt repletę, ibi non erit vacuitas, Item euitatur ponderositas: quę autem sint orta a corde subsequēter apparebit.

Partes autem intrinsecę cordis sunt ventriculi cordis, dexter scilicet, & sinister, & medius, Scinde igitur cor primo in parte
dextra

dextra & incipe a cuspide eius, sic quod aliū parietem non tangas. Et tunc occurret tibi statim ventriculus dexter, & videbis in eo duo orificia: quorū vnus est versus hepar, & est orificium a quo egreditur vena cylis, & est orificium maximum: quia per hoc orificium cor trahit sanguinem ab hepate, & ipsum expellit ad omnia alia membra. et quia per istud orificium habet plus trahere quā expellere: ordinauit natura vt clauderetur hora constrictionis quādo debet expellere: & aperiretur quādo cor dilatatur & trahit. Et habuit tria hostiola quæ aperiuntur ab extra ad intra: & quia per idem orificium fit etiam expulsio sanguinis perfecte decocti: et licet non totus expellatur, quia aliqua portio eius expellitur ad pulmonē: alia pars eius transit in spiritum: ordinauit natura ne illa hostiola essent multū depressa; & vt perfecta clausione non claudantur.

Nota tamen duo hic. Primum quod sensus tibi declarat quod vena cylis habet originem suam a corde; quia cum substantia cordis est continua & ipsum non pertrāsit: et est maxima iuxta cor, sicut stirps arboris.

Et secundo aduerte quod ab ista vena antequam cōcauitatem cordis ingrediatur
oritur

oritur vena, quæ circa radicem cordis circū ligatur, & ab ea oriuntur rami dispersi per substantiam cordis: & ex hac vena nutritur cor: id est ex sanguine huius venæ.

Postea vero versus pulmonem est aliud orificiū venę arterialis, quę portat sanguinē ad pulmonē a corde: quia cū pulmo deseruiat cordi secūdū modū dictū, vt ei recompēset cor ei trāsmittit sanguinem p̄ hęc venā, q̄ vocat̄ vena arterialis: vena quę portat sanguinē, & arterialis quę habet duas tunicas: et habuit duas tunicas, primo quę vadit admēbrum quę existit in cōtinuo motu. & secūdo quę portat sanguinē valde subtilē & cholericiū. vt igitur non euaporet, & vt non scindatur vena ista habet duas tunicas. quę est dicta vena arterialis. Et in orificio isto vel istius venę sunt tria hostiola quę aperiūtur ab intra ad extra & claudūtur ab extra ad intra perfecta clausione: quia per hoc orificium cor rātum debet expellere a se hora constrictionis, & non debet retrahere aliquid hora dilatationis.

Hoc viso, scinde ventriculum sinistrum: ita quod in medio remāeat paries in quo est ventriculus medius: & tunc statim tibi apparebit concauitas ventriculi sinistri: cuius paries est densior & spissior pariete ventricu

li dextral. Et hoc fecit natura ppter tria. Pri-
mo qa hic vētricus debet cōtinere spiritū,
dexter vero sanguinē. sanguis autē grauior
est spiritu: ppter, q̄ rōe cōtētorū plus aggra-
uaretur pars dextra, q̄ sinistra: & iō cor non
fuiſſet æqualis ſtaturæ. vt igit̄ eſſet æqualis
ponderis fecit parietem ſiniſtrū groſſiorē vt
recompensaret ſua grauitate, grauitati ſan-
guinis. Alia cauſa eſt, quia debet continere
ſpiritum, qui facile eſt reſolubilis. vt igitur
non reſoluatur paries fuit ſpiſſus.

Tertia cauſa eſt: quia hic ventriculus ge-
nerare debet ſpiritum ex ſanguine: ſpiritus
autem generatur ex ſanguine a forti calidi-
tate ſubtiliante & euaporante: fortior autē
eſt caliditas quando eſt in materia & ſub-
iecto denſiori: quare paries huius ventricu-
li fuit ſpiſſus & denſus.

In concauitate autem eius circa radicē ſunt
duo oriſicia. Vnum eſt oriſicium arteriæ ad
horticæ dicitur adhorti: quia immediate a
corde orta: vel quia eſt principium originis
omnium arteriarum, quæ ſunt in corpore:
& per iſtam transmittit cor ſpiritum ſupra
ſanguinem in ipſo generatum ad omnia mē-
bra quando conſtringitur. Et propterea or-
dinauit in principio iſtius oriſicii tria hoſtio-

la densa valde q̄ p̄fecta clausione claudūtur
ab extra ad intus, & aperiunt̄ ab intus ad ex
tra: & orificium hoc est valde profundum.

Aliud est orificium arteriæ venalis quæ
dicitur arteria, quia vaporem portat: dicit̄
tur venalis, quia tantum habet vnā tuni
cam: quia natura non fuit multum sollicita
de custodia eius, quod per ipsam transit q̄
est vapor capinosus, vel aër, quē attrahit cor
a pulmone. Et p̄ istā venā cor attrahit & ex
pellit. natura in orificio hoc posuit tantū duo
hostiola, quæ p̄fecta clausione nō claudunt̄.
Et sunt hostiola ista multum eleuata vt apo
diēt parieti cordis q̄do expellit & trāsmittit
spiritum ne per ipsum spiritus expellatur.

Et ista sunt mirabilia opera naturæ: sicut
mirabile est opus ventriculi medii. Nā iste
ventriculus non est vna concavitas, sed est
plures cōcavitates paruæ, latae magis in par
te dextra quā in sinistra: ad hoc vt sanguis,
qui vadit ad ventriculum sinistrum a dex
tro, cum debeat fieri spiritus, cōtinue subti
lietur: quia subtiliatio eius est præparatio
ad generationem spiritus: & natura trans
mittendo aliquid per membra vel viam ali
quam nūquam transmittit illud ociose, sed
præparando illud ad formam quam debet

suscipere: vt frequenter ponit Gal. in libris de iuramētis: vt in quinto, de venis meseraicis. Et hoc de partibus substātib⁹ cordis.

Alię sunt partes quę sunt ortę, & illa sunt quatuor, scilicet vena cylis, vena arterialis, arteria adhorti, & arteria venalis, & duo vadūt ad pulmonē; cuius anatomia statim videas.

CVRTII.

Cordis & pulmonis situs in medio est, vt aēr attractus primū ad pulmonem, deinde ad cor veniat: ex qua re illud consequitur, quod possumus diutius retinere anhelitum, quod fieri non posset, si statim ad cor, non etiam ad pulmonem aēr deferretur: oportet enim vt cor, continuē dilaretur, & adstringatur, hinc sequitur animal, diutius anhelitum retinere posse, de hoc Galen. lib. sexto de vsu part. cap. 2. inquit, naturā hoc ideo instituisse, quia eo aēre, qui attrahitur, et expellitur, vtitur ad formādam vocem, quoniam autem cum vox formāta, aēr attrahi non potest, ideo fit, vt primo ad pulmonē, inde ad cor transmittatur, vt quis possit longiori vti oratione, neq; aērem attrahere, quod si primo ad cor attraheret, oporteret id sepius facere, hoc etiam illa de causa factum est, ne cum transimus per loca male olentia, aēr ille infectus, nos interficiat, quod fortasse vsu eueniret, si statim aēr ad cor attraheretur, præterea nō possemus aquis mergari, timore suffocationis. Quod ad positionem attinet, inquit Mundinus, cor esse in medio superioris, & inferioris, amotis extremis (est autem per extrema intelligendum pedes & manus) quapropter

quod propter Galenus sexto de usu part. cap. 2. inquit cor esse in medio Thoracis, non totius corporis. At verò Arist. tertio de partib. animal. cap. 4. inquit, in medio cor est. positum, sed magis superius quàm inferius, & parti priori amotius, quàm posteriori. Et paulò infra. Cor ceteris animalibus in medio pectore est, homini tantum paulò uergit ad læuam ut eius partis refrigerationem moderetur & compense: omnium enim animalium homo maxime refrigeratam habet partem sinistram. possumus tamen concordare Galenum, & Aristotelem, in prima sententia: nam dicendum est cor esse in medio si ad pectus tantum conferatur, si verò ad vniuersum corpus dici poterit esse superius. Quod autem inquit Aristoteles, cor magis ad sinistram uergere, quàm ad dextram, id planè Galen. negat. quoniam pars vna in dextra, est altera verò in sinistra. Etenim si pars cordis, quam cuspidem vocant, consideretur, non maioris quantitatis est, quàm altera pars. ut autem concedamus cuspidem esse in læua parte, non sequitur tamen maiorem partionem cordis uergere ad sinistram partem, nam etiam si fortè promineat cuspis, magis quàm radix: tamen si pensetur quantitas radicis, quæ maior est quàm sit cuspis, nõ maior reperietur cordis portio in læua, quàm in dextra. Quare cum Aristoteles dixit cor, declinare in læuam partem magis, quàm dextram, rationem habuit situs, non quantitatis. Galenus verò, cor omnino in medio esse vult, neq; in vnam magis, quàm alteram partem declinare, cuius rei ratio est, tum quòd locus is maxime tutus, & minime fallax est: tum quia

*cordis
positio*

*caleni op
de corde*

oportet, vt æqualiter aërem à pulmone recipiat. Hoc loco quæstionem illam sponte omitto, vtrū scilicet membrum principalius sit, cor ne an cerebrum. nam cor assertorē habet Aristotelem, cerebrum verò Galenum. Declarans autem Mundinus cordis quātitatem ait maius esse in homine quā in alio animali, quod eiusdem magnitudinis sit atque homo, quoniam maiorem etiam habet calorem: ad cuius refrigerationem (vt inquit Galen.) opus fuit satis magna aëris quantitate, quæ in pulmone continetur. Figuram verò cordis esse ait pyramidalem, cuius figuræ esse debet quicquid excellenti calore est præditum, quoniam ea est ignis figura. Verū hæc ratio parum rectè procedit, quoniam si ita esset, oporteret cuspidem cordis sursum versam esse, quod tamen falsum est. Iecur etiam calidum est, non tamen pyramidis formam refert: etenim natura secundum operationes, figuras etiam, membris singulis indidit. Sed quoniam forte ea ratio etiam ipsi suspecta erat, subiunxit alteram, quod huiusmodi figurā habeat propter distributionem ventriculorum, eorumque quæ ab ipso oriuntur: quæ tamen ratio non magis probabilis est, quā altera. quid enim prohiberet, etiam si nō esset huius figuræ, quo minus ab eo oriri possent ventres, & venæ sicut à cerebro? Quare dicerem ego veriore causam esse eam, quæ ex Galeni dictis colligi potest sexto de vsu part. cap. 7. cum declarat quæ pars cordis nobilior sit. Basis, inquit, nobilior est, cuspidem autem ignobilior, quod ex cordis totius primaria operatione colligitur. ea est, vt innatę caliditatis, qua gubernatur animal, veluti

fomes

fig. cordis
pyramidali

fomes quidam & fons sit. hæc autem operatio per-
 fitur per venas & arterias, quæ sunt in basi, qua-
 re ea maior esse debuit, vt venâ magnam, aortâ,
 & venalê arteriam cõtinere posset. reliquæ partes
 sunt tanquam latera, ad quæ istæ materiæ demit-
 tuntur: cuspis veluti propugnaculum quoddam
 est ne cor tangat ossa pectoris, lædaturque: quam
 etiam ob causam duriuscula est. Igitur si amplio-
 rem habuisset cuspidem, præterquam quòd maius
 fuisset cor, quàm par erat, facilius ab ossibus pec-
 toris posset lædi, animal etiam magis timidum fui-
 sset. Ex his videndum est quæ sit substãtia cordis, *sub cordi*
 nam fuerunt, qui crediderint substantiam cordis
 nil aliud esse, quàm musculus, quoniam & rubi-
 cundam carnem, & villos habeat sicut musculi,
 quorum opinionem refellit Galen. septimo De
 anatom. aggress. cap. 8. Et sexto de vsu part. cap. 8.
 quænam sit eordis substantia declarat, dicens, Cor
 est caro dura, & vix patibilis, ex villis multiformi-
 bus consistens. quâquam autem secundum hæc
 duo simile videatur esse musculis, euidenter tamen
 ab ipsis differt. illis enim vniformis est natura vil-
 lorum (aut enim rectos solùm habet, aut transuer-
 sos: simul autem vtrosque nullus) cor verò vt run-
 que hoc genus habet, et tertium insuper nactus est,
 nempe obliquorum. Sed etiam duritiæ, uigore, vni-
 uerso robore, patiendi difficultate multùm diuersi
 sunt villi cordis ab omnibus alijs. plura etiam ad-
 dit Galenus, quæ nunc ne prolixior fiam sponte
 omitto. hoc tantùm ad hâc sententiam addo: quòd
 quæ membra sunt eiusdem substantiæ, eandem
 etiam habet operationes, & si sint in diuersis specie-
 bus animalibus

animalibus (hoc enim verum esse nemo est, qui
 neget) pariter dicendum est ea membra, quæ diuer-
 sas habeant operationes, non esse eiusdem substan-
 tiæ, cum igitur non eadem sit operatio cordis, &
 musculorum, siquidem musculi motum faciunt vo-
 luntarium, cor autem naturalem: sequetur merito
 ea neque eandem habere substantiam. Quod si for-
 te opinatus fuerit quispiam cor idè non habere,
 posse motum naturalem, quoniam non recipiat
 neruum motorem, sed tantum sentientem, is ne de-
 ciptatur moneo: nam qui nervus sensum præbet,
 idem etiam motum affert, quod è sexto nervorum
 pari discere licet, à quo oriuntur nervi, qui gutturi
 quidem dant motum: stomacho verò, & intestinis
 sensum, ergo idem nervus & sensum, & motum
 afferre potest, non tamè affirmaverim cor ab illo
 nervo & a stringi, & laxari, quoniam huiusmodi
 motum à substantiâ sua habet, non aliunde: nam
 si abscindatur, adhuc tamen movebitur. Præterea
 si cui cordi est, hoc manifestius videre musculum
 & cor edat, alium enim refert sapore caro cordis,
 à carne musculi. Igitur caro, & villi cordis non
 eadem sint, ac caro, & villi musculorum. Quod
 verò ad tunicam cordis, quam Galenus *περικαρ-
 διον χιτώνα* nominat, attinet, deficere non nihil mihi
 videtur Mundi, in recensendis vsibus huius tuni-
 cæ. Plenius de ea tractat Galenus libro sexto de
 vsu part. cap. 16. vbi inquit, Hæc quidem tunica
 eiusmodi est figuræ, cuiusmodi & contentum ab
 ea viscus. ita autè & in magnitudine, vt nec offen-
 datur aliquo thorax, neq; cor arctetur. Quoniam
 autem tangere oportebat thoracis ossa, quæ dura
 existunt

musculorum
 et Cordis
 diuersi sunt
 operationes.

existunt, & omnium mollissimum viscus pulmo-
 nem: periculum erat, si durior facta fuisset hæc tu-
 nica, quàm nunc sit, mole stari ab ea pressum &
 cōfractum pulmonem: si verò mollior, ipsam pati
 aliquid ab ossibus. Propterea igitur sicut positio
 ipsius tunicæ media est inter contraria, ita & cor-
 poris substantia in medio est extremorum: tantò
 enim est osse mollior, quantò pulmone durior.
 Quod autem ait de aqua, quæ in hac tunica sem-
 per cōtineatur, Galenimq; huius sententiæ testem
 adducit, tam rectè sentit, quàm id vsquam Galen.
 dicit. Nam quod de simia, quæ macredine perierat,
 adducit Galenus quinto de locis affectis, cap. 2. id
 tantum probat homines etiam similibus posse affe-
 ctibus infestari. Præterea si, vt inquit Galen. hæc
 tunica nō maior est quàm vt cor possit continere
 cum dilatatum est, quomodo potest continere &
 cor, & aquam illam. Neque illuc confugiet, oport-
 ere vt humectetur cor, siquidem non aqua, sed pin-
 guedine potius humectabitur, liquefacta enim
 panniculos humectat: etenim ad hoc hoc munus
 nō aqua, sed pinguedo à natura instituta est. obj-
 ciet aliquis, quomodo possit in mortuis hæc aqua
 inueniri, quod fecit Galenus in simia. Ego verò
 non nego, inueniri posse in mortuis aquam, cum
 in ventriculis cerebri eorum, qui dissectantur, aqua
 inueniatur, & ego ipse in boue cerebri vetriculos
 plenos aqua viderim: generari enim hanc censo
 ex spiritibus, qui resoluantur. Sed dico non conse-
 qui vt, si in mortuis reperitur, ita etiam viuus neces-
 sarium sit eam inesse. Subsequuntur aliæ cordis
 partes, ex quibus pinguedinem factam esse inquit

Mundinus ob proprium pinguedinis vsus, vt scilicet humectet, non propter agens, quia pinguedo, ait, generatur ex frigido, aut calido quidem, sed imminuto: cor vero calidissimum est. Verum ad generationem alicuius, finis quidem spectatur, sed opus est materia, & eo quod agat. Quare dicerem, *Cum pinguedo sit vntuosa sanguinis pars, oportuisse eam circum pelliculas coagulari. quoniam vero circa cor sunt pellicule, quarum materia existit frigida, præcipuè in cordis parte superiori: nimirum igitur circum eas vntuosior sanguinis pars concreta est in pinguedinem. Verum quid Galenus respondebitur: qui primo libri de Tempera. cap. ultimo inquit, Fieri non potest vt coaguletur pinguedo circa Iecur, aut venas, aut cor, aut aliud membrum concreseat, quod vehementer calidum existat. propterea quod à calido resoluitur pinguedo, à frigido vero coagulatur. Ego Galeni locum hunc ita intelligendum censeo, vt dicamus generari pinguedinem à frigido, propterea in Iecore & cordis cuspide, vbi sunt panniculi tenuissimi fieri non potest. nil tamen prohibere, quominus circa cor, vbi tunice & panniculi crassiores existunt, generetur pinguedo. Sciendum est præterea in superiori cordis parte duo esse dura corpora quæ cordis aures dicuntur, de quibus Galenus sexto libro de vsu part. cap. 15. latius pertractat. has, inquit Mundina natura instituit, vt in eis spiritus, si multi in corde existant recipiantur. præterea inquit natura noluit vt cor adeò magnum esset, in quo recipi posset & contineri quàm maxima & spirituum, & sanguinis quantitas. Verum, enimvero cum per aortam cor*

spiritum

pinguedo

*quæ non
natura*

spiritum emittat, sanguinem vero per venalem ar-
 teriam, superfluum fuit aures cordis ad id numeris
 institutas esse. Galen. vero inquit, Cum cor dila-
 tatur, trahit per dextrum quidem ventriculum san-
 guinem, per sinistram vero aërem, atque hæc at-
 tractio fit ratione vacui, illa vero familiaritate
 qualitatis: sicut heraclius lapis ferrum trahit. Cum
 igitur cor attrahit, si non sit tanta materia, quanta
 sufficiat ad proportionem attrahentis vehemen-
 tiæ, forsitan vasa illa rumperentur. quemadmodum
 enim si quis vas aëre plenum eua cuet, ore per si-
 tuam aërem emulgens, id utique rumpet si violen-
 tius attraxerit: eodem modo cor multiplicem ca-
 uitatem vasorum replere indigens disrumperet ea,
 vehementius trahens, si nulla ei extorsum appo-
 sita esset concavitas, qualis in vtraque aure illi ad-
 iacet. prudenter igitur curavit natura ne vasa ea dis-
 rumpantur: nam in dextra aure est sanguis, in sini-
 stra vero aër. Quod autem dicebat Mundinus ea
 animalia quæ cor maius habent esse timidiora,
 habet dubitationem. Auic. quidem decima tertij.
 capl. de anatomia cordis, eandem uideretur habere
 sententiam, cum inquit, Et si quæ animalia sunt ma-
 gni cordis, & cum hoc sunt timida, ut lepores, &
 cerui, causa in eo est, quod calor eorum est par-
 uus, & exsiccat ex eo plurimum: quare non ca-
 lefacit integrè. quæ autem paruum habent cor, &
 cum hoc, audacia idè sunt, quoniam caliditas in
 ipso est plurima & coarctatur, & fit vehemens. hæc
 Auicenna. Verumtamen ratio contrariam senten-
 tiam asserere videtur, quod scilicet cordis ampli-
 tudo arguat caliditatem, quoniam calidi sic dila-
 tare,

Galeni
verba

hera. lapis
perru. trahit

lingua
calidior
coris.
 tare, sicut etiam signa calidi iecoris sumuntur ex
 venarum amplitudine. Quidam dicunt quòd, si
 conferantur inter se homines, culus cor maius erit,
 ille etiam erit calidior. Si verò diuersę speciei ani-
 malia comparentur, illud audacius erit, cuius cor
 fuerit minimum, ad proportionem totius corporis.
 Illud tamen notandum est ex Aristotele, tertio de
 part. animal. cap. 4. quòd ea animalia pauida
 sunt, quibus cor grandius: audentiora, fidentioraq;
 quibus minus aut mediocre. affectus enim, qui ac-
 cidit ex metu, iam in ijs præest, quoniam calorem
 proportione cordis non habeant, sed parum calo-
 ris in magno conceptaculo exolescat: itaque san-
 guis frigidior fit. Nil igitur prohibere credo, ne, si
 qua animalia magnū cor habent, sint audentiora;
 modo caliditas respondeat magnitudini cordis,
 quoniam audacia, & fidens animus non ex ma-
 gno, aut paruo corde sumitur, sed ob excellentem
 calorem. fieri enim potest, vt qui cor habeat ma-
 gnum sit tamen fidentior, quàm qui minus. modo
 calorem proportione magnitudinis habeat. & qui
 minus habebit esse potest audentior, quoniam ca-
 lor magis arctatur: atque ideo maiorem vim ha-
 bet. Cordis ventriculos tres esse inquit Mundinus.
 Aristoteles autem tertio libro de partib. animal.
 cap. 4. inquit, Ventrículum triplicem cor magno-
 rum animalium habet, duplicem minorum, vnum
 ad postremum. nullūque est, quod sine vllō ven-
 triculo constet. quam sententiam refellit Galenus
 libro sexto de vsu part. cap. 9. Non enim rectè, in-
 quit, distinguebat Aristoteles multitudinem ven-
 triculorum cordis, ad magnitudinem & paruitatē
. 311.

corporum referens eorum numerum. Neque enim maximis quibusque animalibus sunt tres, neque minimis est vnicus; eandem enim exactè habet constructionem cordis maximus equus, cum minimo passere. non enim magnitudinem & paruitatem corporum respiciens natura permutat organorum formam, sed actionis differentia scopus, & intentio constructionis ei efficitur. nam omnibus animalibus, quæ pulmonem habent, est dexter, & læuus ventriculus, hic quidem spiritibus generandis, ille vero pulmonem alendo. Quæ cum ita sint, duo tantum omni cordi insunt ventriculi. quem vero Arist. tertium credidit, pars est dextri, quæ ad læuum declinat, vt inquit Galen. in libro de arteriarum dissectione. Quod autem à dextro ventriculo in sinistrum sit transitus declaratur ab eodem Gale. libro tertio de naturalib. facultatib. cap. 14. cum inquit in dextro ventriculo duo esse orificia, vnum quidem venæ cauæ ingrediens, & deferentis sanguinem. Alterum venæ arterialis transmittentis sanguinem ad pulmonem. quod si sanguis non demitteretur ad læuum ventriculum, oporteret orificium venæ arterialis esse tam latum, quàm est venæ cauæ orificium, vt sanguis, qui per dextrum ventriculum ingreditur cor, vniuersus posset ad pulmonem transmitti. Præterea in sinistro ventriculo venæ aortæ orificium latius est, quàm venalis arteriæ, per quã aer recipitur: quod signum est cor à dextro ventriculo aliquid recipere: cum orificium per quod emittit maius sit, quàm illud per quod recipit. Ac per hæc quidem signa Galenus affirmat à dextro ventriculo in læuum esse

esse transitum. Si vero dextrum ventriculum fecerit quis, inueniet venam cauam magnam ab hepate venientem, & tria ostiola quæ clauduntur, inquit Mundinus, internè, tamen exactè non clauduntur, quoniam sanguis qui est in dextro ventriculo debet redire cum est digestus. hæc cum dicat Mundinus manifestè Gal. repugnat, qui ea exactè claudi asserit, sexto de vsu part. cap. 14. demum concludit quod in orificijs tria sunt ostia, quæ exactè clauduntur, quod autem tria tantum sint, eam asserit rationem, quoniam si plura fuissent, non firmiter, neque etiam si duo fuissent exactè claudi potuissent. Iam uero errat Mundinus cum inquit, sanguinem intracrem dextrum ventriculum regredi debere, ut per totum corpus disseminetur: hoc enim non probat Galenus, nam cum dicimus sanguinem transmitti ad læuum ventriculum, supponimus eum sanguinem, qui dextrum ingreditur, cum non possit ad pulmonem transire, demitti ad læuū ventriculū. quod si velimus dicere sanguinē regredi, respondet Gal. si hoc verum foret, rediturum esse sanguinem ad hepar eadē via. præterea, cum dexter ventriculus deficiat in ijs animalibus quæ pulmone carent, dexter ventriculus deficere non deberet, etiā si deficeret pulmo, quoniam in eo sanguis elaboratur pro vniuerso corpore. Sed dicet quispiam, si sanguis a dextro in læuum ventriculum transir, quid ijs fiet, qui dextro carent ventriculo. Respondeo, quod in ijs sanguis è substantia cordis ad læuum ventriculū demittitur per venas, ideóque sanguis ille redire rursus nõ debet. Sed illud norandū est, quod ostia, per quæ exit sanguis, non sunt ijs similia, per quæ

intrac

Intrat. nam Gale. sexto De vsu part. cap. 14. inquit,
 Sunt autem in vena arteriosa, a qua, nutriri pulmo-
 nem dicebamus, membranę tres propter figuram
 literę σιγμα ab anatomicis nominatę σιγμοειδής,
 quarum tres sunt epiphyses. in vena autem intro-
 ducēte sanguinem sunt tres membranę quas τρι-
 γλώχινος vocāt, hoc est trifulcastearum enim com-
 positio exquisitè similis est cuspidibus angulosis sa-
 gittarum, Neque verò illud prætereundum est, quā-
 uis Mundinus omiserit, quòd ea ostia, per quę san-
 guis introducitur, cordi sunt arctè alligata, sunt. n.
 in extremitate venę cavę, eaque non solùm sunt
 vt claudantur, sed etiam vt attrahant. cū enim cor
 dilatatur, ligamēta, quibus ea ostiola cordi anne-
 xa sunt, faciunt, vt sanguis attrahatur. reliqua ve-
 rò ostiola non itidem ad attrahendum facta sunt,
 sed vt claudantur tantùm atque aperiantur. Hoc
 loco secutus Mundinus Aristotelis sententiam, in-
 quit venam cauam ortum à corde habere: quoni-
 am, inquit, vena ista nulli venę committitur. quòd
 refellit Galen. sexto libro De vsu part. cap. 11. di-
 cens hanc venam ideò non cōiungi venę illi, quę
 pulmonem ingreditur, quoniam hæc duas habet
 tunicas, illa verò vnam tantum, non tamen dicen-
 dum ob hanc rem esse, eam oriri à corde. Monee
 autem nos Mundinus, quòd à vena caua, antequā
 dextrum ventriculum ingrediatur, demittitur ve-
 na ad cor nutriendum, neque enim sanguine nutri-
 tur, quem à caua vena attrahit, quòd cur ita fiat
 quærì posset, præsertim cum à vena caua sanguis
 substantiam cordis ingrediatur. Respondet Gale-
 nus sexto libro De vsu part. capi. 17. cum inquit.

Pro

Proinde quod uidetur quibusdam à ratione alienum esse, maximè omnium rationi cōsentaneum est, cor uidelicet pulmōni præparare nutrimentū, sibi ipsi non præparare: ille enim indiget subtili & vaporoso sanguine, cor autem tali non eget, cor enim ex seipso motum, robusto egebat & denso corpore. pulmōnem uero a thorace motum, neque grauem, neque densum, sed leuem & rarū esse melius fuit. quoniam autem quale unum quodque est tali eget nutrimento, rationabiliter cor quidem crasso, pulmō autem vaporoso sanguine indigit. Et hæc est causa cur nō nutriatur cor ex se ipso, sed antequam implantetur in dextro eius uentriculo concaua uena, pars eius tam magna, quanta ad cor nutriendum sufficit, ad omnes eius particulas disseminatur. Est etiam in eodem uentriculo aliud orificium, a quo oritur uena arterialis, quæ sanguinem defert ad pulmōnem. in eo autem orificio tria sunt ostia, quæ exactè clauduntur introrsum: cum enim cor dilatatur, per hanc uiam nihil ipsum recipere oportet, sed cum astringitur, demittit sanguinem ad pulmōnem. Cur uero hæc uena duabus sit tunicis circumdata, causam hanc affert Mundinus, tum quia demittitur ad membrum, quod continuè mouetur; tum quia defert sanguinem tenuē admodum, & cholericum, ne igitur continuo motu attrita rumpatur, né uel sanguis euaporet, duabus induita est tunicis. Ideo Galen. sexto libro De usu part. cap. 10. uenas omnes ait vna constare tunica, arterias uero duabus, præter eas quæ sunt in pulmōne, nam eæ sunt permutatæ: dicitur enim uena arterialis, quia non pulsatur, ut reliquæ etiam uenæ,
duas

duas tamen habet tunicas vt arteriæ: Arteria au-
 tem venalis, quoniam pulsat, & vnâ tantû habet
 tunicâ. Duas autem vena arterialis habet tunicas,
 inquit Galenus, ne cum pulmo astringitur sanguis
 prematur, & regrediatur. ea etiam de causa ostia
 sunt instituta, quæ claudantur introrsum. non igitur
 ea causa, quàm affert Mundinus, vera erit, quod sci-
 licet duæ factæ sint tunicæ, ne disruptionis pericu-
 lum esset. etenim si hoc ita se haberet, oportuisset
 venalem quoque arteriam duas habere tunicas, cû
 si vllum foret fractionis periculum, non minus es-
 set in hac, quàm in illa. Præterea pulmonis substã-
 tia leuis est & rara; qua propter sanguine tenui
 eguit; qui ne exiret, huic uasi duas circumdedit tuni-
 cas. non, vt inquit Mundinus, quoniam periculum
 sit, ne sanguis ille tenuis exhalet. Quoniam autem
 dictum est, orificia, quæ exactè clauduntur, tria ha-
 bere ostia, sciendum est de Gale. sententia, ea ostia
 non ad eò penitus claudí, ut nihil omnino retrocedat.
 nam, cum incipit cor dilatari, incipiunt pariter
 claudí ostia, quo tempore fieri non potest; quin ali-
 quid retrocedat: cum etiam sunt clausa nihil non
 resudare necesse est; nam in venis sanguis est non si-
 ne spiritibus, vt meritò dixisse videatur Hippocr.
 omnia in nobis esse mixta, quòd nò possumus sim-
 plicissimam illam naturam, cui nihil sit admixtum,
 in nulla re perspicere, cum igitur dicimus nihil clau-
 sis illis ostijs retrocedere, intelligendum est non re-
 cedere aliquam notabilem quantitatem. Qua ex
 re colligitur claudí illa ostia exactè quidem vt ni-
 hil notandæ quantitaris exire permittant, non pro-
 hibere tamen, quominus aliquid resudet, quod ta-

men ad totius nutritionem non sufficiat: Quòd autem læui ventriculi latera sint densiora, & crassiora, quàm dextritres affert rationes Mund. quarum priores dug ex Gal. libro sexto De usu part. cap. 16. cū inquit, totū sinistrū crassum & durū fuisse, à natura institutum, ceu spiritalis ventriculi futurum tegmen dextrum vero subtile & molle, vt familiariter vtraque pars se habeat materijs, & ut cor ipsum fieret *ισόεξοπαρ*, hoc est in vtranque partem æqualiter inclinans. Spiritum enim crassiori tunica contineri melius fuit, pondus autem sanguinis in dextro ventriculo contenti, æquabilem, ac velut æquilibrem sinistro ventriculo molem habere. Si enim eundem ventriculum simul crassum & sanguine plenum natura operaretur, omnino ad illum cor totum conuerteretur & inclinaret. Altera ratio est, quoniã ad continendos spiritus est factus, qui ne facilè exhalèt, ideo tunica illis crassior obiecta est. Tertia ratio est Mundini qui inquit, Ex hoc ventriculo generari spiritum à forti caliditate (ita enim inquit) subtiliante & euaporante, caliditas autem fit fortior, quando est in substantia crassiori: igitur latera huius ventriculi densa & crassa esse oportuit. Verum non video quo pacto procedere hæc ratio possit. neque enim natura membrum densum effecit propter caliditatem, videmus enim ossa & panniculos densa quidem esse, cum nihilominus sint frigida. nature enim calor gratus ille est, qui est humido permixtus qualis est aërea caliditas: vt inquit Gale. in quartumdecimum primi libri aphorismum. In hulus læui ventriculi cōcavitate inquit Mund. duo esse orificia, vnum arteriæ,

terix, quæ aorta dicitur, quoniam immediatè à corde oritur, vel quia ab ea reliquæ omnes arteriæ corporis habent originem. Verùm hanc rationem falsam esse vel ex eo patet, quod secundùm ipsum vena caua à corde oritur immediatè: præterea ab ipsa reliquæ omnes venæ oriuntur, debet igitur dici & ipsa aorta. Arteria vero græca dictio est, quasi ἀέρα τήρασα, id est aërem seruans & cōtinens. Aristoteles autē loco arteriæ vsus est nomine aortæ, quod idem est cum nomine arteriæ. Quare Galenus cum aliquando hanc arteriam, aortam appellasset, subiunxit, vt Aristoteli placuit. Quare nugator erit si quis dicat arteriam aortam, quod si nos quandoq; id diximus securi iam receptam consuetudinē, id fecimus ἀμαδέσειον λέγοιτες, καὶ σαρπέσειον, hoc tamen loco admonuisse placuit vt paulatim prauas dicendi consuetudines, quæ possumus euellamus. Venalis autem arteria à natura ideo vnicam tantùm tunicam habuit, præter eas quas diximus causas, tum quoniam multū subtilis sanguinis per eam ad pulmonem deferri oportebat, ut faciliùs per eius poros aër recipi posset. præterea vt motibus obediat, neque enim, si duas haberet tunicas faciliè cederet. Quod vero de medio ventriculo affert Mundinus falsum est, non enim ventriculus ille est, sed quem medium ventriculum vocat, sunt meatus inter venas & arterias, per quos sanguis à venis ad arterias, & ab arterijs ad venas spiritus defertur. per eisdem etiam trāsit sanguis de ventriculo dextro in leuam. Cuius rei signum illud est, inquit Galenus libro sexto de vsu part. cap. 13. quod si secetur vena non sanguis mo-

do, verum etiam spiritus exhibunt, propterea quod cum arteria vena communicat. Illud etiam notatu dignum est quo forificia aortæ quidem, quæ aër ingreditur, veng vero arterialis, qua exit, latiora sunt, quàm alibi, quare apparet transsum esse à dextro in leuum ventriculum per latera, nam per venalem arteriam nō attrahitur tantum materiæ, quantum pro aorta sufficiat. Sanguis etiã, qui per cauam venam ingreditur, cum totus à vena arteriali recipi non possit, transit ad leuum ventriculū per latus medium, Eæ vero concauitates, factæ ea de causa sunt, vt sanguis probè inter eundem digeratur. Fuere quidam, qui hæc, quæ dicta sunt de arteria venali, & vena arteriali, animalibus quidem perfectis deseruire faterentur, imperfectis vero minime conuenire contenderent: his nihil quæ stionibus: In embryis enim aiunt non ex pulmone in cor sed ex corde in pulmonem ferri spiritum, nondum scilicet per os respirante animali, sed adhuc ei matre sicut alimentum, ita & spiritum largiente per vasa, quæ sunt in vmbilico, neque ad magnam arteriam a corde, sed ex illa ad cor decens est venire spiritum, & ipsi pulmone a corde largiri debere, non cordi a pulmone. Atqui si membranarum implantatio, aiunt, in orificio magne venæ eam habet constructionem, vt aut nihil, aut omnino parum ex ipsa ad cor transeat, per orificium vero arteriæ venosæ rursus & hic omnino paucum a corde ad pulmonem perueniat: manifestum est quod neque cor, neque pulmo transumet spiritum. His delirijs igitur illudentes artem nature tollere conantur. Quos merito irridet Galenus sexto de vsu par.

cap. 20. Reliquum est vt os, & neruum cordis consideremus. nam Aristot. tertio libro De partib. animal. cap. 4. Cor, inquit, sine osse est omnium, quæ nos nouerimus, præterquam equi, & generis bouū cuiusdam, quibus præ magnitudine quasi adminiculum subditum est: quomodo torū etiam corpus ossibus sustentatur, & continetur. hanc sententiam probat Galenus sexto De usu part. cap. 19. Non est tamen, propterea quod in quibusdam animalibus os in corde inueniatur, in alijs non item, existimandum naturam pro magnitudine animalium formam membrorum variare. Nam quedam est membrana pars, qua alligantur arteria venalis, & ostia; hæc senescente animali fit durior; iunioribus vero tenuis existit, fit que quo maior est animal, eo durior, adeo vt os appellari non immerito possit, atque ita vocatur cum durior existit: cum uero mollior, eam solemus cartilaginem, aut membranam nuncupare. hoc autem os consistit in radice aortæ, aut arteriæ venalis, aut etiam in radice ostiorum. Quod attinet ad neruum cordis: Galenus sexto De usu part. capi. 18. Nullum inquit in corde apparere neruum, sicut neque in Iecore, aut renibus, aut splene, solā tamen cordis tunicā germina subitium neruorum recipere: sed non negandū esse, neruorum aliquam partē venire ad cor, quamuis non appareāt, nisi ægrè, & in magnis animalibus. quæ a modum ad iecur, renes, & splen veniunt, ut sensu aliquo participant, ne sint omnino plantæ.

De anatomia pulmonis.

EX dictis aliquo modo apparere potest sub

tent ad cor, & a corde ducant aërem calefactum, & fumos capinosos ad arteriam tracheam. Istaë tamen viæ vel rami, quæ sunt inter has, sunt ita stricti vt sint inuij sanguinis, & peruij aëri intranti & exeunti: & ideo si dilatantur superflue potest fieri exitus sanguinis sine ruptura a pulmone. Concauitatem & vacuitates huius retis replet caro mollis ipsius pulmonis: & hæc est pars secunda eius.

Tertia vero pars eius est pñiculus eius rarus, ad quem terminantur orificia horum vasorum: verum est q̄ orificia vasorum tracheæ arteriæ sunt maiora orificiis aliorum vasorū, & apertiora. Primo quia orta sunt ex stipite maiori & latiori. Secundo quia sunt cartilaginosa & nō pelliculosa: & ideo cū sint duriora magis possunt stare aperta.

Et ex his nota vltcrius viam per quam a pectore ad pulmonem & tracheam arteriã expellitur scretus vel sanies, siue sanguis emanans a venis ipsius, velut in pleuresi a concauitate eius, velut in hæmoptoica passioe & empimate: quia quando materia in his locis est congregata, ipsa diuiditur ad minima, & fortitudine pectoris expellit ad pulmonē.

Et quãdo pulmo dilatatur orificia ramo

rum trachæ arteriæ magis aperiuntur, & per illa exugat materiam prædictam, & nō per alia orificia aliorum vasorum: quia nō sic sunt lata: neque dilatantur ora anhelikus, & tunc ex vasis illis, ille humor vel liquor expellitur ad vias latiores. Et ex illis ad maiores donec ad originem perueniat cannae pulmonis: & tunc cum tussi extra expellitur. & tussis etiam adiuuat ad penetrandū hunc catarrhum in cannales iam dictos.

Et ex his apparet quomodo expurgatur hæc materia: & dato quod nō perueniat ad cor: sed si expurgaretur per alia duo vasa bene de necessitate perueniret ad cor. Hæc omnia habentur a Gal. 5. de interioribus. ca. 3. sic igitur patet numerus partium integrantium pulmonem.

Partes eius quantitatiuæ sunt quinque scilicet duæ in parte sinistra: & tres in dextra: quarum: tertia dicitur pomum granatū siue culcitra, quia supra ipsam sedet vena cylis, & arteria in directo cordis in loco vbi vena ascendit ad cor.

Et ex hoc potes videre quantitatem pulmonis: quia paruus si non inflatus: si tamen sufflando ipsum inflaueris videbis ipsum magnificari: maior tamen est quātitas eius

in dextra quam sinistra : quia in sinistra est cor locatum, ibi occupans locum.

Figura eius patet : quia ad figuram cli-
bani figuratus est, in parte posteriori longio-
rem habens magnitudinem quam anteriori.
eius colligantia patet ex prædictis.

Et iuumentum, & ægritudines eius sa-
tis sunt notæ : nisi quod debes excorticare
ramos tracheæ arteriæ, & videre annulos ro-
tundos, quos expuit peripleumonius vel
pthisicus, quia illi sunt rotundi : sed habens
vlcus in canna pulmonis, de cuius anatomi-
a statim prosequendum est, non expuit
annulos, sed cortices : & si annulos expueret,
non tamen rotundos cuius causam dicemus.

CVRTII.

Constare pulmonem inquit Mundinus ex tri-
bus vasis, carne, & pāniculo : quibus addebat Gal.
etiam neruum, qui ad eius corpus venit, vasa ve-
ro sunt, aspera arteria, arteria venalis, quæ oritur
à sinistro cordis ventriculo. Vena arterialis, quæ
à dextro, Canna aurem pulmonis in quatuor pin-
nulas in quatuor ramos diuiditur, secundum qua-
tuor pinnulas pulmonis. Ita etiam vena arterialis.
Venalis autem arteria superiorem partem, id est
anteriorem, pulmonis petit, arterialis autem vena
inferiorem, dorsum versus : quoniã, vt inquit Gal.
septimo de vsu part. cap. 8. non erat rationi con-
sentaneum vt arteria venalis, quæ subtilis est tam
s s longè

longè deducatur, quod fieri potuit in vena arteria
 li quoniam ea crassior existit. In harum medium
 aspera venit arteria. hi vero rami omnes interte-
 xuntur in modum retis, cuius cōcauitatem replet
 caro pulmonis, hæc autē aspera arteria, inquit Mū-
 din. ea de causae st in medio & arteriæ venalis, &
 arterialis venæ, vt ab hac quidem nutrimentum
 accipiat, per illam verò aërem ad cor transmittat.
 quare meritò inter hæc vasa fuit posita, omisit au-
 tem Mundinus causam, quam propter non imme-
 diatè ad cor à pulmone aër demittatur, sed hac in
 re vtatur ope venalis arteriæ. Galenus verò eam
 affert rationem, septimo de vsu part. cap. 8. quòd
 aspera arteria non sit cum sinistro ventriculo natu-
 raliter iuncta, præterea cum in aspera arteria sit
 tantum spiritus, in sinistro verò ventriculo etiam
 sanguis, non oportuit ad ipsum purum spiritum de-
 ferri: quare vtitur vena arteriali, quæ sanguinē
 vnà cum spiritu continet. Ea etiam de causa cum
 vena arteriali cōmittitur aspera arteria, quia ni-
 hil habet in se sanguinis, quo nutriatur. Qui verò
 credunt nullum arterijs inesse sanguinē, neque vnt
 causam afferre, quam propter aspera arteria non
 statim à se transmittat spiritum ad cor, sed id faci-
 at per venam arterialem. dicitur autem hæc arte-
 ria græcis quidem τεράχνη, nobis verò aspera, quo-
 niam aliæ arteriæ cum lques sint, hæc est aspera.
 Quinque verò pinne à natura pulmōni datæ
 sunt, vt inquit Gal. sexto de vsu part. cap. 4. ex his
 quatuor motu pectoris mouentur, quinta est tan-
 quam substratum quoddam venæ concavæ. qua-
 re ea non eguit vasis ab aspera arteria, orris: sed
 venulas

venulas tantum quasdam pusillas habet ab alijs ramis descendentes. aspera igitur arteria in duos primum diuiditur ramos iuxta partes pulmonis, quorum vterque rursus in duas diuiditur partes, secundum geminas pinnulas pulmonis. Hos ramos inquit Mundinus demittere aërem ad venalem arteriam, esseque adeò strictos vt sanguinū sint inuī. quod si tamen laxentur supra modum, potest sanguis expui, etiamsi nulla vena effracta sit. Hic autem aër (ex Gal. septimo libro De vsu part. cap. 8. & Auic. decimatertij cap. 1.) primum in pulmōe apparatus, primā que elaborationē accipit. post hęc autē in corde, & arterijs, & ijs maxime, que sunt in plexu retiformi. postremā verò et perfectissimā in cerebri vetriculis, ubi et animalis primū exactè efficitur. quò fit vt aër iste ad duas precipuè res utilis existat, refrigerationē scilicet cordis, & nutrimentū spiritus animalis. Cū verò inquit Mund. orificia vasorū asperę arterię maiora esse & aptiora orificijs aliorū vasorū. Totā hęc sententiā sumpsit è Gal. quinto lib. de locis affectis, cap. 3. vbi ait eandē pportionē esse ramorū inter se, qualis est originū asperę arterię et venalis. quò n. aspera arteria maior est arteria venali, eò maiores sunt eius ramorū extremitates. hinc est quod materia, quæ in pectore cōtinetur, potest hac viā expui: ij siquidē rami magis semper laxantur, quos cū ingressa est materia faciliè expuit. ea verò nō ingreditur venalē arteriā aut arterialē venā, quoniam per has vias ad cor deferretur. Nam vult Gal. vt cū pectus astringitur materia hęc versus cannam pulmonis pellatur, qua de causa tussis fit,

vt scilicet pectus astringatur magis. Ex his illud etiam manifestum esse credo, quo modo materia, quæ resudat in pleuritide expui possit. Difficilimum verò est medicamentis purgare materiam pulmonis: nam (vt omittamus eam quæ ex aspera arteria expui potest) si sit materia in vena arteriali, aut arteria venali, quæ so quomodo exhibere necessarium .n. est, vt transeat ad cor, inde ad hepar per venam cauam transmittatur. quinimo ea, quæ est in vena arteriali non potest rectè retrahi, quoniam eiusmodi ostia ibi sint, quæ regressum non concedant. Facilius tamè expurgatur ea, quæ est in venali arteria, tametsi eam quoque oportet per læuum cordis ventriculum ad iecur peruenire. Quare in illud incumbunt medici vt materiam, quæ sit in pectore, per sputum educant. De pinnulis verò pulmonis, non nihil paulo ante diximus, reliqua hoc loco tractabimus. dictum est autem pulmonem in quinque pinnulas esse distinctum, quarum quinta est tanquam substratum venæ cauæ, reliquarum vero binæ sunt in singulas partes. Cur vero ita distinctum natura fecerit pulmonem refertur à Galeno causa libro septimo de vsu part. cap. 10. cū inquit, hæ pinnæ primū vsu similem habent nris, quæ sunt in iecore, quæ admodū enim hoc pinnis, veluti digitis quibusdam ventrem comprehendit, ita & pulmo cor ipsum amplectitur. Præterea vt dilatetur, & comprimatur facilè, & tuto, hoc modo in quinque pinnulas distinctum est. pars autem pulmonis, quæ in dorsum declinat, lōgior est, quàm ea, quæ anterius est: hoc autè accidit propter diaphragma, quod descendit
versus

versus dorsum. Quoniam autem dictum est venalem arteriam, vnam tantum habere tunicam, vt facilius motui pulmonis pareat, Quæri solet à corde ne, an pulmone hæc arteria moueatur. Nã sexto libro De vsu part. cap. 10 velle videtur eam sequi motum pulmonis. septimo vero cap. 9. motueri inquit vi cordis, cuius rei signũ illud est, quod si inspires in pulmone cadaueris, ipse quidẽ pulmo dilatabitur: non tamen ipsa arteria. Quare dicendum est eam sequi motum cordis, non pulmonis. Quod vero ex sexto libro, capit. 10. contra hanc sententiam afferebatur, non obstare dicimus, cum enim dicebatur hanc arteriam vnus esse tunicæ, vt obediat motui pulmonis, non est ita simpliciter intelligendum, quod ad motum pulmonis, ipsa quoque moueatur, sed quod spiritum à pulmone accipiat. Et si autem quandoque, cum vehementer aperiri pulmonem opus est, ipsa cedat pulmoni ne disrumpatur: tamen non est dicendum eam à corde non habere motum. Vnum hoc loco subadnotare libuit, quod in pleuritide vena eodem melius latere secatur, quam altero. Nam, cum venæ, quæ oriuntur ad nurrîedas costas, sint supra cor, cor autem ipsum maxima vi ingentem sanguinis quãtítatem attrahat: si vena secetur ab eodem latere, non erit timendum ne materia ad locum, vbi est abscessus, effluat, quoniam eas ad se cordeorsum trahit, cum ratione calidilacis, & proprietatis, tum ratione vacui. præterea cū astringitur cor ostia etiam illa clauduntur, nè materia, quam attraxit cor, ad locum affectum trahatur. At que vt concedamus corde astricto materiam

non

non attrahi, eam tamen prius in ostia claudit, ne exeat ad locum affectum, arque ideo nullum eius rei est periculum, cum præsertim in corde sunt duo illi ventriculi, aures, vena arterialis, arteria venalis, & aorta, per quas potest eas materias expellere, ne ad locum affectum veniant. Hæc de pulmone dicta sufficiant, si prius admouero, dissecto corpore vidisse me lapillos plurimos in pulmone genitos, inter quos aliquis erat, qui ad magnitudinẽ fasci accedebat. Pulmo aurem ipse pluribus in locis pleuræ alligabatur, quod rarum inuentu est.

De anatomia venarum guidez & duarum amygdalarum.

EXpedita anatomia pulmonis: oportet videre anatomiam tracheæ arteriæ, quæ est via ad pulmonem: sed vt eius anatomiam videas perfecte, oportet præmittere anatomiam quorundam, quæ cum ea colligantiam habent. Oportet igitur vt ex carnes collum siue gulam & videbis musculos longitudinales, supra quos notabis venas guidez ex utroque latere vnã, quid sit iuuamentum horum musculorum dixi iam in anatomia pectoris.

Illis eleuatis inuenies duas amigdalas ex utroque latere vnã, quæ sunt carnes glândosæ factæ ad formã & figurã duarum amygdalarum: quarum iuuamentum fuit: vt humiditate quã
gene

generant & cōgregāt humectēt tracheā, ne exiccetur propter motum. Secundum iuua-
mentum fuit vt replerent & æquarent loca
gulæ: quia gula propter epiglotum in par-
te superiori est valde tumida: & in parte in-
feriori propter stric̄turam tracheę est valde
gracilis. Amygdalę igitur illę polite sunt in-
fra epiglotum vt adęquent. Tertium iuua-
mentum est vt sint scutum venarum & arte-
riarum apoplecticarum, quę portant san-
guinem ad caput: & arteriæ portant spiritū,
qui postea in rete quod contexunt confla-
to sub cerebro fit animalis.

Et istę venę vocantur apoplecticę: quia
ex plenitudine earū frequēt sit apopletica.

Vocātur etiā venę somni: quia ex na-
turali oppillatione facta in rete iam dicto
causatur somnus.

Vocantur etiā profundę: quia sunt lo-
cata in profundo iuxta siue supra musculos
spondylium colli.

Et ut eius originē videas scinde furculā
& accipe truncum arterię ad horti ascendē-
tem, & venę ascendētis, & videbis quod
antequā egrediatur furculam ramificatur.
Primo in duos ramos, quorum vnus vadit
ad partem sinistram, & alter ad dextram: &
antequam

antequam ad subaxillam perueniant alter istorum vel ab alterutro descēdit vena per spondyles dorſi ad nutriēdum costas & partes superiores pectoris: postea penetrat per axillam quilibet prædictorum. & vadit ad domesticam brachii, & in cubito apparet, i. curuatura cubiti, & dicitur basilica, & est inferior.

Et ex his potes videre quomodo basilica habet continuitatem cum vena, quę nutrit partes pectoris superiores.

Etiam apparet quę est causa quare in pleurisi, qua dolor ascendit superius vsque ad furculā, competit phlebotomia basilicę: vt ponit Hippo. 2. regiminis acutorum. & Gal. ibidem.

Postea vero egreditur furculam, & rami ficatur in ramos: quorum duo obliquantur & vnus eorum vadit ad brachium dextrū, & alter ad sinistrum, & vadit ad siluestrem partem brachii, et apparet in curuatura brachii, & dicitur cephalica. & habet euacuare a capite, quia continuata est cum venis duabus directe procedentibus superius ad caput. Quę venę dicuntur appoplecticę siue somni; & ita arterię sicut dixi eodem modo procedunt. Ex quibus fit rete mirabile, vt dicitur

dicetur suo loco.

Postea iuxta istas arterias & venas apopleticas inuenies nervos duos magnos decedentes a cerebro a sexto pari neruorum: vnus a latere sinistro & alter a dextro: & ex vtroque ramificantur nerui reuersiui, qui sunt nerui vocis, quos uidebis suo loco. Residuum autem dextri cum œsophago pro maiori parte coniungitur, & in os stomachi ramificatur, & tendit usque ad fundum: licet aliqua pars eius infra furculam cum uenis & arteriis capsulæ cordis coniungatur: sed sinister pro maiori parte cum mēbris spiritalibus complicatur. Et quantum ad aliquod eius cum naturalibus mēbris coniungitur.

CVRTII.

Utilitates carnis glandulosæ, quas hoc loco affert Mundinus, referuntur etiam à Galeno, libro octauo de usu part. cap. 1. & septimo, cap. 17. quarum prior, cum dicitur factâ esse hanc carnem ad humectandam asperam arteriam, ne exsicceetur, & fiat uox rauca, habet dubitationem: nam si naturæ regmen instituit, quo canna pulmonis operiretur, quomodo poterit in eam humiditas hæc ex carnibus glandulosis penetrare? huic respondet Galenus ipse, Naturam quidem regmen illud instituisse, quod prohibeat ne cibus potus ue cannam pulmonis ingrediatur, non tamen ne ulla penitus humiditas ingrediatur, potest enim eodem modo ingredi, quo

f modo

modo contingit de medicamēto sumpto ad canna
 pulmonis humectandam: non enim ita exactè reg
 men illud clauditur, quin humiditatis aliquid pos
 sit ingredi. Altera utilitas est, quod firmant uenas
 & arterias ascendentes, replēt que quod vacuum
 est inter uenas. Eæ autem uenę sunt, quę à uena ca
 ua deriuantur: nam cum ea transit furculam diuidi
 tur in duas, & quælibet rursus in duas, quarum ra
 mus unus in profundum penetrat, diciturque bar
 baris guiden profunda, alter in superficie uersatur,
 uocaturque Guiden manifesta. Est autem Guiden
 uerbum Arabum: græci σφρυγίδαις, nos uerò iu
 gulares uenas nominamus, quoniam propè iugu
 lum sunt. Nonnullis etiam dicuntur uenæ apople
 ticæ, & uenę somni, quòd ex earum obstructione
 oriatur & somnus, & apoplexia. hoc loco repre
 hendunt quidam Mundinum, quod nō dixerit per
 arterias fieri somnum, ijs enim obstructis nō pos
 sunt spiritus exire. Istud tamen sumpsisse uidetur
 Mundinus ex Aristot. tertio libro De hist. animal.
 cap. 3. cum inquit apprehēsis his uenis corrue re ho
 mines amissis sensibus, & palpebris compressis.
 Sed quoniam Arist. nihil de arterijs meminit, pos
 set adhuc aliquis dicere, quòd fieri nō potest, quin
 affecta uena, arteria etiam patiatur: ad eò propin
 quæ sunt. Ego uerò iam aliàs declarauī ex Ga
 leni sententia in libris de Hipper. & Platonis pla
 citis & in libro de usu pulsus, posse ligare arteriã
 illam, animal autem in apoplexiam non incidere.
 imo diem vnum sine vllò detrimento esse poterit.
 Sed mirum est quam leuiter decipiantur: nō. n. uī
 dent rectà ad eas arterias neruos uenire, ex qui
 bus

bus sunt nerui (reuerſiui dicuntur) qui dant vocem. iſti igitur cum arterijs ligabant etiam neruos, ex qua re animal ſine voce relinquebatur. itaque arterias eius rei cauſam eſſe, non neruos opinari, arterias apopleticas vocarunt.

Deinceps anatomiam exequitur veng cauæ: in qua illud prius adnoto, quod vbi legitur, Descendit vena per ſpondyles doſſi ad nutriendum octo coſtas, dicendum eſt quatuor coſtas, Omiſſis autem ijs, quæ dicit Mundinus, declarabo proceſſum venæ cauæ ex Galeni ſententia ſecundo de vitæ iſ ratione in morb. acut. com. 10. & libro de venar. & arter. ſectiõne, Cum vena caua egreditur icur duos vcluti furculos mittit ad diaphragma, quod cum tranſgreſſa eſt, mittit ramos ad media ſtinum, & cordis tunicam, cum ingreditur cordis dextrum ventriculum, vt dictum eſt. reliquum venæ aſcendit: nam antequam ramus ille cordis ventriculum ingrediatur diſtinguitur. paulum ſupra cor vena eſt quæ oritur ad nutriendas octo coſtas inferiores. poſt hanc autem, vena quædam magna ad iugulum uſque aſcendit, ab eaque ad axillas diſſeminantur venæ. Ramus verò qui eſt ſuperior, alios ramos habet, qui ad tempora, collum, colli ſpondyles, & coſtas ſuperiores nutriendas deſertur, qui poſtea cum egreditur, producit venam, quæ baſilica dicitur. Hiſ ita diſſeminatis vena magna thoracem egreditur, diuiditurque in duas partes, quarum vna ad dextram, altera ad ſiniſtram partem tendit, inde fit cephalica vena, quæ ergo ad axillam pergat eſt baſilica, cum verò exiit ſam thoracem fit cephalica. Cõſtat igitur, quòd ex vena caua, cum extra

furculam diuiditur, veniunt rami ad caput nutriendum, atque illi à capite euacuant. basilica verò loca pectoris magis euacuat. Quare, cū ægritudo est supra collum, secetur vena cephalica. si verò infra collum, basilica. si vtrobique, communem secare oportet. Ex hac re apparet pleuritidis dolore ascendente basilicam secandam esse, quoniam ea magis cum pectore communicatur. Est autem nō minima dubitatio, de vena ea, quæ ad nutriendas inferiores costas demittitur: nam Galen. quinto libro de loc. affect. cap. 3. Venā illam oriri inquit à dextra cordis aure: sed videmus nos eam oriri superius. in libro autem de venar. sectione, hanc inquit venam in simijs quidem esse paululum supra cor, sed magis in reliquis animalibus. At in secundo cōmentariorum in librum de victus ratione in morb. acutis. com. 10. dicebat venam hanc in quibusdam animalibus supra cor adnasci, in cæteris verò hominibus ex ea parte emergere, quæ cordis aurem vena caua tangit. Auicēn. dicebat eam oriri in directo cordis. Sciendum est quòd ramus hic propè cor, est strictior, atq; ideò parum à corde dilatatur: hinc Galeni dictum verum esse cognoscimus, quòd vena hæc parum supra dextram aurem cordis oritur. Sed quomodo in pleuritide veng sectio plus à loco affecto euacuat? Ex vena ascendente plures fiunt rami. è quibus profluit sanguis, qui abscessum generat, si igitur sanguis iste retrocedat, euacuanda est vena, à qua ñ rami oriuntur. melius igitur ab eodem latere expurgabitur: ita enim humores, qui ad nutriendas costas veniunt, diuertentur, quòd si ex opposito latere euacua-

te volueris, non ita diuerteris: quoniã plures ibi sunt venarum germinationes, sanguis ex vena magna succederet, non ex venis paruis, quæ costas in affecto latere nutriunt. Quare si eum sanguinem volumus diuertere, vena ex eodẽ latere est secanda, etenim qui dolorem aliquem vult auertere, auertat oportet materiam, ex qua dolor ille gignitur. Dicitum est autem de hac eadẽ re etiam superius. Quod vero inquit Mundinus, ita procedere arterias sicuti de venis dictum est, fallitur. nam cum arteria cor egreditur, eius vnus ramus ad sinistrum tendit, deinde ascendit alius ad caput. Præterea nõ diuiditur arteria, in eum ramum, qui p̄fundè procedit, aut in eum, qui in superficiem. Neque ab eodem principio, in ramos diuidũtur, quia venę, quę ad faciendam basilicam oriuntur, ab eodem ramo oriuntur, à quo oritur ramus apoplecticus. quod nõ itidem fit de arteria, nam eæ arteriæ, quæ ad caput tendunt, superius oriuntur, quàm quæ ad brachia. Hac in re notandum est quod inquit Galenus nono De vsu part. cap. 5. In omnibus, ait, partibus ita sunt propinquæ vena, & arteria, vt etiam se in ulcem attingant. In cerebro autem, quoniam melius erat ex diuersis regionibus, aut potius omnino contrarijs illas in ipsum cerebrum innasci & applicari, non ne mirabimur prouidentiam creatoris? Quippe, qui à corde per thoracem & totum collũ venas simul cum arterijs vsque ad ipsum caput simul cum eduxisset, inde arterias ad retiformẽ plexum, venas ad extremam capitis summitatem diduxit. Eandem habet ferè sententiã sextodecimo De vsu part. cap. 13. eũ inquit Inuenies venas quas

dam absque arterijs, arteriam verò nullam sine cōiuge, & compare sibi ipsi vena. Intelligendum est autem per coniugem arteriam non eam, quæ tangit, uel quæ ei per membranas copulatur: sed etiã quæ eiusdem utilitatis gratia facta est. Venæ vero, quæ sanguinem deferunt ad cerebrum, ascendunt ad summū vsque caput, deinde supernè sanguinem demittunt ad cerebrum. Arteriæ verò penetrant rectè per os cranei sursum: spiritus enim natura hoc habet vt ascendat, nutrimentum autem quod per uenas defertur, dū uenas egreditur, oportet vt descendat, quare natura instituit, vt ad caput ascendat inde ad cerebrum demittatur. Illud præterea est animaduertendum, ubicunque vena & arteria simul fuerint, venam arteriæ suprapositam esse, reperiri tamen (vt dictum est) potest vena sine arteria, vt in exterioribus brachij, & cruris partibus. quod factum est, inquit Galen. quoniam partes eæ exteriores minus turæ sunt, ad continendos spiritus.

De anatomia oris.

His membris excarnatis eleua similiter tracheam arteriam & isophagum: sed hoc non poteris nisi alia membra oris eleues. Incide ergo & eleua mandibulas inferiores a superioribus & hoc faciendo notes anatomiam oris.

Iam ipsius oris primo occurrunt labia inferiorius & superiorius: et huiusmodi labia sunt composita ex neruis, carne, & cute, pannicu

to, mira commixtione: ita q̄ cutis a carne neque caro a nervis potest separari: neq̄ panniculus ab eisdem. Et hoc fuit, quia labia debebant moueri versus omnem differētiam positionis scilicet sursum & deorsum, ante & retro, a dextris & a sinistris. Vel igitur oportuit q̄ haberent diuersos & plures musculos, quod est impossibile, propter grauedinem: uel oportuit q̄ carnem & nervos secundum omnem dimensionē haberent permixtos. Cooperiuntur etiam labia p̄niculo qui oritur a tunica intrinseca mery continuata cum tunica intrinseca stomachi, sicut & omnia membra oris. Ut sit sensus eius, cuius est stomachus: & propter hoc euenit q̄ in uomitu futuro tremit labium inferius.

Post labia sunt dentes numero, 32. duo duales inferiores, duo incisivi, duo canini, quatuor maxillares, & sex molares, & totidem superiores. Et dētes principaliter sunt facti propter contritionē & diuisionē cibi.

Secundario propter uocem & distinctionem loquelę, sicut & labia: & ideo carentes dentibus uel labiis non bene loquuntur.

Post dentes est lingua cuius anatomiam referua.

Post uide palatum habens concauitatem

in cacumine superiori, ut fiat intonatio uocis, & reuolutio agilis ipsius cibi quando dentibus conteritur.

In fine palati uidebis uueam pendentem ad modū grani uue: & ideo uocata est uuea in substantia existens rara, spongiosa: quia principaliter est facta ut superfluitatem descendētē a capite hora reumatismi recipiat: ne ad membra inferiora descendat: & propterea frequenter apostematur. Et propterea contingit q̄ habentes abscissam uuulam multum sunt catarrosi: & ideo prohibetur ab auctoribus ne incidatur. Sed si sit putrida, aut apostemata debet aduri. Est etiam alia causa: quia propter situm & substantiā eius quando inciditur raro cōsolidatur: sed sanies ibi aggregatur putrida, & semper sentitur fœtor oris: & ideo melius est ut cauterizetur ferro ignito. Modus autem est ut habeatur cannula ferrea uel lingua linita luto sapientiē, siue creta: ut ponit Auicē. 4. fen. primi cañ. cap. de cura per cauteriū & aperto ore & interposito inter maxillas ligno rotūdo in una extremitate cauillę imponatur uuula postea ferrum ignitum per concauitatem cauillę intromittatur: & attingatur uuula & cauterizetur. Est etiā formata ut uo-

eem moduset in frangendo aërem qui est materia vocis.

Sed iuuamentum eius etiam est, vt aër, qui ad pulmonem vadit, et attrahitur per nares & os reprecutionem aliquantulum in ore retineatur: & ne frigidus, sed alteratus perueniat ad pulmonem.

Post vuulam vero sunt fauces, & sunt loca ampla glandosa, apta suscipere superfluitates. Et ideo frequenter apostematur: & apostema eorum licet extra non emineat, eminent tamen intus. Et ideo si os aperiatur, & in profundo aspiciatur, apparet tumor: & ideo fit ibi squinantia in secunda specie, & vocat vulgares Bononienses gotium, & in fine siue termino eorum existit principium cannae, & mery.

Et ibi videbis membrum vnum cartilagineosum cum magna sapientia a natura fabricatum, quod vocatur coopertorium: quia hora transglutionis cibi claudit foramen epiglottis, ad hoc vt aliquid cibi vel potus non descendat ad pulmonem, qui possit esse causa suffocationis. Et ideo euenit, quod si aliquis ridendo transglutiat, quod tunc vadit aliquid ad pulmonem, quia hora risus stat epiglottis aperta, & tunc videtur suffocari.

In oris dissectione primùm labia sunt consideranda, in quibus muscoli cum cute sunt mirum in modum permixti. cuius causam reddens Galenus vñ decimo libro De vsu part. cap. 15. inquit, labiorum substantia sola talis facta est, vt eam vocare vel musculum pro cute, vel musculosam cutim liceat: nam & moueri secundum electionem debebat, & multò alijs musculis fieri durior. Quare ex cute & muscula ipsam temperauit, & commiscuit. Quatuor autem sunt musculorum ad labia peruenientium principia, euidencia quidem & manifesta antequàm permisceantur cuti: concreta verò ei, omnifariam obscura sunt & inseparabilia ab illius natura, cuius rei causa est, vt omnib⁹ modis moueri possint. Labia verò inquit Mundinus operiri, à pellicula quadam, quæ ortum habet è stomacho, vt partes oris eiusdem sint sensus, cuius est stomachus. Sed verum quidem est eandem pelliculam, quæ regit partes oris, regere etiam stomachum, non tamen id ea de causa factum est, vt idem sit sensus oris & stomachi, quod vult Mundinus: vt illud fatear, eundem esse sensum stomacho & linguæ, eodem enim modo vtrunque sapores percipit. Ostendit deinceps dentium anatomen Mundinus: sed eos non satis diligenter recenset, inquit enim, Duo sunt duales inferiores, duo incisui, duo canini, quatuor maxillares, & sex molares. Galenus vero vñ decimo libro De vsu part. cap. 8. & 9. Tres inquit esse dentium vsus. s. vt incidat, vt frangat, vt molant: atq; ita tribus nominibus dentes appellantur, nam qui secant *τομεις* hoc sectores dicuntur, qui vero frangunt, fractores, vel à similitudine dentium canis, *κυνειδοιτες* id est

Ide ſt canini dentes. reliquos γομφίους, aut μύλους, hoc
 eſt maxillares, aut molares vocant: hi autem idcō
 ſunt duri, vt non conterant ipſi admodum ſe mu-
 tuō: aſperi autem & lati: vt conterere poſſint.
 Quōd ſi natura permutaſſet ordinem dentium, ac
 molares quidem anteriori in parte collocaſſet, nō
 vtrique poſſemus mandere, quoniam ex ore cibus
 egrederetur. reliqua verō animalia non tot habēt
 molares, quoniam non illa oportuit plurimū man-
 dendo laborare, qua etiam de cauſa factum eſt, vt
 os patentiſ, & apertum magis haberent. Dentes
 autem vt plurimum ſunt triginta duo: nonnunquā
 tamen, inquit Galenus, ſunt triginta ſolū, aut eti-
 am octo & viginti. An vero dentes ſentiant maxi-
 ma ſolet eſſe quæſtio. Nam ſi dentes oſſibus man-
 dibularum ſunt implantari, in quas radices mittūt,
 & quo maiores ſunt dentes plures eo habent radi-
 ces, ad quas nerui perueniunt, manifeſtum eſt ſiqui-
 dem neruos habeant, eos ſentire. Propterea Gale-
 decimoſexto De vſu part. cap. 2. In eſt, inquit, uen-
 tri, & hepatis, & inteſtinis vniuerſis, & viſceribus
 alterum genus neruorum ſcilicet molle, ficu & de-
 tibus oſſium ſolis, Quoniam nudi obijciuntur eis,
 quæ ipſis occuſant, & quoniam oportebat eos ſi-
 mul ſentire, & ſimul cum lingua diſcernere omnia
 guſtabilia, quomodo vniuerſæ aliæ oris partes.
 Idem quinto libro De comp. med. ſec. loc. capi. de
 dentium dolore, vult dentes ſentire. Eandem ha-
 bet ſentētiā Auic. ſeptima terrij. cap. 1. cū inquit.
 Dentes ſunt ex ſumma oſſium, quibus in eſt ſenſus,
 propter illud quod venit ad eos ex neruis è cere-
 bro procedentibus, Auenzoar autem dentes nullū
 peni-

penitus habere sensum contendit, Cum enim duo præcipuè sint argumenta, quibus probatur ex Galeno dentes sentire, tum quod dentes soli inter omnia ossa habent nervos, tum quod si ossa secentur, aut frangantur, nulla præter dentes sentiunt: ad primum respondet, quod si ossa non sentiunt, quoniã ad ea non deferri nervos credim⁹, quia eos non videmus: igitur non venient ad ea venę, aut arterię, quoniam neque eę videntur, quod si Galeno concedendum est venas, & arterias ad ossa venire, nõ video, quominus eadem ratione etiam nervi possint venire. Quod si igitur reliqua ossa nervos habent, neque tamen sentiunt, non valere rationem assero de dentibus, quod, cum nervos hãbeant, eos sentire necesse sit. Ad aliud argumentum respõdet Auenzoar, quod antequam ossa incidantur, secari prius panniculum necesse est, quo maximus movetur dolor: quoniam autem ita comparatum est ut maior dolor minorem obscuret, ideo ob ingentẽ pãniculi secti dolorem ossa sentire non videntur. Si uero os detectum incideretur, neque sentiret, id ea de causa fieret, quod sentiendi vis ob frigiditatem exoleuisset. His rationibus responderem ego de mente Gal. quod ad ossa terminantur venę, quibus de natura sanguinẽ p̄ insensibiles poros demittit. Sed nullos nervos ad ossa videmus pertingere. Quod vero dicit os abrasum si secetur non sentire ea de causa, quoniam sentiendi virtus exhalauerit, falsum esse dicimus, nam si perforetur os, nõ sentiet, attamen dici non potest sentiendi vim exhalasse. Quare, ne à Galeni sententia discedamus, Succedit deinde palatum, quod factum est, inquit

Mun-

Hipp! li
 Aphor.
 2.º pã
 65. aph.
 xlvj.

Mundinus, vt fiat vocis intonatio, & reuolutio agi-
 lis ipsius cibi quando dentibus teritur. Hoc latius
 declaratur à Galeno septimo De vsu part. capi. 5.
 Ponit deinde Mundinus partem oris quã ipse vuc-
 am, Celsus vuam vocat, cuius duos vsus ex Gal.
 alium ex seipso affert, falso nimirum. Galenus igitur
 vndecimo De vsu part. cap. 11. γαργαρέωv, in-
 quit, hoc est gurgulio, ad magnitudinẽ, & pulchri-
 tudinem vocis confert: & vt incidatur ab eo prius
 aër ingrediens, & frangatur vehementia impetus
 eius, & propter hoc etiam frigiditatis. Quidam. n.
 quibus gurgulio vsque ab basim resectus erat, nõ
 solum in vocem læsi fuerunt manifestè sed etiam
 frigidiorẽ senserunt inspirationem. Quinetiam,
 refrigeratis partibus ñs, quæ sunt secundum thora-
 cem & pulmonem, multi talium periere: quare nõ
 temere abscindendus est. Est præterea alia vtilitas,
 quæ à Mundino prætermittitur, nequid scilicet vel
 pulueris, vel cineris, vel huiusmodi quippiam ali-
 ud ad arteriam perueniat, Vucæ, inquit Mundin⁹,
 principaliter facta est, vt superfluitatẽ à capite de-
 scendentẽ recipiat. Sed quærerem ego à Mundino
 quomodo velit, cum sit parvæ quantitatis, tot su-
 perfluitates eam recipere. Præterea non est ita con-
 caua vt possit eas excipere: duabus enim, tribusue
 guttis expleta foret. Post Vuam sunt fauces, loca,
 vt ait Mundinus, ampla, & glandulosa. Quarum
 vsus referuntur ab Auic. nona tertij. cap. 1. Sunt eti-
 am ea loca in quibus, præstigiatores acus reponunt,
 vt eas deinde euomere videantur. In his autem car-
 nibus glandulosis abscessus fieri certum est, attamẽ
 quando in eis tumor apparet, non admodum peri-
 culo-

culosum est. Quod vero de tumore eo, quem vulgares ait appellare gortium, refert, falsum est, siquidem in glandulosis carnibus, quæ collum æquant oritur. cum vero fit in ijs carnibus tumor, dicitur tunc vulgo scrophula. In fine faucium inquit Mundinus, est aspera arteria, atque in huius extremitate est corp⁹ cartilagosum, quod epiglottis nominatur. Sed Galenus corpus illud *λελειγγα* nominat, tegmē uero eius *επιγλωττίδα*: nam in principio laringis est quoddam corpus, quod prohibet ne cibus, aut potus ingrediatur. & hoc ita alligatur, ut cannam pulmonis claudat, ne quippiam ingrediat, cumq; anhelamus aër itque redireq; per eā viā, tūc enim aperitur tegmen illud. Qui de hac re scripserunt, ut Zirbus, & Carpus dicunt epiglottida illud esse, quod Galen. linguam fistulæ vocat, decepti nempe ex vocabulis. quemadmodum etiam decepti sunt, Galeni veteres interpretes, qui in inscriptione cap. tertij decimi, ex libro septimo De vsu part. dixerunt tractari ibi de epiglottide, cum tamen de glottide verba faciat, nam de epiglottide tractat sextodecimo cap. eiusdem libri, fierique minimè possit, ut quod Galen. tertio decimo capite attribuit glottidi conueniat epiglottidi: epiglottis enim tegmen est (quod vocabuli etymologia declarat) sub quo est glottis, cum igitur idem esse crediderint & glottida, & epiglottida, nō est quod miretur quispiā si membrū illud ignorarunt, quod Gale. linguā fistulæ nominat. atq; hoc ex illis membris est, quæ ostendere sum pollicitus.

De anatomia mery & tracheæ arteriæ.

His

His expeditis eleua, vt agilius & leuius videas anatomiam residuorum mery cum trachea: & his eleuatis nota primo substantiã eorũ: nã substantia mery est pellicularis, & mollis: substantia tracheæ est pellicularis, & cartilaginosa: & causa fuit, quia mery est via cibi, qui interdum deglutitur in magna quantitate, propter quod oportet viam eius interdum dilatari: sed trachea est via aëris penetrantis ad pulmonem, qui cū lenis sit, & non solidus, per viam penetrat, quæ stat aperta. Via autem pellicularis propter mollicitiem non stat aperta: sed paries vnus cadit supra alterum.

Non fuit hæc canna ossuosa: quia debet esse flexibilis, propter formationem vocis. Item impediret transitum cibi multũ, & solidi per mery. Et propter hæc causam nõ fuit tota cartilago vna, sed fuit plures cartilagine continuatae per pelliculas simul, & isti sunt circuli quidam: non tamen cõpleti sed in figura. C.

Residuum autem cartilaginis continuat substantia pellicularis in directo mery: & hoc fuit, ne substantia dura & cartilaginosa cõprimat mery, & impediatur transitum cibi. Et ideo scire debes, quod a parte anteriori

ri canna est cartilaginosa, quia versus partē illam non contingit mery. Item tuetur tūc magis a nociuis: sed versus partem posteriorem est pellicularis: & hoc vsq; ad epiglottim, quæ tota est cartilaginosa, propter causam, quæ dicetur. Et sic apparet substantia cannae.

Sed substantia mery est composita ex duplici panniculo, siue tunica intrinseca, quæ villos longitudinales ad attrahendum habet: & extrinseca, quæ villos habet latitudinales aptos ad expellendum illud, quod attrahitur ab intrinseca: verum est quod prima principalior est secunda in virtute.

Et ex his patet iuuamentū horum & numerus partium eius, præter partes trachee, quæ partem quandam principalem habent quæ dicitur epiglottis cuius anatomiam postea ponam.

Tertio vides differentiam ex parte quantitatis: nam mery est longius & maius canna, quia tendit vsq; ad diaphragma: & infra ipsum continuatur cum ore stomachi: sed canna pulmonis non descendit nisi vsq; ad furculam. Et causa patet, quia pulmo statim est sub furcula, sed os stomachi est immediate sub diaphragmate.

Differunt quarto in situ siue loco: nā mery est positū magis in profundo, versus spondyles colli & dorsi: sed trachea arteria magis est posita anterior, & causa fuit triplex.

Vna fuit quia cum trachea sit magis dura, cartilaginosa, & mery panniculosum potest magis tueri canna ab extrinsecis alterantibus, quam mery: ideo cannamagis fuit posita exterius.

Secunda causa fuit, quia per tracheam atrahitur aër, cuius continuus debet esse ingressus: & ideo ipse debuit habere situm directum ad os, & sic habet: ideo posita est anterior, sicut os.

Tertia causa fuit: quia si mery fuisset positum anterior versus gulam, vel oportuisset quod post finem tracheæ mery obliquasset versus dorsum: vel quod a fine cænæ usque ad principium oris stomachi fuisset vacuitas, sed utrunque est incōueniens: nam secundum est impossibile: primū autem pareret nocumentum & impedimentū in actu transglutiēdi.

His visis eleua mery incipiendo a parte inferiori cum sollicitudine ne tangas aliquē neruum reuersiuum: verum est quod faciliter separatur a trachea, usque ad epiglotū: ibi vero difficulter, Propterea quia tunica mery

disperfa est in epigloto: & ideo ab eo non facile separatur: & hoc fecit natura sagaciter ad hoc, vt in hora transglutionis, cum mery eleuatur ad os ad attrahendum cibum: epiglottis etiã eleuetur, ne sui duricie & soliditate impediatur transitum cibi.

Et ista continuatio non fuit necessaria in tota trachea quia ipsa secundum totum epiglotum non est cartilaginosa: & ex hac anatomia manifestatur sententia Gale. in libro de motibus liquidis. cap. 10. q̄ epiglottis hora transglutionis non mouetur sursum, quia aliquo modo moueatur ex se, sed quia trahitur ab isophago propter continuationem dictam. Et hæc sufficiant de anatomia isophagi mery, & cannae pulmonis.

C V R T I I.

Corpus asperæ arteriæ constat, inquit Mundinus, è substantia molli, & cartilaginosa. cuius cam hanc affert, Trachea, inquit, est via aëris penetrans ad pulmonem: qui cum sit leuis non solidus, per viam penetrat quæ stat aperta. Verum hæc ratio falsa est, quoniam aër etiã per arterias alias transit, quæ tamen non sunt aperte, nec cartilaginosæ. Galenus igitur septimo libro De vsu part. capi. 3. & 4. inquit fuisse cartilaginosam, vt aër reflectatur à re nec dura, nec molli omnino, fuit autē etiã pelliculosa, cartilaginem que eam non exquisitos natura fecit circulos, Sed deest cuique parum ali-

quid

quid, quo in loco autem deficit cartilago ibi præ-
 stò est pellicula, quod factum est, quoniam pars
 ea pelliculosa magis apta est, vt dilatetur, cum sit
 opus. Vniuersa verò huius utilitas in vocis forma-
 tionem referenda est. Quoniam verò contingit di-
 uersas voces formare, ideò eam oportuit & laxari,
 & astringi. Cur autem, aspera arteria partē car-
 tilaginosam habeat extrinsecus, causam affert
 Mundinus duplicem, ex Galeno sumptam. De situ
 gulæ, & quare hæc quidem in posteriori parte lo-
 cata fuerit, aspera autem arteria in anteriori, pluri-
 mas affert Mundinus rationes, ac œsophagum qui-
 dem in posteriori parte esse inquit Galenus sexto
 De usu part. cap. 5. ne impediatur pectoris dilata-
 tio, nam si exterius magis positum fuisset, dehuisset-
 que cibus per pectus transire nimis longam morã
 traxisset. recte igitur propè dorsum positum fuit.
 Quod verò inquit Mundinus asperam arteriam
 esse exterius magis ut aër possit trahi propè os, fal-
 sum est. declaratum enim est naturam fecisse viam
 per nares flexuosam vt per eam aër solus ingrede-
 retur. Illa quoque ratio falsa est, cum inquit si me-
 ri fuisset positum anterius vel oportuisset, quòd
 versus finem trachæ meri obliquasset versus dor-
 sum vel quòd à fine cannæ, vsque ad principium
 oris stomachi fuisset va cuitas, sed hoc, inquit, im-
 possibile est: illud si fieret, tunc impediret deglutio-
 nem. Galenus enim sexto De usu part. cap. 5. œso-
 phagum, inquit, vsque ad quartum spondylum re-
 ctè descendere: deinde declinare ad dextram, vsque
 ad diaphragma: tum arteriam transcendere, iungi-
 que in parte sinistra cum ore stomachi. quod vero

ita flectatur, ea affertur ratio, quòd descendunt nerui ad os stomachi sensum pro famè præbentes. Quoniam autem nerui cum sint subtiles, & rectè ducantur possent facilimè dirumpi ideò ut sint tutiores, natura voluit œsophagū tortuosè præcedere. Diximus igitur asperam arteriam cartilaginibus constare, quæ non omnino circularem figurā seruent sed sint ad similitudinem C literæ latinæ, aut *Κίγμα* græcæ, huncque modum non in collo tantum, sed etiam in pulmone conspici. Fuere autem quidam, qui contra meam sententiam, & Galeni ipsius (sichs placet) cõtenderent eas cartilagineas in pulmone perfectè rotundas esse. Ego verò nūquã id vidi, Galenum quidem testem habeo, cuius hæc sunt verba septimo De usu part. cap. 3. Vbi verò primùm prætergressa est clauis, in thoracis capacitate peruenit, inibi que diuiditur, & in omnem pulmonis partem fertur cum vasis quæ sunt à corde ad omnes lobos eius distribuata. Non tamen desistit à natura, quam parte superna obtinet, neque permutatur aliquo, aut variat vlla germinationū ac ramorum eius, sed similiter omnes cartilagineas multæ *Κίγμοιδῆς* membra nostris ligationibus cõtenta vsque ad extremos lobos visceris custodiuntur. Equidem nescio quid clarius aut apertius dici poterit. Id verò cerni oculis ipsis potest, illam etiam partem quæ sit in pulmone cartilagineas habere *Κίγμοιδῆς*, & si non ita perfectè. Qui igitur hæc neglexerunt, decebat eos dubitare potius, quàm asserere, ne in dubium poneretur, ignari ne rerū magis essent, an magis improbi, neque enim hæc palam dixisse illis satis fuerat, nisi epistolas etiam Veneri

as misissent, quòd plurima dixerim, quæ re ipsa aliter se haberent, quorum tria præcipuè mihi obijcebantur. Primum quòd dixerim partem eam, quæ vulua dicitur esse præputium. Alterum, quòd negauerim in pericardia tunica aquam contineri. Tertium de cordis pinguedine. Ego verò hoc semper mihi propositum habui, nihil ut dicerem, quod aut ipsis oculis non uidissem, aut à Galeno didicissem. Et si autem de his satis iam dictum superius sit, & si qua addantur, aut repetantur, superflua videri possint, malui tamen singula quæque obiecta diluendo, ostendere eos non malignitate solum, verum etiã ignorantia laborare: quàm si ea silentio præterissem, animum illorum ad spem impune maledicendi nutrire. Igitur quod ad primum attinet, mirum est in quantis tenebris versentur, cum voces etiã ignorant. siquidem Vulua (ut Theodoro placuit) significat vel uterum, vel matricem, aut etiam totum ventrem mulieris, diciturque ideò vulua, quod foetum inuoluat. Alij vuluam intelligunt pro extrema pudendi parte, in qua curicula quædam est. Qui igitur opinione ducuntur, inquirunt Carunculas paruas esse præputium, quod vero intrus est, vuluam, Improprè vero Vulua, & caruncule dicuntur præputium: adducunt que huius opinionis auctore nescio quem chirurgum. Ego vero declaravi, membra, quæ sint viris, esse etiam foeminis. In viris igitur pellicula ea, quæ βάλανον id est glandem, obtegat præputium dicitur. In foeminis eadem pellicula ea præputium nominatur: ipsisque data est & ad claudendum, & ad ornatum: viris autem ad ornatum, atque ut eadem membra sint viris,

quæ etiam foeminis, ex Galeno in decimo quinto libro De usu part. cap. 3. Manifestum est igitur ex Galeni sententia compari has partes, tãquam quæ mutuo proportionè respondeant. Quod autem ea runcula ea, quæ est in fine colli matricis, præputiũ non debeat appellari ex Galeni verbis eodem in loco manifestè apparet, cum eam $\nu\mu\phi\kappa\mu$ nominat (nympham vertit Theodorus) Quale, inquit Galenus, propugnaculum & munimentum $\phi\acute{\alpha}\epsilon\nu\gamma\gamma\omicron\varsigma$ est $\gamma\chi\epsilon\gamma\chi\epsilon\omega\mu$, tale matricum id, quod vocatur $\nu\mu\phi$: regens simul, & refrigerari prohibens id orificium colli, quod peruenit ad earum muliebri pudendum. Curim vero eam, quæ est in fine pudè di muliebris, conformari inquit cum præputio virili quare ea quoque præputium dicitur. Vulua vero propriè matrix est. Omnino autem tota hæc questio est de vi ac proprietate vocabuli, cuiusmodi quæstiones penitus vitandas esse iubet passim Galenus: eam tamen hoc loco tractare libuit, quod eandem respiscant, atque aut meliora ipsi afferant, aut melioribus pareant. Nunc alteram accusationis, partem, vel alterum potius malignitatis & iniqui animi signum pertractemus. Dixi in pericardio tunica non esse aquam, attulique duas potissimum rationes, Tũ quod Galenus hanc non posuit, Tum quod nullius est utilitatis. Nunc autè quero, vndenam hæc aqua generetur? Nam ex vrina generari non potest. Num igitur ex humore, aut vapore? Sed ex humoribus generari non potest, quoniam humores ipsi in hepate generantur. Quod vero ex vaporibus ibi consistere non possit aqua, cũ multis rationibus, tum uero hæc præcipuè probatur

Si natura ad humectandam epiglotidem instituit glandulosas carnes, non autem aquam, quoniã ea facile resolveretur in fumum, Cum maior in corde sit caliditas, patietur ne cor ibi aquã cõsistere. Ego vero non nego quominus mortuo animali esse non possit hæc aqua; Sed eo existente in naturali dispositione, fieri non posse inquam, vt hæc aqua inibi sit. nam si esset illa potius in vapores ob maximum calorem resolveretur: tantum a best, vt vapores eo in loco in aquam cõverti possint. Hoc uero per anatomen conspici nequit, quoniam cum primum perierit animal resoluuntur statim vapores in aquam. Quare non est hac in re fidendũ sensui. Neque veritabile sit Galen. huius aquæ vsum omissurum fuisse, si vsquam reperiretur. Quod uero mihi de Pinguedine obijciebatur, est Galeni dictum primo libro de Temperamentis, cap. vltimo; cum inquit Pinguedinem, quoniam à frigido generetur, non esse in corde. Ego igitur dicebam circa cor, id est circa totum cor non esse pinguedinem; Sed ibi esse vbi multæ sint pelliculæ. Quoniam uero in vno cadauere inuenta sit pinguedo penè circa totum cor, præcipuè in cuspide, me falsa docere clamitam. Ea autem dixi vt Galenum defendere, sit enim verisimile in inferiori parte non esse pinguedinem. Quod si in eo cadauere inuenta est, ea ratio afferri potest, quod ibi multa erant ligamenta, (erat. n. admodũ in illo corpõ cor ppe pectus) quæ refrigerant. Neque vero is ego sum qui proferre audeã Galenum male dicere. Sed iam nebulones istos omittamus, & nostrum institutum prosequamur. Inquit Mundinus, quod œsophagus, &

aspera arteria, quo in loco iuncta sunt, facile separari possunt vsque ad epiglottidem. Dictū est autem, quod vbi est œsophagus, aspera arteria nō est tota cartilaginosa vt cibus possit transire, In Epiglottide autem trachea tota est cartilaginosa, Sed dicit quispiam, quomodo potest cibus transmitti, cum Epiglottis non possit cedere œsophago? Sciēdum naturam prouidā instituisse vt in deglutendo cibo pars cartilaginosa sursum ascendat, neque impediat. Sed dubium rursus est, quid proficit illam attolli, si pars ea cartilaginosa premit œsophagum atque ambo eleuentur ad cibum sumendum. Dicunt quidam, quod attolluntur in loco lateri, & propterea fieri posse, vt cibus non impediatur. Sed aliter dicit Galenus septimo libro De vsu part. ca. 18. Tunica enim œsophagi est intra cānam pulmonis, & cum œsophagus descendit epiglottis ascendit, permutaturque eorum positio, quemadmodū cum duo vasa vnus chordæ capitibus appensa in puteum alternatim demittuntur, tunc enim vno demisso alterum ascēdit. eodem modo cum œsophagus demittitur larynx sursum trahitur: ne vnum sic recta è regione, alterius. Verūm vt hæc commodiùs cognoscerentur viuū animalis anatomiam instituire oporteret. Illud vero animaduertendum etiam est, intra asperam arteriam quandam pelliculam, quæ, vt inquit Gale. septimo libro De vsu part. ca. 7. est subtilis, densa, & moderatè sicca. Subtilis quidem, ne multum loci occupet. Densa, vt excludat à subiectis cartilaginibus occursum humorum ad eas defluentium. Moderate autem sicca, quia pro voce non omnino siccam, aut humidam causat

esse oportet, hæc enim vocem impediunt, quemadmodum qui ex cholera febricitant, vox ipsa rauca est. An vero ad motum Epiglottidis conueniant musculi, est questio. Galenus libro de motibus manifestis vult quod moueatur non ex musculis solis, sed etiam ex motu oesophagi. omitto autem hoc loco, quæ possent contra hanc sententiam afferri, quoniam longa nimis foret hæc disputatio.

De anatomia epiglottidis.

ELeuato mery, videbis extremitatem cænx pulmonis grossam & solidam, quæ nominatur epiglottis.

Et hæc epiglottis est composita ex quadruplici substantia scilicet pelliculari, qua velatur propter causam dictam: & ex musculis, & neruis, & cartilaginibus.

Musculi, vt dicit Gal. 8. de iuuamentis ca. 2. sunt. 20. scilicet. 12. inter cartilagines eius, & octo inter epiglottim & membra circumiacentia: non tamē perfecte omnes possunt discerni. Nervos autem inuenies ascendentes, ab vnoquoque latere tracheæ arteriæ vnum, & isti sunt rami orti a neruis descendentibus supra dictis. & oriuntur ab eis iuxta cor, & superius reuertunt. Et ideo isti vocati sunt nerui reuersiui, siue nerui vocis: quia proprie sunt principium motus vocis.

Et causa quare hi nerui reuersiui fuerunt

tarij motus, dependet etiam a corde tanquã ab eo in quo formatur conceptus: & ideo cum sit operatio communis cerebri, & cordis: nerui qui sunt instrumenta vocis debent communicare cordi & cerebro: et ideo cum ortum habeant a cerebro, transitum debuerunt habere iuxta cor.

Quarta causa fuit: quia nerui ad musculos debent peruenire iuxta principium eorum & non finem. Principium autem musculorum epiglottis est versus partem inferiorem: quare nerui ad eos venientes ab inferiori parte ad eos debent peruenire: quare fuerunt reuersiui & isti nerui, licet manifeste appareant tantum duo: tamen multiplicantur postea, secundum multiplicationem musculorum.

Et ex his potes videre quomodo ex incisione istorum neruorum potest accidere lesio & amissio vocis. Item quod quando inciduntur nerui descendentes simul amittitur vox, & flamen cum ictu, quando inciduntur soli reuersiui amittitur tantum vox, & alia operationes non impediuntur.

Post neruorum anatomiam eleua nervos & musculos & conspice tres cartilagineas.

Prima anterior maior est omnibus aliis

alis appellata siue scutalis, ad similitudinem scuti siue clipei. Itē posita ad exterius, quia ad defendendum vt clipeus.

Secunda vero est ad complēdum totum quod deficit ex prima: & hæc vocatur nomen nō habens: & causa quare fuit facta epiglottis cōplete cartilaginosa, est vt sit magis sonora: et ad ipsam fiat melior refraçtio: & non impediatur cum hoc transglutionem: quia eleuatur hora transglutiendi ad superiora cū mery, propter causam supra dictā.

Tertia est, quæ existit in medio, & uocatur cimbalaris. In medio autem eius est lingua fistulæ, dicta fistula, ad similitudinem fistulæ artificialis. Et ista sic nominata est ad similitudinem fistulæ naturalis: & est conuenientius dictum lingua fistula, vel fistula quam cimbalaris.

C V R T I I.

Corpus id, quod larinx dicitur, constat pellicula, musculis, & neruis. primū autē de neruis agamus: Hos natura non eo modo, quo alios, instituit, descendunt enim vsque ad aortam, eorumque ramus vnus venit ad dextram vsque partem, deinde in ramos diuiditur sursum tendentes. In alijs autem locis fecit natura neruos omnes rectā ad musculos tendentes. Hinc ducit Galenus argumentū, ad probandum non oriri neruos ex corde, quoniā si ex corde oriretur, potuisset eos natura ad musculos

los epiglottidis sine reflexione transmittere. Quo-
 niam verò nerui omnes (vt inquit Galen. sextode-
 cimo libro de vsu part. cap. 2.) vtrasque has virtu-
 tes habēt, sensum scilicet, & motum molles magis
 ad sentiendum apti sunt, duriores verò ad mouen-
 dum. Quare consensaneum fuit hos neruos durio-
 res esse pro mouēdis musculis. vt autē exiccarentur
 magis, voluit natura, vt isto modo procederent.
 Quod autem inquit Mundinus, ad cor vsque trās-
 missos esse, vt magis exiccarentur, non est de Gal.
 mente. Sane Galenus septimo De vsu part. cap. 15.
 inquit, quòd si debuerunt nerui isti descendere, &
 rursus ascendere, oportuit eos circa aliquid in vo-
 luit: Sed venis, quoniā eæ directè aut obliquè ascē-
 dunt alligari non potuerunt, Quare arteriæ descē-
 denti alligati sunt: atque hoc in læua tantum par-
 te. nam dexter neruus nullā habens similem ascen-
 sionem in ea parte thoracis, per quam fertur, coar-
 ctus est inuolui circa eius partis arteriam, quæ obli-
 qua à corde ad dextram axillam effertur. In me-
 dio itaque omnium radicum locauit natura ipsum
 neruum, vt ab eis utrinque custodiatur, & per liga-
 menta membranosa ipsi arteriæ & adiacentibus
 corporibus copulauit, vt, quasi circumclusus & cir-
 cumscriptus ab eis, tutam faciat circum arteriam
 flexionem. Nō igitur demittitur iste neruus ad cor
 vt sicceatur, sed quia nullus alius conuenientior lo-
 cus erat, quo hoc modo alligaretur. Altera quoque
 Mundini ratio non magis est bona, quoniam cere-
 brum nihil penitus mouetur voluntario motu.
 Galenus autem libro septimo De vsu par. cap. 14.
 quandam similitudinem affert motus horum ner-
 uorum

tur infuslatio ea, quæ fit absq; sonitu, aut expiratio. Nunc ad cartilagineſ laringis veniamus, quarum Galenus ſeptimo libro De uſu part. cap. ii. ordinè declarat. conſtare enim laringem ait tribus magnis cartilaginibus; quæ neque figura, neque magnitudine ſimiles ſunt iſis, quæ ſunt ſecundùm aſperam arteriam. Quarum prior, & maxima, eſt anterior, quam & tangimus, foris quidem conuexa, intus autem concaua, ſcuto maximè ſimilis nõ exactè e rotundo, ſed prælongo, vnde etiã nomen accepit ſcutiformis dicta. Secunda verò cartilago (cui, quoniam nomen non habet, nomen inditum eſt, nomen non habens) quanto minor eſt prima, tanto maior eſt quàm tertia, internis partibus locata, quã ſtomachus deſicit. Tertia, quæ arytenoides dicitur, in medio cõiuncta eſt. Primo igitur eſt ea, quæ ſecunda eſt in ordine, quæ totam tangit cartilagineſ ſecundùm omnes partes, hoc eſt ante, retro, & ad latera. Paulo autem ſupra anteriores eius partes ſcutiformis incipit cartilago, abſcedente ſecunda retrorſum. Vbi autem minor, quæ intus eſt, deſinit, duæ quidem ſuperiacent paruæ cõuexitates; incipit autem inde tertia cartilago, conuenientes exactè iſis eminentiſ concauitates ſortita. In parte autem ſuperiori eſt lingula quædam, quæ meatum operit, cum comedimus. cum vero fit vomitus, tertia illa cartilago operit aſperam arteriam, ne vomitus ibi ingrediatur; lingula vero ea tunc non exactè e operit. Illud eſt aduertèdũ quod duæ illę priores cartilagineſ copulantur lateribus, membranofiſ ligamentiſ, Tertia vero fundatur in quibuſdam aliarum ſummitatibus, à quibus cõn-

pletur

plectitur. Quo autem modo epiglottis in cibarijs ad laryngis meatum decumbit, ita ab ijs, quæ euo muntur *αἰσθητικὸς* cartilago, ita .n. inquit Gale. septimo De vsu part. cap. 16. Subiūgit deinde linguam fistulæ Mundinus. sed quidnam ea sit non declarat, Zirbus idem dicit de lingua fistulæ, quod de ea parte quam coopertorium vocat. Idem etiā dicūt Carpus & Harculanus. Leonicensus nihil de hac materia tractauit. Omnino neminem inuenio, qui mihi exposuerit, quid sit, quod lingua fistulæ dicitur. Hoc igitur vnum ex ijs membris est, quæ à nemine animaduersa ostendere sum pollicitus. Vult ergo Galenus quod hæ cartilagines quandā concauitatem oblongam faciant, quæ fistula appellatur. in cuius medio sit corpus quoddam coarctans foramen illud, vt, quemadmodum in musico instrumento, paulatim quid ex amplo, ad strictum adducatur, ex stricto rursus amplificetur, atq; hoc modo transeat aër oportet ad formandam vocē, quod testatur Galenus septimo De vsu part. ca. 13. atque idcirco in eo foramine corpus quoddam institutum est ad proportionem linguæ fistulæ. Sunt qui dicant linguam hanc esse idem, quod nostrates coopertorium vocant (oportet enim opinor in re aliena vti alienis verbis) Sed operæpretiū me facturum existimaui si paucis ostendero, hoc non ita se habere. Primū enim Galenus cum linguā fistulæ esse in medio meatu, illud vero, quod coopertorium vocant, tegere ait, nōne hæc manifestè distinguit? Deinde substantia linguæ fistulæ membranosa existit mista pinguedine, qualis substantia nō alibi reperitur in toto corpore: illud vero substan-

stantiæ est cartilaginosa, vt inquit multis in locis Galenus, huiusmodi autem substantiam facile est alijs in partibus corporis inuenire. ergo non idem sunt. Quod etiam ex operatione colligitur, hæc. n. facit ad retentionem spiritus, vt quando aliquid enixè facere volumus, retinemus anhelitum. quod ab illo fieri nequit, quia non posset exactè operire. Præterea coopertorium illud non ita claudi potest, quin aliqua humiditas ingrediatur: ergo etiam aer egredi poterit, si sit sub eo & prematur: istud autem corpus internè extrorsum clauditur: Natura quoque orificia quædam fecit, per quæ aer ingreditur, adeo vt foramen illud obturetur, ac si lingua si fistulæ intumesceret, ac meatus stiparetur, tunc vero aer egredi non posset. atque ita sic de lingua fistulæ, vt quo magis impellatur aer, eò magis intumescat lingua fistulæ, magis que meatus obstipetur. quod isti cum suo coopertorio efficere non poterunt, hoc enim non est vbiq; annexum, quo retinere spiritum possit. illud vero de lingua fistulæ ita natura instituit, vt, cum aliquid maximo conatu facere oporteat, retineatur anhelitus, quia musculi pectoris non sufficerent ad retinendum anhelitum, magna vi impulsus. Iam verò si coopertorium illud exactè claudi posset adeò vt aer non exiret, superfluum opinor fuisset aliquid aliud addere, quod in vomitu operiret, qualis est tertia cartilago, de qua paulò ante meminimus, hoc verò operit cum premitur à cibo. Constat ergo quòd hoc coopertorium non est instrumentum illud, necque ad ipsum veniunt musculi, à quibus moueatur. Atque vt rem magis aperte proferam, quod barbari isti

coopertoriū vocāt Gal. dicitur ἐπιγλωττίς, linguā
 verò fistulæ γλωττίδα appellat. si quispiā autē di-
 xerit Gal. primo libro De locis affect. cap. i. dicere,
 si quis expuat mēbranā crassam, pingue, signū esse
 egritudinis partis eius, quæ epiglottis dicitur, quæ
 fistula est in interiori gutturis parte. Respōdere q̄
 error interpretis mihi, Galēo, veritatisq; ipsi fraudi
 esse nō debet, legendum est .n. eo in loco glottis
 nō epiglottis. Demū Gal. vult hanc linguā fistulæ
 generare humiditatē pingue, qua humectatur: q̄
 epiglottidi nō potest attribui. Neque vero in sub-
 stātia, figura, aut situ cōueniūt. Ex his manifestū
 esse cēseo quòd nō idē sit lingua fistulæ et illud, q̄
 coopertoriū vocāt, pariter etiā vtrorūque vsus.
 Quoniam verò dicebamus laryngen constare tri-
 bus cartilaginibus. Quæritur cur ita tres factę sint
 cartilagines. Respondet Galen. septimo De vsu
 part. cap. 12. his verbis. Consequēs autē fuerit nos
 dicere vtilitatem vniuscuiusque cartilaginis: non
 enim præter rationem eas natura fecit tot & tales.
 Sed quoniam duplices genere oportebat esse in
 eis articulationes, & motus, alias quidem, quę dila-
 tant & comprimunt eas cartilagines alias autem,
 quæ ipsas claudunt & aperiunt: ad primas quidem
 primæ ad secundam facta est articulatio: ad secun-
 das secundæ ad tertiam. alio præterea tertio motu
 secundum genus nō egebat: quare neq; articulatio
 ne tertia: propterea nec cartilagine quarta. Nunc
 de musculis videndum est, hos Mundinus viginti
 esse dicebat: duodecim quidem, harū cartilaginū
 sunt proprii, octo vero in partibus adiacentibus.
 Horum positio & vtilitas hæc est. Primo enim
 duo

duo sunt, qui anteriores partes copulant, & claudunt magnam laryngis cartilaginem: Qui verò consequenter, duo sunt, eas quæ per profundum. Aliorū verò quatuor quidem aperiunt & claudunt cartilaginem, duo verò claudunt. Quibus adiutores duo musculi transuersi in pluribus animalibus sibi inuicem vniti basim stringunt tertiæ cartilaginis. Hi omnes musculi in larynge continentur, nulli adiacentium organorum copulari. Alij verò octo musculi colligantes ipsam corporibus, quæ sunt in circuitu, alterius motus sunt duces: per quæ totus spiritalis meatus amplificatur & contrahitur. Atque hæc relata sunt ex Gale. 7. libro De vsu part. cap. 12. patitur autē ægritudine, ac præcipuè eam, quæ nostratibus dicitur squinantia, latinis autem angina: ob quam apparet nonnunquã tumor, qui difficultatem gignit anhelitus. aliquando est quidem tumor in musculis adiacentibus, apparet autem extra. aliàs euenit abscessus in musculis cartilaginum, tunc vero neque intus neque exterius apparet tumor, atque malus est abscessus, est enim de suffocatione periculum. quod non est, cum sit abscessus in musculis adiacentibus.

De anatomia linguæ.

EXpeditis his, quæ circa pulmonem, & cænam eius, & epiglottim: remanet lingua, quæ fabricata est in ossè factò ad figuram litteræ laudæ. Habuit enim in suo fundamentò os: vt ab eo sustentetur, & etiam quia diuersis & variis motibus debet moueri, vt ei inni-

tatur, & eidem affigatur: quia omnis motus localis debet esse ad aliquod fixum. Et hæc est causa, quare os istud fuit figuræ laudæ: quia si fuisset totum vnum oblongum, aut processisset recte deorsum, & tunc penetrasset epiglottim, vel mery, vel stetitisset a latere vno: tunc lingua nõ existeret directæ: sed ad idem latus plicata.

Scinde igitur linguam per medium, & videbis magnas, & plures arterias ad eam venientes, vt magnificetur: videbis etiam duo paria neruorum motiuorũ: vt faciliter moueatur, qui magis profundantur in profundo, & in radice linguæ, & sensitiuorum, qui in superficie & panniculo eius expanduntur ad dandum sensum, gustus, & tactus: & sic iam peruenisti ad anatomiam vnus motiuus orti a cerebro & vnus sensitiuus.

CVRTII.

In explicanda linguæ anatomia occurrit primum os, quod à Galeno nominatur *βοτάνη*, quod ad similitudinem v literæ factum sit. quamuis dicat Mundinus factum esse ad figuram λ. Dicebat autē Galen. mirum esse de hoc, quòd, cum reliqua ossa iungantur alicui ossi, hoc solum ab omnibus ossibus sit separatum, huius vtilitates refert Galenus septimo De vsu part. cap. 19. Linguæ verò ipsius vtilitates omisit Mundinus, quæ à Galeno recensentur

ferunt octauo de usu partium, cap. 3. primùm enim confert ad discernendos sapes, deinde ad locutionem, quinimo proprium est locutionis instrumentum. adiuuat etiam comestionem, quoniã mouet seu conuoluit cibum. præterea ad deglutiendum. An vero integra sit & cõtinua, an diuisa, queritur. Sane in duas quidem diuisa est partes, cuius rei signum illud est, quod nerui, qui ad dextrã & sinistram eius partem veniunt, sunt gemini: ita venæ etiam & arteriæ. Sed partes eæ iunctæ ita fuerunt, quoniam non conueniebat, neque ad usum futura fuisset commoda, si distincta fuisset. Magna vero dubitatio est de motu linguæ: Galenus enim in libro De motibus manif. et Auic. prima primã, cap. de anatomia musculorum linguæ, satis dubiè loquuntur. tota autem questio hic stat, quod musculus omnis mouet, dum se ipsum ad suũ principium contrahit. Cum igitur lingua extra profertur, qui musculus erit, qui se contrahens linguam quasi foras trahat: nullus opinor, quoniam illum extra os esse oporteret. Necessarium igitur hac in re est vt dicamus, quod alius motus est volũtati obediens, præter eum, qui fit à musculis: tamen Galen. & Auic. contradicant manifestè, qui motũ volũtariũ omnino per musculos fieri volunt. Quare dicendum restat, aut quod qui musculus se contrahit idẽ se etiam extendat: aut musculum p̄tere oportet qui non contrahatur, sed porrigatur tantum. Sed vtrobiq; sunt angustia, nam hoc à Galeno aut Auic. non refertur: illud vero dubitationem etiam habet, nam si musculus protrahitur, protrahatur oportet ab alio musculo, qui contrahatur. Nerui

vero qui ad linguam veniunt sunt duplicati, sentiendi scilicet & mouendi vim præbentes, vtrisque enim lingua indiguit. Quãuis autẽ idem nervus, & sensum quandoque ferat, & motum: attamen, quia magno egebat sensu, nervus ideo mollis ei datus est, atque iste supra linguã tendit. Qui vero mouendi vim defert, est intra linguam: quo fit vt vno affecto, alter illæsus esse possit. Quid, læso neruo molli, seruari ne adhuc potest sensus in neruo duro: Ego nõ posse crediderim, quoniã nervus hic est ad radicem linguæ, neque ad superficiem tendit, propterea sensum deferre non potest. quare relinquitur motus sine sensu. Sunt qui opinentur in lingua esse loculos cauos, qui a arteriarum spiribus repleantur, sicuti de pene dictũ est. verũm similitudo hæc nil facit, quoniã motus linguæ sola voluntate fit, penis autẽ non ita, vt iam diximus.

De anatomia ventris superioris, scilicet de capite.

His expeditis assume caput, quod est vter postremus, continens membra animata, & specialiter cerebrũ, quod caput est immobile: & ideo caruit musculis. situs eius est pars superior corporis. Causa autẽ eius situs est supradicta.

Et ex his apparet primum scilicet substantia eius, quia de se ossuosum est potius, quã musculosum.

Apparet secundo situs, & locus eius &

ex superioribus, & sequentibus apparebit colligantia eius.

Apparet tertio quantitas eius: quia venter in homine est magnæ quantitatis, respectu aliorum animalium eiusdem quantitatis cum homine: quia habet continere cerebrum, quod maius est in homine, quam in aliquo animali eiusdem quantitatis. Et debet habere ventriculos maiores etiam magis distinctos.

Figura autem capitis, & forma apparet: quia est figuræ sphericæ leuiter compressæ ex vtraque parte: ita quod secundum anteriora, & posteriora tuberositates quasdam habet: secundum dextrum vero, & sinistrum habet planiciem. Causa autem quare fuit figuræ rotundæ: sed leuiter compressæ ex vtraque parte est: quia talis est omnium aliarum capacissima: & quia ipsa non potest tangi, nisi in puncto: & per consequens a rebus exterioribus tuta. His duobus indiguit caput: quia debet esse capacissimum propter cerebrum: & quia valde dispositum extrinsecus alterantibus debet esse tutum ab eis. quare figuræ fuit sphericæ: non tamen fuit perfectæ figuræ rotundæ: sed depressæ ex vtraque parte, propter ventriculorum cerebri distinctionem, &

propter ortum sensuum particularū a parte anteriori. quare fuit figuræ prædictæ.

Et ex his apparet quintum, quod consuevit inquiri in anatomia cuiuscūq; membri scilicet iuuamentum eius, quod est cōmune & generale continere membra animata, & specialiter cerebrum, & orta ab eo.

Sequitur sexto, & vltimo videre numerum partium eius: partes autem capitis secundum Aui. 3. cañ. fen. 1. ca. 1. sunt. 10. scilicet capilli, cutis, caro, panniculus exterior, craneum, panniculi intrinseci duo, cerebrū, duo pāniculi inferiores, rete mirabile, os basilare: et adde vndecimū, id est orta ab eis.

Capilli in capite fuerunt generati & ex necessitate materiæ, & ex necessitate finis. Ex necessitate materiæ: quia, cum caput sit caminum totius corporis, recipit fumosas superfluitates a toto corpore, quæ sunt materia pilorum: & ideo per cutim eius egrediuntur, & formantur pili magni, qui dicuntur capilli. Necessitas finis fuit: quia cum caput sit expositum rebus exterioribus alterantibus, habuit capillos, vt per eos tueretur a nociuis extrinsecis alterantibus.

Cutis capitis grossa est: quia capilli debent esse firmati, & fixi in ea, qui debent habere

bere radices magnas et grossas: et ideo cutis grossa fuit: & etiam quia est velamen & scutum ossis, & cerebri: cum super craneum non sit musculus.

Caro autem apparet in fronte, temporibus, & circa mandibulas.

Eleuata cuti a craneo apparebit tibi panniculus exterior, factus propter tria iuua-
menta. Vnum vt craneum a cuti, & cutis a craneo sine medio non tangatur. Secundum vt craneum per hunc panniculum sentiat. Tertium vt per hunc panniculum dura mater suspendatur craneo: quia hic panniculus generatur ex nervis, & ligamentis ortis a dura matre, penetrantibus per commissuras, & poros cranei extra craneum: ex quibus contextitur panniculus hic exterior.

GVRTII.

Dictum quidem iam antea est caput esse ossium, eiusque causam retulimus, quam optimam esse duximus. recensuimusque aliorum opiniones, quæ propter finem factum sit, diximusque de mente Galeni non propter cerebrum, vt credidit Aristoteles, sed propter molles oculos esse factum. Nunc reliqua, quæ ad caput spectant, prosequamur: Ac primum, quod de capitis magnitudine queritur. Mundinus iuquit, quod caput hominis maius in homine ad proportionem totius corporis, quam in reliquis animalibus, quoniam maius cerebrum con-

tinet. Aristot. etiam secundo De partib. animal. cap. 7. Homo, inquit, inter omnia animalia plurimum cerebri habet, scilicet proportione sui corporis, & inter homines mares plusquã fœminæ. cordis enim pulmonisque locum calidissimum habet, & sanguine refertissimum, itaque contra multum caliditatis, multum humiditatis, frigiditatisque opponitur. Aristotelem tamen Galenus reprehendit libro octauo de vsu part. cap. 3. & 4. Idem vero Aristoteles trigesima sectione, problem. 3. causam hanc refert quod capite minimo sit, scilicet ad sui corporis proportionem. Declarat deinde Mundinus figuram capitis. Eam figuram quę sphaerica sit optimam esse inquit, quoniã sit capacissima, & à noxijs rebus tuta, atque ideo ea de causa hæc figura fuit caput institutum. excedit autẽ aliquando formam orbicularem, propter neruos qui à cerebro oriuntur. Capitis partes, quę ab Auic. referuntur prima tertij. cap. 1. sunt capilli, cutis, caro, panniculus, cranium, panniculus durus, pãniculus tẽuis, cerebrum, & ipsius cerebri ventres, duo panniculi sub cerebro, rete, os, quod est cerebri basis. Incipiamus autem à capillis secuti ordinem Mundini, qui capillos ait factos esse necessario, quoniã ex fuliginosa materia generantur, factos etiam fuisse, vt caput operiant. Pilos inquit Galen. esse in nobis, quo pacto sunt herbæ in terra, harum enim quædam sunt ex intentione agricolæ productę, quę certis terminis constitutę sunt: alię vero materia suggerente passim exoriuntur. sic etiam pilli, qui sunt in barba, supercilijs, & capite, ex naturę intentione producti sunt, certis terminis ac

locis constituti. In alijs verò partibus, vt fors tu-
 lit, materiâq; pròpta fuit ita passim nullo ordine
 prouenerunt. Quare autem barba quidem in mē-
 to sit, capilli verò in capite, refert causam Galen.
 eamque duplicem, cum ut a frigido tueantur, tum
 ad decorem, siquidem barba grauitatem quandā
 ostentat. Neque verò genæ, auu nasus pilos ha-
 buerunt, quoniam illas cutis crassa satis ruetur,
 hunc aër inspiratus. oculi etiam & frons pilis ca-
 ruertint, illos enim defendit spiritus ipse à frigido,
 præterea visus impediretur si frons pillosa esset,
 oporteret que eos sepiissime secare, ne visui essent
 impedimento: præterquam quòd nullum fronti
 commodum asferre possunt, hanc enim capilli à
 fronte demissi tueri possunt. Mulieres verò bar-
 bam non habent, quoniam corpus ijs molliusculū
 est, moribus etiam differunt, neque enim eas gra-
 ues esse oportebat, sed omnino placidas & ioco-
 sas. In viris præterea plures fuliginosæ superflui-
 tates attoluntur quàm in foeminis: idcirco barbā
 habent, qua foeminæ carent. Qui vero pili sunt su-
 perciliorum & palpebrarū scilicet ad oculos tuen-
 dos, non continuè crescunt, nā si longiores essent
 visum impedirent, sed pauciores esse nō oportuit,
 quoniam vsum, ob quem facti sunt, non præsta-
 rent. Pili autem in pudendis, axillis, & cæteris hu-
 iusmodi, proueniunt, ex necessitate materiæ. Hoc
 autem sciendum est, quòd pili, qui ex intentione
 nature producantur sunt in omni bene habito cor-
 pore. Cutis dura est, & crassa, quæ radices capillo-
 rum contineat. De Carne nihil est dicendum. Quod
 verò ad pericranium attinet videtur errare Mun-
 dinus

dius in recensendis eius utilitatibus, est autē per
 cranium panniculus, qui cranium ambit. Inquit
 Mundin. factum esse primo ne cutis à cranio sine
 medio tangatur, tamen non mihi videtur hæc cu-
 tis esse adeò mollis, ut non potuerit cranium con-
 tingere. Altera utilitas est, inquit, ut cranium per
 hunc panniculum sentiat. Sed quærerem ego à
 Mundino, statuât ne os ipsum cranij sentire, an ex-
 teriora, demonstratum autem antea est nulla ossa
 præter dentes sentire, ut verò quæ extra cranium
 sunt sentirent, non necessarium fuisse inquam hunc
 panniculum: habet enim cutis ex se quo sentire pos-
 sit, nam si cranium corroderetur, cutis ipsa sentiret.
 Quare tertia utilitas relinquatur, factum esse hunc
 panniculum, ut duram matrem cranio alliget.

Nulla ossa
 præter dentes
 sentirent.

De anatomia cranij.

CRaneum est os magnum circundans
 cerebrum exterius: in cōcavitate cuius
 existit cerebrum locatum: & ideo magnum
 est hoc os in hominē: sicut & cerebrū, quod
 velatum est partibus prædictis, propter ne-
 cessitatem dictam, & velant etiam cerebrū
 propter necessitatem eandem.

Istud craneum non fuit vnum & conti-
 nuū, sed partes habuit: & hoc ppter multa.

Primo, ut si fieret nocumentū in vna par-
 te alteri non communicaret vel toti. Se-
 cundo, ut fumositates possent per iuncturas
 extra craneum expelli. Tertio, ut virtus
 medi

medicaminum tempore necessitatis possit ad substantiam cerebri penetrare. Istæ partes continuatæ sunt iuncturis, quæ vocantur adorea scilicet ferratiles: non enim fuerunt nodatiles, quia non debent moueri illa ossa, sed fuerunt ferratiles, vt firmiorem facerent colligantiam; & ideo dentales sunt. & fuerunt duplices scilicet veræ, & mēdosæ. Mendosæ sunt duæ scilicet in vtroq; tempore vna: & dicuntur mendosæ, quia non penetrant interius: sed tantum apparent exterius. Veræ vero sunt tres: sicut tres sunt ventericuli scilicet coronalis, facta ad modum coronæ. Sagittalis, prorumpens secundum longitudinem ad modum sagittæ, vel lineæ. Et tertia est adorea lauda, quæ continuat craneum posterius, quod est figuræ laudæ: & fuit figuræ istius os posterius, qua cerebrū posterius, est figuræ pyramidalis. quæ sit causa istius apparebit in anatomia substantiæ cerebri posterioris.

Et ex his apparet, quod in genere quinque sunt ossa capitis secundum os frontis, duo parietes cranei, os lauda, & basilare quæ statim videbis.

Et ex his patet quod sit iuuamentum cranei, & partiū eius; & ægritudines eius sunt
omni

omnium generum. Potest enim pati malā complexionem: apostema & solutionem cōtinuitatis: in qua nota quod ipsa est periculosa, quando discoopertum est aëri exterius alteranti: & maxime si fiat in loco iuncturā rū: & specialiter in loco qui dicit̄ bregma: & est pars mollior et gracilior, quę sit, in cranio: & tardius induratur in pueris: & hoc est, quia ibi fit coniunctio siue vnio duarum coniuncturarum.

C V R T I I.

Tres affert rationes Mundinus quibus cranium non ex vno osse perpetuo, sed pluribus simul commissis constet. Quarum duę ex Galeno referuntur, tertia Mundinum auctorem habet: inquit enim Galenus vndecimo De vsu part. capi. 19. idcirco non continuum fuisse cranium, ne, si aliquādo una pars afficiatur, totū cranium patiatur. Altera causa refertur nono libro De vsu part. cap. 1. inquit. n. Vnum quoddam naturę opus erat inter ea, quę maximè intendebantur, ad expurgandum superfluitates alimenti, ex omnibus particulis corporis, et maximè si principales fuerint, quale est cerebrum. Itaque plures in cerebro vias natura instituit, ad superflua emittenda, quę si non emittantur, aceruata ibi & coacta primū quidem partem velut onerē quōdam grauant. Posthęc autem & humoribus rursus influentibus impedimēto sunt, præoccupant enim & obstruunt vias eorum, ita neque membrum nutrirī permittunt. Pręterea, quę
admo

admodum animalia esurientia aut limum, aut ali-
 quod tale ingerunt, eodem modo quolibet pars proprio sibi
 nutrimento destituta, & necessitate coacta, propter
 innatam sibi appetentiam, aliquid attrahit etiam ex
 ipsis prauis humoribus. Illud etiam accidit, quod
 excrementa hec consistenteria, tempore fiunt putrida,
 hinc grauissimi morbi proueniunt. Sed quoniam
 ea excrementa duplicia genere sunt, quedam enim
 veluti vaporosa & fumosa, & quae suapte natura
 sursum ferantur: quedam autem velut aquosa & li-
 mosa deorsum ex seipsis repentia: duplices etiam
 meatus natura distribuit, euacuatuos quidem le-
 uia excrementa in altum educens: qui vero grauia
 excrementa deferunt decliues meatus operata. Qua-
 re hi decliues meatus, tum per palatum in os, tum
 per narium orificia conspicua & magna emittunt
 sensibiles, & crassas humiditates. Ex his vero, quae
 sursum feruntur, quoniam in duris corporibus, nisi
 praeparetur via, transire nihil potest, secundum cra-
 nium conspicuas & sensibiles vias natura distribuit
 vaporosis ipsis, & fuliginosis superfluitatibus. Sed
 dicet quis, cur natura cranium non fecit porosum,
 sine commissuris: praeterea cur non fecit cutim ma-
 nifeste porosam? Respondeo De mente Galeni.
 non oportuisse cutim manifeste porosam esse, quia
 corpus habet molle, per quod possunt vapores pe-
 netrare, in cranium autem commissuras esse: oportuit
 enim exire venas ad cranium nutriendum, & villos ad
 constituendum pericranium. Tertia Mundini ratio,
 qua ait factas esse has commissuras in cranium, ut
 possint medicamenta ingredi, non valet: quoniam
 possent ingredi etiam noxia, natura vero maiore
 ratio-

rationem habere debuit, ne membrum aliquod lēderetur; quàm vt curetur. Quare merito hæc causa à Galeno est prætermiffa. Ipse vero alios vsus affert, ac primùm, vt per eas cōmissuras dura mater alligaretur, deinde vt venæ tranfeant, prætereà vt villi à dura matre ad pericranium constituendum deueniant, vt dictū est. Alia etiam ratio colligitur, ex vndecimo de vsu part. ca. 19. cum inquit. Sunt hæc ossa cranij durissima, quæ sunt in occipitio, & fronte, & auribus, quoniam ad dyspartheiam constructa sunt, cum ante alia emineant. Et causa in eis non est, propter quam rara, & cauernosa facta sunt ossa summi capitis; plurimum enim vaporum ex toto corpore ad illa eleuatur, cū maximè sublimia locata sint, & propterea (vtri prius demonstratum est) variam ipsis per ea euacuationem natura præparauit. Quæcunque vero ex lateribus locata sunt, præterquam quod ab hac occasione soluta & libera sunt, Insuper etiã nobis cadentibus, vel quouis alio modo percussis, molestari sæpius debebant. neque enim cadit aliquis facilè in verticem capitis, neque illi hæc pars promptè percuitur. Quoniam igitur hæc neque similiter debebãt percuti, & euacuatione egebant, illa vero percutienda erant frequenter, & non indigent euacuatione rationabiliter rara quidē hæc & cauernosa, illa vero dura, & solida facta sunt. Illa autem ossium coniunctio Galeno sutura appellatur nono De vsu partium. cap. 2. Has suturas quinque ponit Mundinus, duas mendosas, quæ sunt iuxta tempora, ideoque mendosæ dicuntur quia non penetrant, secundum Mundinum, reliquæ cōmissure sunt tres,

56 φωνῶν quidem id est coronalis facta est: ut os ca-
 pitis, quod est inter duas suturas medium, ex vtra-
 que parte medię futurę sit equale: Α π β δ ο δ ε η ς id est
 similis figurę Α græcę literę, quę est recta supra
 tertium ventriculum, media cum illis iuncta figu-
 ram Η literę perficit, est que supra medium ventri-
 culum. Galenus autem nono libro De vsu par. ca.
 17. declarat quomodo iuste has capituli suturas na-
 tura disposuerit. Cum enim velut sphaera oblonga
 sit caput, merito sutura vna recta per medium car-
 put, ex posterioribus in anteriora extensa est, duę
 autem transfuersę hanc suscipiunt, & fit trium futu-
 rarum figura similis Η græcę literę. Exponit dein-
 de Mund. numerũ ossium cranij, inquit. n., Quin-
 que sunt ossa capituli, os frõtes, duo parietes cranij:
 os labdę, & basilare (hęc enim sunt eius verba).
 Verum Galenus non ita sentire videtur libro vn-
 decimo De vsu part. cap. 20. ex cuius loci sententiã
 septem esse cranij ossa colligitur, nam eę cõnexio-
 nes, quas Mundinus mendosas vocat, iungunt totũ
 os, quod diuisum est. inquit enim ossium composi-
 tiones, quę parallelę sunt ei, quę est media, & secũ-
 dum longitudinem capituli ferũtur, ad vtranque au-
 rem collocatę, mihi pulchrę videntur λιπιδοειδῶ
 προσκολληματῶν, hoc est squamosę agglutinationes
 nominari: vtroque scilicet ossium simul applicato-
 rum paulatim attenuato, ad strictam quandam &
 profundam squamam. deinde, eo quidem, quod de
 super descendit se intromittente, eo autem quod in-
 fernę ascendit extrorsum apposito. hac igitur com-
 page cognoscitur septem esse ossa cranij, nam quę
 duo tantũ esse dicebat Mund. quę scilicet sunt à

lateribus, si diuidantur etiam per has, agglutinationes fient quatuor, duo quidem à sutura, quã sagittalem vocant vsque ab has commissuras, ab ijs rursus vsque ad extrema cranij sunt duo alia. Potest autem Cranium pari, & ex mala cõpositione ossium, & ex solutione. hæc vero deterior est cum soluantur suturæ, ea præcipuè quę coronalis dicitur: quoniã cū ea iungit etiam sagittalis dicta, et os illud tenue est. Quod autem dicunt chirurgici, os cranij duas habere tabulas, ego apud Gal. nõ inuenio.

De anatomia piæ & duræ matris.

EXpedito craneo videbis duos panniculos sub eo scilicet duram matrẽ, et piam matrem factos vt velent cerebrum & vt cerebrum nõ contangatur a craneo, quod est valde durum: & ideo iuxta craneum immediate existit dura mater quæ solida & dura est: iuxta cerebrum est pia mater quæ mollis & humida est vt non lædat cerebrum.

Et etiam quia in ipsa continētur: siue cõtexitæ sunt venæ: quibus mediantibus nutritur cerebrum.

Et ex hoc apparet quare duo fuerunt pãniculi: quia hoc fuit ne durus contangeret cerebrum, & vt mollis non contangeret craneum. Est etiam alia causa scilicet vt si nocumētum contingeret vni adhuc non cõmunicaret cerebro.

Et dura mater magis est alligata craneo
 vt suspēdatur ei: & ideo per ipsum sive suas
 porositates transmittit neruulos & ligamē-
 ta. Habet etiam dura mater cōtinuitatē
 cum cerebro: vnde penetrat per ipsum diui-
 dens ipsum per medium in dextrum & si-
 nistrum, vsque ad vētriculum anteriorē, &
 etiā ipsum in anteriorē & posteriorē. Et ideo
 diuidit anteriorē cerebrū a posteriori: & fuit
 hoc necessarium quia vnum est diuersæ cō-
 plexionis ab alio.

Et sicut diuidit dura mater: ita etiam &
 pia mater immo magis: quia cum pia mater
 sit sustentaculum venarum nutrientium ce-
 rebrum diuisa est per cauernositates cere-
 bri vt nutrimentum tribuat cerebro & sic pe-
 nētrauit vsque ad ventriculos cerebri & cir-
 cum circa velati sunt panniculo subtilissimo
 vsque ad finem medii: nam ventriculus po-
 sterior panniculo non indiget propter siccit-
 atem eius respectu anterioris.

C V R T I I .

Hi panniculi à Galeno dicuntur $\mu\alpha\lambda\iota\sigma\sigma\epsilon\sigma$, refert
 autem causam, quare duo facti sint octauo de vsu
 part. cap. 9. Quomodum enim Placo inter ignē
 & terram, quoniam longē absunt, aquam & terrā
 a deo posita esse ait: ita & ego dicam, in medio ce-
 rebri & cranij, quia substantijs longē distant, po-
 tuif

fuisse naturam vtrasque meningas, non contētam vno amicitiaē vinculo illa obligare. oportet autē non positione solūm id in medio locari, quod est verē medium, sed etiam natura. Natura vero medium est, quod secundū eandem proportionē distat ab extremis. Natura autem meninx distabat proportione à cranio, & cerebro, sed subtilis plus ab ossis duritie vincebatur, quā ipsius cerebri mollitiem vinceret. Contra autē, dura multo erat cerebro durior, quā osse mollior. Tenuem verò meningem, quæ pia mater dicitur, inquit Galenus assimilari $\chi\omega\epsilon\iota\omega$, hoc est secundo inuolucro embryi, & mesaræo animalis, quoniam venas continet, quibus nutritur cerebrum, tegit que primum & secundum ventriculum cerebri. Tertium enim operiri non opus fuit: neque verò meninx hæc continet solummodo cerebrum, sed etiam per profundum eius mergitur, ibique omnia pertransit, totūque id complicat, vbi que vasis attenuata, vsque ad internam ventriculorum capacitatem. Hoc habet præterea, vt cerebrum firmet. cuius rei signum est quod mortuo animali si secetur dura meninx cerebrum adhuc consistet, si vero secetur tenuis, cerebrum disluet, atqui mortuo animali cerebrū fit durius. Duræ verò meningis munus est vt cranio sit alligata, nō vt contineat partes cerebri. Illud notādum est, quod, vbi Mundinus inquit Et ideo per ipsum, siue suas porositates transmittit musculos, legen tum est villos. quomodo autem per hæc distinguatur cerebrum deinceps dicitur.

De anatomia medullæ cerebri &
contentorum in ea.

P Anniculis eleuatis apparebit cerebrū in homine maius in quantitate quam in aliquo alio animali eiusdē quantitatis: quia cor habet calidius eisdē, & indiget propter operationē intellectus pluribus spiritibus animalibus.

Et hoc cerebrum duas partes habet anteriorem & posteriorem: pars anterior diuisa est secundum dextrum & sinistrū: & hæc diuisio manifesta apparet in substantia cerebri: & ex cōsequenti in ventriculis. eius substantia est medullaris frigida & humida diuersa ab aliis medullis, quæ non est contenta vt craneum nutriat, sed potius craneum nutritur, vt contineat cerebrum. & eius iuuamentum est vt spiritum vitalem sui complexione contemperet vt fiat animalis.

Postea vero vade scindendo leuiter per medium donec peruenias ad ventriculum anteriorem magnum. Et antequam profundes vsq; ad lacunam, nota ventriculum esse diuisum in dextrum & sinistrum vt dixi: etiam parietes hinc inde sunt descendentes vsq; ad basim & diuidentes, dextrum a sinistro: & tunc statim videbis amplitudinem vniuscuiusque ventriculorum in anteriori parte eius scilicet in angulo anteriori locas

ta est phantasia quæ retentiua est specierum a sensibilibus particularibus receptorum. Ista angulo posteriori est imaginatiua quæ apprehensiua est harum specierum in phantasia retentorum, & eas apprehendit componendo & diuidendo, & non discernendo hoc esse hoc. In medio vero huius est sensus communis qui est apprehendens species delatas a sensibus particularibus: & ideo sensitiua terminatur ad illum locum vt riui ad fontē vt videbis. Et hæc omnia sunt secundū sententiam Auic. de virtutibus animalibus. licet secundum sententiam Arist. & Galeni ibi tantum sit sensus communis, qui diuersi mode potest dici et phantasia et imaginatio; vt alias declarauī.

Et ex his possunt patere iuuaementa huius ventriculi: quia iuuaementa sunt vt imaginatio phantasiæ deseruiat & sensui cōmuni: & vt omnibus sensitiuis siue organis sensus spiritum tribuat animalemt vt sentiat.

Et ex his apparent nocumēta quæ in hoc ventriculo & cerebro anteriori contingūt; quia in eo possunt omnes ægitudines fieri. Solutio continuitatis mala complexio: quæ sint in panniculo dolorem causant: & si totū circundant panniculum vocatur ouum siue

dolor ovalis: si mediam partē hemisranea.

Potest etiam pati ægritudinem quæ est apostema: & sit in panniculis calidum vocatur sirsen, quod frequenter contingit si sit frigidum vocatur lethargia. Si vero sit in substantia cerebri pessimum est & mortiferum.

Potest etiam pati ægritudinem compositionalem, quæ si est oppilans nõ ex toto: aut est substantia vaporosa: & sic est vertigo, & scotomia, aut humoralis: & sic est stupor, paralysis, & huiusmodi. Si sit oppilatio ex toto aut oppilat ventriculos & substantiam simul aut ventriculos tantum. Si ventriculos & substantiam, sic est apoplexia: si ventriculos tantum sic est epilepsia. Verum est quod hæc oppilatio est oppilans alios ventriculos: sed non tantum quantum anteriore.

Potest etiam pati malam complexionē vt melancholiam & similia.

Antequam autem procedas ad medium ventriculū considera intermedia inter hunc medium: & sunt tria scilicet anche, quæ sunt sicut basis huius anterioris ventriculi dextri & sinistri, & sunt de substantia cerebri ad formam & figuram anchorum: & a latere vniuscuiusque inter ventriculos iam dictos

est substantia vna rubea sanguinea, facta ad modū vermis oblongi siue subterranei, ligata ligamentis & neruulis alterutrinq̄: quę ad sui elongationem constringit & claudit ānchas, & viam siue transitum ab anteriori ad medium: & e cōtra. Et quādo homo vult cessare a cogitatione: & rursus in consideratione eleuat parietes, & dilatat ānchas vt possit spiritus trāsire de vno vētriculo ad alios: & propterea vocatur vermis: tū qa assimilatur vermī subterraneo in substantia & figura, & etiam in motu cōtractiuo, & extēsiuo.

Post hoc descende inferius paulatine: & primo tibi occurret lacun, a quę est quędam concauitas rotunda, & oblonga: in cuius medio est foramen tendēs inferius ad palatum diagonaliter, & ei occurrit via directā, quę a medio ventriculo descendit directē ad colatorium: & hęc lacuna habet circūquaque eminentias rotundas magnas, factas ad sustentandum venas vel arterias ad ascendendum a rete mirabili ad vētriculos cerebri dictos: & ideo in basi eius apparent glandulę, quę sunt iuxta rete mirabile eminentes: & per istam lacunam ventriculi anteriores & cerebrum quantum ad medium eius expurgant suas superfluitates; sed cerebrum
quan

quantum ad partes anteriores magis expurgat suas superfluitates per colatoria nariū.

His expeditis statim tibi apparet ventriculus medius qui est sicut quædā via & transitus ab anteriori ad posteriorem: & in isto locata est virtus cogitativa: & merito, quia hæc virtus operatur cōponendo phātasmatā & memorata vt ex sensatis eliciat non sensata. Item quia ipsa est virtus regitiua totius animalis. Regimen autem totius animalis consistit in comprehensione præsentium, memoria præteritorum, & pronosticatione futurorum. Et ideo debuit esse in medio harū virtutum apprehensiuarum & rememoratuarum. Fuit etiam in medio horum ventriculorum vt sit virtus eius indirecto ad cor: eo quod virtus eius est virtus immediatè deseruiens intellectui: quare debuit esse in medio ventriculo, & in medio dictarū virtutū.

Post istum procedendo tibi apparebit ventriculus posterior qui est in cerebro posteriori situatus & locatus: & hoc cerebrū est velatum & distinctum a primo duobus pāniculis iam dictis: quia hoc est molle scilicet anterius & posterius durum.

Istud cerebrum posterius est locatum: quia est principium nuchæ: & quia est prin-

cipium plurimum neruorum motiuorum. Motus autē fit per neruos motiuos qui quāto duriores tanto fortiores sunt.

Istud cerebrum est figurę pyramidalis: quia ventriculus locatus in eo est etiam figurę pyramidalis: & causa quare illius figurę est vētriculus posterior est: quia per partem inferiorem eius, quę est basis eius debet recipere: & ideo debet habere latitudinem per partem superiorem debet cōtinere: & ideo acumen & striccturam debet habere in cacumine: quia species melius reseruantur in striccto loco quam in amplo: & ideo fuit talis figurę.

Et ex his patet quę sint operationes siue iuuamentum istius cerebri posterioris: quia vnum est vt sit principium neruorum motiuorum & nuchę. Aliud est vt sit instrumentum virtutis memoratiuę. Et ex hoc patet quod passio propria huic est quando lesa est memoria: sicut quando lesa est cogitatiua & gritudo propria est vētriculo medio: & quādo lesa est imaginatiua passio est in ventriculo anteriori: sicut quando passio est comunicans toti cerebro omnes lesę sunt virtutes, & operationes harū virtutū omniū.

Sed tu dices: quę est causa quod ventri-
culus

culus medius non habuit cerebrum mediū distinctum sicut alij uentriculi.

Dicendum quod causa fuit: quia iste uentriculus est sicut uia & trāsitus istorum aliorum duorum: & ideo non debet esse distinctus ab eis secundum cerebrum; & hoc de anatomia cerebri &c.

C V R T I I .

Quòd cerebrum maius sit in homine, quàm cæteris animantibus, proportionē totius corporis, dictum etiam antea est, ex Aristotelis auctoritate, libro secundo De partibus animalium, cap. 7. Mundinus hoc loco, & Auic. prima tertiij, senure videntur quòd cerebrum temperet caliditatem cordis, spiritusque vitales in animales conuertat, Aristoteles vero, quòd à cerebro cordis temperetur caliditas fatetur: nō tamen, quòd vitales spiritus in animales conuertat. Quare vult Aristoteles hūc solum vsum esse cerebro, præterea nullum. Galenus autem huic opinioni aduersatur, octauo libro De vfu part. cap. 2. Inquit enim. Opinari autem gratia caliditatis, quæ est circa cor fieri cerebrum, ut scilicet id refrigeret, & ad moderatam temperiē ducat, omnino est absurdum, nequaquam enim cerebrum tam longè à corde natura locasset, verum aut id cordi circumposuisset. sicut & pulmonem, aut in thorace omnino posuisset, multas prætereo rationes quibus apertissimè Galenus probat nō esse cerebrum factum ad refrigerādum cor, ne sit longior. Diuiditur autem cerebrum secundum Mundinum

dinum in anteriorem partem, & posteriorem, quæ vocant *πρεφυκεφλίδα* atq; hæc durior est, quoniã ab ea duriores nerui oriuntur, anterior verò est mollior, quoniam mollium neruorum est principium ita enim inquit Galenus octauo libro De vsu part. cap. 6. Hinc illud falsum esse colligitur, quod dixerat Mundinus, duram matrem esse inter cerebrum, & cranium, ne durum contingat molle sine medio: quoniam hæc meninx dura est, cumque separat anteriorem partem à posteriori, tangit partem anteriorem, quæ mollis est. nisi forte quis dicat eam meningen, & si durior sit, tamẽ, quoniam amica est cerebro eius substantia, non illi esse noxiã. Est ille quoque duræ meningis vsus animaduertendus, de quo meminit Galen. nono De vsu part. cap. 6. cum ait. Concurrunt autem secundum summam rem capitis duplationes meningis, quæ perducunt sanguinem ad regionem quandam vacuam velut lagunculam, & peluim, quam ob id ipsum consuetudo est Herophilo vocare *λητόν* hoc est torcular. Proinde falsum Aristotelis dictum deprehenditur, qui tertio De partib. animal. cap. 4. inquit nullibi esse sanguinem, præterquam in corde, & venis, cū in huius meningis concauitate reperiatur. Est autẽ dubitatio, nunquid diuisio cerebri in dextrum & sinistrum penetret per totã eius substantiam, an ad aliquam tantum partem. Auic. prima tertij, cap. 2. totam videtur cerebri substantiam induas partes diuidere: & si ea diuisio non manifestè appareat in primis ventriculis: apparet tamen in alijs locis manifestè, ac præcipuè in capite hominis paulo ante mortui, Cerebri substantia inquit Mundinus est medulla

dulla, Aristoteles vero secundo libro de part. animal. cap. 7. substantiam inquit cerebri non esse similem alijs medullis, quia non est pinguis, non vntuosa, non calida, non vt ossa nutriat, vt reliquæ medullæ. Galenus octauo de vsu part. cap. 6. cerebrum esse ait eiusdem substantiæ, cuius sunt nerui cum à cerebro oriuntur, & si paulo molliusculum sit. nerui vero densiores: idem est de ventriculis cerebri statuendum, habet enim & ipsi substantiam paulo densiorem, quæ cerebrum habeat, nerui vero quo magis à cerebro recedunt eo sunt duriores, magis enim ac magis exiccantur. Ventriculi cerebri hoc modo inueniuntur: Separatur læua pars à dextra paulatim, donec appareat quædam albi or substantia, quæ est primus ventriculus. atque is modus nõ in homine solum obseruatur, sed in quo cunque animali. hic autem ventriculus in duos distinctus est per substantiam quandam raram cerebri. De his tractat Galen. à decimo capite octaui libri de vsu part. vsque ad quartum decimum. Factos esse autem ait Mund. ob tres virtutes, Alias tamen addit vtilitates Galenus vult enim aërem inspiratum non vniuersum ire ad cor, sed eius partem ad anteriorem cerebri ventriculum mitti: fierique inspirationem, & respirationem. hinc sternutamentum prouenit: cum scilicet ab anteriori ventriculo cerebri aër impetuose emittitur. Cum etiã vsu præbent. quod in eis perficitur sanguis pro generatione spiritus animalis, qui per totam cerebri substantiam transmittitur. Nam vt auctor est Galenus octauo De vsu part. capi. 11. spiritus per vniuersam cerebri substantiã diffusi sunt: illi enim

anfra

anfractus viæ sunt spirituum. Quod autem inquit
 se virtutes sensitivas recensuisse de mente Auicennæ
 falsum est, neque Auicennam intelligit. Ipse enim
 Auic. sensum communem, à quo comprehenduntur
 omnia in parte anteriori, non phantasiam reponit;
 quod facit Mund. Possent autem de ijs virtutibus
 dici plurima sed ea rejicio, in loco proprio recen-
 senda. Pauca tamen attingam. Albertus has virtu-
 tes quinque esse vult: Cōmentator tres: Alij duas:
 sunt etiam qui vnam tantum ponant. Auicenn. autē
 primò ponit sensum communem. deinde phanta-
 siam postea quoniam existimat esse etiam quendā
 conceptum compositum, ideo statuit virtutem cō-
 ponentem sensata. Præterea æstimatediam virtutē,
 quæ eliciat insensata. postremo memoratiuam.
 Verum non ita Albertus, qui vult primo quidem
 esse sensum communē, deinde phantasiam, Sed ter-
 tio loco statuit virtutem, quæ eliciat species insen-
 satas, hancque ait esse imaginatiuam. præterea cog-
 itatiuam, quæ diuidit. postremo memoratiuam.
 Aueroës superfluum esse vult statuere virtutem,
 quæ componat sensata, & quæ species insensatas
 eliciat inter se distinctas, cum vtræque sub cogita-
 tiuam reduceantur. atque ideo dabitur sensus com-
 munis, imaginatiua, cogitatiua, & memoratiua. co-
 gitatiua enim cōprehendit tam sensata, quàm non
 sensata. Quod si quis meam quoque sententiam
 hac in re quærat, Tres inquam esse virtutes distin-
 ctas, nam de sensu communi dubitatur. Aueroës
 tamen tertio libro De anima, com. 6. probare nitit-
 ur dari hunc sensum communem. locantur autem
 hoc modo: imaginatiua in primo ventriculo ante-
 riori:

riori: cogitativa in medio: memoria in posteriori. quod vero hæc inter se distinctæ sint, vel illo exëplo probatur, quod à Galeno refertur, de eo, qui existimabat se audire cantores in cubiculo, iubebaturque eos expelli, ceterum optimè ratiocinabatur de reliquis rebus, quare inquit Galen. applicatis in anteriori parte remedijs conualuit. in hoc igitur affecta erat imaginativa, servata cogitativa. De sensu autem communi dubitatio est, an sit pars organica determinata, an virtus quædam communis, quæ ad omnia organa spiritus deferat. Sed cum omnes consentiant in anteriori vëtriculo imaginativam, in medio cogitativam, in postremo memoriam contineri, videtur mihi nõ alienum à veritate esse statuere sensum hunc communem deferre spiritus ad reliqua organa, restarèque tres tantum distinctas virtutes, quas recensuimus. Nunc de egritudinibus cerebri pauca attingamus. Si apostemata, quæ cerebro conveniunt, calida fuerint fit phrenia: si vero ex frigida materia producantur, fit lethargia: siue in panniculis sint, siue in cerebri substantia ipsa. contingit etiam affici cerebrum ratione obstructionis, quæ si sit imperfecta (inquit Mundinus) deperditur sensus, & motus: si vero perfecta, & obstruat unam cum ventriculis substantiam cerebri, fit apoplexia: si vero ventriculi tantum, omnino obstruantur fit epilepsia. Sed enim nõ est integra ventriculorum obstructio, epilepsia, vt inquit Auicena, neque apoplexia requirit obstrui substantiam cerebri, sed tantum ventriculos. Quæ vero de melancholia affert Mundinus, rectè se habent, & sumpta sunt à Galeo, sexto de loc. affect. cap. 3, & ab Hippocr. sexto De morb.

morb. vulgarib. atque hæc, quæ ad priorem ven-
 triculum. Antequam autem ad alterũ accedamus,
 Considerandas esse ait eas partes, quas anchas no-
 minat, deinde, vermem. sunt autem illæ tanquam
 duæ nates iunctæ: nonnulli appellant didymos. q̄
 ad earum situm attinet Galenus octauo libro De
 vsu part. cap. vltimo. ita inquit. Ex vtraque pori
 parte subtiles & prelonge sunt eminentiæ cerebri
 γλκτίαι vocata, quorum concursus, & viciniam,
 cruribus hominum se mutuo contingentibus ma-
 ximè possis assimilare. Sunt autē qui διδύμοις hoc
 est testiculis assimilantes ea, vocare διδύμοις malũ
 quàm γλκτίαι Auicena. autē videtur dicere, ea par-
 tes esse primi ventriculi. Sed possunt facilè conci-
 liari: quoniam sunt in basi primi ventriculi, & du-
 plicata, ita vt possint etiam secundi ventriculi par-
 tes nominari. Omisit autem Mund. tres substantias
 quarum prior est, quam paulo ante diximus voca-
 ri ληνὸν Altera est κωνάριον caro glādulosa ad susti-
 nendas venas. Tertia, quæ particula cerebri est su-
 pra cõmunem cauitatem (que madmodum domus
 alicuius tectum) in cõcauam, & testudinatam sphæ-
 re superficiẽ circũducta, & camerata, dicitur gre-
 cis κωνάριον & ψαλλιοειδὲς Quod autē ad vermem
 attinet, omnes deceptos fuisse credo, hoc vero alte-
 rum est membrum, quod sum pollicitus ostende-
 re à nemine cognitum. Imprimis autem ostendo
 hanc substantiam non esse eam quam ipsi dicunt
 esse vermem. Galenus octauo De vsu part. ca. 14.
 & nono De anato. aggress. ca. 5. inquit corpus hoc,
 quod à vermibus figura σκολικωειδὲς dicitur, est ce-
 rebri ipsius particula. Verũ mihi nullo pacto pro-
 bari

Hæri potest hunc vermem (vt ita dicam) esse de cerebri substantia, cum sit pelliculosus. Præterea dictum est ex Galeni ipsius sententia, quod quęcunque sunt de alicuius membri substãtia, ad eius operationẽ conueniunt, & opitulantur. Quod igitur non cõuenit ad cerebri operationem, illud non est dicendũ esse de cerebri substãtia. Hoc. n. modo argumentationis vritur Galenus aduersus eos, qui dicebant conarij esse eandem vtilitatem in cerebro, qualis est ianitoris in stomacho, atq; ita patet hũc vermem non esse de cerebri substantia. Distat autem cerebrum à primo ventriculo adeò vt difficile sit ventriculos vulnerari. de hac autem re videtur sibi ipsi contradicere Galenus: qui sexti libri aphorismum octauum exponens, inquit, vulnera in cerebro si ad uentriculos vsque penetrent esse lethalia: si non penetrant sanari posse. octauo autem libro de vsu part. cap. 10. quendam ait adolescentẽ, cui ventriculus anterior vulneratus fuerat, sanatũ fuisse. hæc dissensio tolli potest, si meminerimus eorum quę à nobis iam dicta sunt, & quę à Galeno eodem cap. libri octaui De vsu part. dicuntur. organorum, quę gemina à natura facta sunt, hæc esse maximè comunem vtilitatem: vt si alterum eorũ patiatur, alterum famuletur. Minimè verò vixisset, ambobus simul vetriculis vulneratis. Post hæc inquit Mundinus apparere cauitatem quandam, quę descendit ad os, quod vocatur colatorium, dicitque hanc cauitatem esse magnam, per quam ascendunt arterię. Verùm lacuna est concauitas, ex basi ventriculi descendens: & per diagonum ad os palati tendens quod vocant colatorium, per eam

que expurgari partem mediam & posteriorem cerebri; anteriorem autem per vias nasi. Notanda vero est hoc loco Galeni sententia, quam refert octavo libro De usu part. ca. 6. quod, cum duo tanquam canales expurgando cerebro facti sint, qui per palatum in os deferunt excrementa, qui duo soli sufficere possunt, quandiu id rectè valet, & alimentum vincit & percoquit, tamen quoniam ventriculi cerebro subiecti excrementa ex continentibus eos corporibus confluentia, non raro exciperent, ex qua re frequenter apoplexia occuparetur animal, per narium meatus excrementa efferuntur. & si primò facti sint pro odoribus percipiendis. Est quæstio nunquid os palati perforatum sit, nam de osse narium nulla est dubitatio quominus cauum sit ac tanquam spongia cauernosum. Galenus nono De usu part. cap. 1. inquit naturam non fecisse commissuras in cute quoniam res mollis facile cedit. per ossa autem fieri non posse ut superflua penetrent, nisi disiecta sint aut perforata: necesse est igitur hoc etiam os quosdam habere poros, quibus cerebri excrementa deferantur. Præterea Galenus nono libro De usu part. ca. 3. aperte dicit hoc os esse *ἰσοδύναμον* hoc est cribro simile. quod sensu potes percipi, si quis caput hominis, iam pridem mortui, carnis nudatum inspiciat. Sed his omissis videamus quomodo ventriculi cerebri procedant, & quomodo fallantur anatomici recentiores. Solent passim ostendi ambo anteriores ventriculi ita ut post primum sequatur secundus: qui, ut inquit Galenus, via est à primo ad posteriorem, deinde ostendunt concavitatem quam dicunt esse viam à medio, ad posteriorio

sterforem vetriculum: sed falsò: nam hæc nil aliud est, quàm certius ipse ventriculus, neque alium inueniri tertium ventriculum a ssero, nam & ego diligenti ssimè hanc rem sepe numero sum perscrutatus. dicitur autem posterior quia tendit ad posteriorem partem, cuius causa est, quoniam ab eo oriuntur duriores nerui, qui præbent motum: ideò durusculus & ipse factus est. hunc verò Mundinus ait figuræ esse pyramidalis, vt à basi recipiat, in summitate retineat. Verùm hæ ratio nulla est, nam, vt concedam, hanc esse concauitatem (quam tamen non vidi) non debet esse formæ pyramidalis. etenim (vt inquit Galenus octauo libro De vsu par. cap. ii. omnes corporis meatus, arteriæ, venæ, omnesque ventriculi sunt sphaeræ similes, sed propter explantationes, implarationesque certitudo & perfectio sphaeræ corrumpitur, rotunda verò figura adhuc permanet, constat igitur si esset concauitas, futuram eam esse non pyramidalem. neque verò possum satis intelligere quid sibi velit Mundinus sua illa ratione: nam si vna esset concauitas oporteret vt tota contineret, ac non basis quidem reciperet, cuspis autem contineret. hic etiam posterior ventriculus, vt Galenus declarat, non habet partes admodum crassas, inuolutas dura meninge. Sed videre est anfractus quosdam & reuolutiones molli meningis, in quibus spiritus continentur, qui postea inde ad totum corpus transmittantur. Quædam sunt, quæ Mundi. nihil attingit vt de ea parte, quæ *λινόμ* dicitur. De conario tractatur à Galeno octauo De vsu par. cap. ii. quo in loco reprehendit eos qui dicebāt factum esse vt transitum claudat, qui

est ad posteriorem ventriculum, est autem conarium caro glandulosa, quæ facta est, vt venas & arterias seruet, quæ à posteriori ventriculo in anteriorem feruntur, ne inter eundem dispergantur.

De anatomia duarum caruncularum.

His expeditis oportet eleuare cerebrum leuiter: ita vt nõ rumpatur aliquis nervus. & incipe eleuare a parte anteriori: & tunc statim tibi apparebunt duæ caruncule similes capitibus mammillarum: & in substantia apparent similes substantiæ cerebri, & ideo a medullari substantia sunt ortæ, velate subtilissimo panniculo, qui dicitur pia mater: & ideo fragiles sunt satis, quia non debent in homine extra penetrare: & hoc quia cerebrum ex odoribus confortatur & fortificatur: quia cerebrum est complexionis frigidiæ & humidæ excedenter. Odor autem cum sit fumalis euaporatio vel non sit sine fumali euaporatione habet exiccare & calefacere: quare remittere habet lapsum cerebri: & ideo ipsum habet iuuare: quare natura ordinauit, vt non elongarentur a cerebro: sed intra craneum remanerent in concauitate emunctorii siue collatorij narium: & per porositates ossis narium recipiunt vapores & odores representant vsque ad ventriculum anteriorem cerebri.

Quod organa odorationis sint intra cranium cum aliorum sensuum sint extra, rationem reddit Gale. libro octauo De vsu part. cap. 6. Oportebat enim (inquit) huius quoque sensus proprium sensibile, ac obiectū alterare cerebri portionem. Aueroës autē secundo lib. collect. cap. proprio huiusce rei, curim narium, nō carunculas illas, esse vult odoris sensorium, neque, de ipsius mente, ratio Galeni valet. Etenim, vt cerebrum odores perciperet, non opus fuit sensorium esse intra cranium, nam nihil prohibet, etiam si foris sit, cerebrum odores percipere. ossa autem narium, quæ à quibusdā ἐχινოდόναι dicuntur, Galenus autem αρωγγοδόναι appellare ma- uult, maximā naturæ prudentiā ostendunt, postquam enim propugnacula hæc, quæ spongijis assimulantur primum facta sunt ad cerebri tutelam: periculum erat, ne propterea odoratus organum inuaidius foret, nisi etiam respirationem acquisiuisset. per spongiformia enim nihil facile transire potest si sola corporis sui latione feratur: nisi aut comprimatur vndique, velut à manu spongia, aut attrahatur violenter, aut propellatur. Spongiformibus igitur illis ossibus inspirationis, & expirationis actio bene perficitur, illa quidem cerebro aëre intus attrahente, hæc verò foras pellente, vnde etiam aërem per inspirationem attrahimus. Qua ex re potest solui quæstio illa inter Galenum & Aueroëm. an sensorium odoratus intra cranium sit, an exterius. Nam si esset vt statuit Aueroës, nil opus esset inspiratione odori attrahendo. sponte enim sua ingrederetur odor, si sensorium esset in cuti narium. Nunc verò cum videamus, ad odorem attra-

hendum opus esse vel longa nonnunquam inspira-
tione: non video quomodo fit aliter statuendum
de hac re, quàm vt voluit Galenus,

De anatomia nervorũ a cerebro ortorũ,
& retis mirabilis, & ossis basilaris.

Procede postea & videbis nervos duos
maiores, qui sunt in corpore nostro vo-
catos opticos: quorum origo est a substan-
tia cerebri: & si bene pcedas, videbis quod
continuati sunt cerebri substantiæ in ventri-
culis anterioribus: & extra panniculum piã
matrem antequam craneum ingrediantur
coniunguntur: quia adinuicem applicantur:
vel quia cruciatur existentes perforati in lo-
co cruciatiõis & vnionis ipsorum: vt eis fiat
unus locus comunis, ut species unius rei re-
cepta a duobus oculis: & delata p̄ duos ner-
uos ad unitatem redeat, ut una res nõ uideã-
tur duæ, sed una sicut debet: & post crucia-
tionẽ eorum ingrediuntur craneum & qui-
libet eorum ad proprium uenit oculum: cu-
ius anatomia postea declarabitur.

Post illos eleua tantum cerebrum secun-
dum medietatem eius: & uidebis secundũ
par nervorũ subtiliũ & durorũ, qui uadũt ad
oculos ad mouendũ ipsos motu uoluntario.

Postea est tertium par nervorum cuius

una pars uadit ad membra faciei, ad dandū sensum & motum uoluntarium: et alia pars eius admiscetur quarto pari.

Et istud quarum par, simul cū eo quod ei admiscetur ex tertio pari, descendit inferius ad loca diaphragmatis, & dat sensum membris inferioribus & uisceribus. Et isti ueniunt ad stomachum, & ex eis oriuntur reuersiui: quorū iuuamēta sunt dicta supra: et isti primi nerui sunt nerui uocis communes, sicut reuersiui sunt nerui proprii uocis.

Postea sunt nerui quinti paris, qui uadūt ad os petrosum quod est in radice auris ad eius foramen per panniculum cōtextum ex filis horum neruorum: & sic sunt instrumentum auditus.

Postea sunt nerui sexti paris subtiles, qui uadunt ad palatū ad dandū sensum palato.

Ultimo est septimum par neruorum, qui uadunt ad linguam ad dandum sensum gustus, & motum linguæ.

Et ex his procedendo eleua totum cerebrum: & tunc apparebunt duo panniculi inferiores existētes supra os basilare, quod est basis & fundamētū cerebri & totius capitis.

Et tūc eleua hos pāniculos duos ab olse & in medio basilaris indirecto collatorij inue-

nies rete mirabile, cōtextum textura fortis-
sima, & miraculose duplicata vel multipli-
cata ex arteriis subtilissimis adinuicem cō-
textis quæ sunt rami arteriarum apopletica-
rum ascendentium: & in isto reti siue in ve-
nis istius retis continetur spiritus vitalis af-
cendens a corde ad cerebrum, ad hoc vt fiat
animalis, & quia spiritus hic melius altera-
tur diuisus ad minima: & tunc maxime diui-
ditur ad minima, quando est contentus in
arteriis paruissimis & subtilissimis: iō istud
rete fuit contextum ex uenulis siue arteriis
minimis & subtilissimis, vt spiritus in eis cō-
tentus a cerebro faciliter alteretur & tempe-
retur, & ad formam animalis spiritus con-
uertatur licet formam perfectiorem acqui-
rat in ventriculis cerebri, sicut sanguis in vē-
triculis cordis.

Et hæc est vna ex causis: quare rete mira-
bile fuit contextum sub cerebro: vt ponit
Gal. 10. de iuuamē membro, c. 4.

Est etiam alia causa: quia membrum hoc
est dignū multa custodia: quare ipsum natu-
ra locauit in loco tutissimo: & forte etiā hoc
fecit natura: vt ex vaporibus ciborum & po-
tuum condensatis a complexione cerebri et
cadētibus deorsum: vt aliqua oppilatio ad

tempus fieret in hoc rete mirabili ex qua op-
pilatione causatur somnus: & istud rete su-
stentant duæ carnes glandosæ factæ princí-
paliter ad ipsum sustentandum & ad replē-
dum vacuitates, & ad sustentandum duas
venas ascendentes ad cerebrum & duas ar-
terias ascendentes ad ventriculos cerebri.

Post hæc omnia videbis os basilare quod
durius est cæteris: quia debet esse basis & fun-
damentum & sustentaculum omnium alio-
rum: quod autem debet alia sustentare de-
bet esse durum. Durum fuit etiam vt a su-
perfluitatibus quibus submittitur non pu-
trefiat: sed putrefactioni resistat.

Istud os diuisum est in ossa petrosa na-
rium, et oculorum: et ossa duo lateralía, que
vocantur ossa paris: & sic sunt quinque: &
hoc melius discernes si decoquas: verum ta-
men est quod ossa narium sunt multum ca-
uernosa porosa: vt superfluitates possint de-
scendere, & vapor subiectus odori ascende-
re ad cerebrum.

CVRTII.

Nerui optici sunt manifesti & possunt sensu per-
cipi, sunt enim satis crassi, & caui. oriuntur autem
vnus à dextris, alter à sinistris, deinde in acutum,
procedentes se mutuò interfecāt, dupliciter autem
possunt considerari, tum quòd se mutuò interfecēt,

rum quòd se inuicem tangat quomodo considerantur à Galeno decimo libro de vsu part. cap. 14. & ab Auic. cap. de anatom. oculorum. est autem questio, quare debeant hi nerui ita iungi. Galenus eodem in loco tres affert quorundã rationes. nonnulli enim alunt ipsam eorum priorem, & internam conuersionem, deinde rursus externam ob id factã esse quo ipsi minus patiãtur, quàm si secundum re-ctitudinem sui essent. Alij autem, vt secum inuicẽ affectus cõmunicent malumque alterius in utroque diuidatur. Quidam autem eos ita diuicari & vniri dicebant, quòd ad vnum principium copulari oportet omnium sensuum principia. has autem omnes rationes refellit Galenus. non enim necessarium est ad vnum principium copulari omnia sensuum principia: cum duæ sint aures, ne cuiq; auditus duo, qui ad aures delati nullibi se contingunt: vnus tamen est audiendi sensus, neque enim vnus sonus, duo esse apparet. Altera verò ratio appetitissimè est aduersus naturæ institutum. dictum est enim naturam geminare membra, vt vno affecto, alterum tamen integrũ remaneat. Hinc illud est notandum membra dextra non communicare cum sinistris, quemadmodum ea, quæ sunt in dextris mutuo communicant, ne scilicet læso vno mēbro, lædatur itidem alterum. Qua ex re colligitur venam non esse ex opposita parte loci affecti ferendam, quoniam malè euacuãtur materiæ per aliam partem, quàm per eam, quæ læsa est. quemadmodum etiam crises oppositæ partis non sunt bona, vt ab Hippocra. & Galeno declaratur. Prior autem ratio placet Auicennæ, cap. de anatom. neruorũ

uorum. eam tamen Galenus non probat. quoniam cerebrum dum est intra cranium non patitur. sic & nerui dum in cerebro continentur satis sunt firmati. Quare eam causam veram esse credendum est, quod hi nerui uniantur, ut et clauso vno oculo spiritus videndi ad alterum transferatur. Quae de causa qui iaculantur altero oculo ocluso certius dirigunt ictus. Alia est etiam utilitas ne scilicet res vna videatur esse gemina, quod forte fieret, si nerui non ita iuncti essent. hanc autem rem mathematicis rationibus probat Galenus. decimo libro de usu part. cap. 14. Declarans Mund. neruos à cerebro ortos, septem esse horum neruorum paria dicebat de quibus Galenus. tractat octauo libro De usu part. cap. 5. & sextodecimo, cap. 3. Neruorum autem quidam sunt molles, alij duri, ac duri quidem faciunt pro motu, molles autem pro sensu. Qui duriores sunt à dorsali medulla oriuntur, quae tamen à cerebro oriuntur. ideo factum est ut dicantur nerui à cerebro originem habere. Ex his septem paribus seu coniugationibus non transeunt per collum nisi à sexta coniugatione: & paruuli quidem nerui à tertia. Neque vero ex vlllo neruo è cerebro procedente datus est sensus brachijs aut cruribus, sed cordi, iecori, pulmoni, stomacho, intestinis, & musculis laryngis. cum enim tria sint corporis nostri membra primaria, Cerebrum, Cor, & Iecur: oportuit ea inuicem copulari. stomacho autem, quia suae inactionis sensum ad motiendam famem habere oportuit, consentaneum, fuit mollem neruum ei à cerebro demitti: qui deinde per intestina, renes, & lienem diffeminatur. Vox quoque, quoniam inter primas actio-

actiones connumeratur, (actio enim est, nō passio) Idcirco habere debuit neruos a cerebro, dātes motum musculis laryngis. Nerui igitur primæ coniugationis veniunt ad oculos, sunt autem concaui, vt ad eos magna portio spiritus deferatur. Altera coniugatio dat motum oculis, atque ij nerui duriores existunt oriūturque prope superficiem cerebri, iuxta duram meningem, non in medio cerebro, vt faciunt optici. Tertia dat linguæ sensum gustus, sicutque isti molles: qui verò ad mouendam linguam duriores sunt, ex septima coniugatione procedunt. Quarta dat neruos palato duriores. Quinta auditui, ex sexta nerui deducuntur, quos reuersiuos vocant: eorūque magna pars ad stomachū tendit. Est verò animaduertendum quòd aut errat Mundinus, aut corruptus est codex. nam quod de quarto pari neruorum dicit dicendum est de sexto. Sunt autem in homine duo sensoria, quæ binos habent neruos oculi, & lingua, vnum quidem ad motum, duriolem: alterum mollem ad sensum. Quare, inquit Gale. decimosexto de vsu part. cap. 3. ea animalia quæ aures mouent, præter molles neruos, habent etiam duos, qui faciunt ad motum. Rete autem, q̄ mirabile vocant, hoc contexitur modo. Ingrediuntur arteriæ foramina ossis basilaris, que cum tangunt durā meningem in plures ramos diuiduntur, qui se mutuò complicantes faciunt hoc rete, videtur autē hac in re sui oblita natura, quòd ijs ramis non egeat, nam eos postea ad duos ramos deducit, Verū hoc dicendum nō est, neque enim membri alicuius utilitas, ignota eius operatione, probè percipi potest, hoc autem rete factum est vt

materia pro spiritu animali concoqui possit. quem admodum in venis capillaribus chylus concoquitur, & semē in testibus: eodem modo arterias istas natura complicauit, vt in eis. spiritus vitalis & aër ad cerebrum transmissus permuretur pro generatione animalis spiritus. videmus enim, quod in cerebri ventriculis sanguis naturaliter non continetur, Sed aër, & spiritus tantum purus. Fuit autem rete collocatum supra os, quod est ad basim, vt esset in loco maximè tuto. Addit Mundinus rationem quandam, quæ fortè secundum Aristotelem possit tolerari. Quod natura fecerit hoc rete è regione colatorij, vt ex aduentu superfluitatum a cerebro obstruantur arteriæ: nam Aristoteles vult somnum fieri ex venarum obstructione. Galenus tamen aliam assignat rationem. Quod verò ad conarium attinet inquit Galen. nono libro De vsu partium, , capi. 3. ea caro glandulosa obturat os palati, ne ita spiritus alterentur ab aëre frigido. Os autem quod basilare vocant est ad basim cranij: duriusque, ait Mundinus, esse debet, tum quia fundamentum est aliorum ossium, tum etiam ne a superfluitatibus, quibus summittitur, putrefiat. est autē hoc os plurimum perforatum secundum Galeni sententiam, tametsi non omnia foramina sensu percipi probè nequeāt. tribus autem modis vni ossa tradit auctor libri, qui Introductorius inscribitur, sutura, commissura, seu iunctura, te cōglutinatione. de quibus qui plura vult videre legat Gal. nono libro de vsu part. cap. penultimo, & vltimo.

De anatomia oculorum.

POstea scinde alterutraque ossa oculorum: & videbis locum oculi, & colligantiam eius cum neruo optico: & colligantiam eius cum neruis motus oculi cum scilicet secundo pari neruorum duorum.

Apparet etiam locus eius: quia non est positus multum in profundo, quia debet recipere species in medio existentes: non eminet etiam multum extra faciem in homine ne ab exterioribus ledatur cum eos habeat valde molles & passibiles: & ideo ad eius siue eorum tutelam in homine natura ordinauit supercilia ut a rebus descendens custodiantur, & palpebras ut a rebus antea occurrentibus etiam custodiantur: ordinauit etiam tuberositates maxillarum, ut custodiantur a rebus ab inferioribus ascendens & a latere obuiantibus, sicut ab alio latere obuiant nares.

In oculo autem sunt septem tunicæ: & tres humores tunicas videbis diuidendo oculum in duas partes: plane & leuiter, scilicet in anteriorem & posteriorem. Et in anteriori sunt quatuor tunicæ: quarum tres continuantur & correspondent tribus tunicis intrinsicis: quia vni illarum scilicet corneæ non continuatur aliqua in profundo siue interius.

Prima

Prima igitur est cornea, quæ dicitur cornea: quia assimillatur cornu in substãtia & colore, quæ transparens est, & fuit transparentis quantum ad colorem vt nullius esset coloris: ne impediret receptionẽ omnis coloris: fuit etiam substãtiæ solidæ: quia rebus exterioribus est propinquissima.

1. aliam in
 2. cornea
 3. cornea
 4. cornea
 particulari
 illi. av. av.

Secunda est cõiunctiua: quia præter corneam exterius est coniungens & velans & cooperiens totum oculum.

Et huic in parte posteriori siue interiori est tertia tunica sclerotica dicta continuata cum ea: & interius circũdans totum oculũ.

Postea sub coniunctiua & cornea in parte anteriori est vnea dicta sic: quia similatur medio folliculo grani vne nigræ in cuius medio versus corneã est foramen quod dicitur pupilla, facta vt species visibilis possit puenire vsque ad crystallinam: & non impediat propter obscuritatem vne.

Et causa, quare oculus non fuit totus discoopertus hac tunica vnea, est triplex. Vna est quia ab ea suo calore viridi & puniceo siue azuro confortat spiritum visiuum cum sint medii inter extremos colores.

Secunda causa est: quia si ipsa non esset spiritus visiuus a lumine exteriori nimis resolueretur

Solueretur. Et ideo ut staret vnitus in vno loco indirecto crystallino fuit hæc tunica habens vnum foramen quod foramen pupillæ vocatur: & ideo contingit quod si hoc foramen dilatatur a natura: vel aliter quod impeditur visus, & magis impeditur quam si cōstringatur a natura.

Tertia causa est: quia omnis species rei quæ videtur peruenit ad oculum in figura pyramidalis: cuius basis est res visa: & eius conus est oculus siue eius angulus est in crystallina: quare oportet quod hoc foramen sit strictum.

Etiam dicitur vna hæc tunica, quia continet humorem vneum vel albugineum generatum ad humectandum oculum: ad hoc ut sit medium intrinsecum receptiuum specierum: & quia tale medium non potest esse nisi aëris vel aquæ a dominio & aër nõ potest ibi conseruari: ideo non fuit ibi aër, sed aqua.

Item quia illuc currit spiritus visibilis aëris a dominio: & hic humor continetur in vna vna ut prohibeat crystallinam appropinquare aëri exteriori: & ut corneam faciat distare a crystallina: etiã ut foramen pupillæ stet dilatatum: et propterea egreditur foramen vneæ:

&

& intumescit cornea. Et ideo cōtingit quod in appropinquantibus mortī, cum exiccetur hic humor, & cornea cadit & applanatur. Et tunc à vulgaribus dicitur, quod apparet tela ante oculos: & est signū infallibile mortis. Contingit etiam propter eius exiccationem constrictio pupillæ: sicut propter eius multitudinem causatur dilatatio pupillæ. & iam potuisti videre notitiā passionū quæ occultæ sunt, quæ fiunt in oculo rōne huius vucę: nisi q̄ restat aliud dicere de cataracta.

Cataracta autem fit quando vapor generatur: aut descendit à cerebro: aut ascēdit à stomacho: & peruenit indirecto pupillæ ad humorem hunc, existens inter crystallinum & pupillam: et impedit receptionem specierum. Et quia hic vapor in principio est mobilis, species representatur cum motu. Item cum de se sit coloratus mouet crystallinum secundum suum colorē: & cum species consueuerant esse rei extrinsecæ, quæ mouet visum, iudicat virtus visiva res exterius esse motas: & ideo iudicat muscas, aut cimices, vel formicas super parietem ambulare. Postea vero hic vapor in aquam conuertitur, quæ cum condensatur, in cataractam transit confirmatā: quæ si totā pupillam cooperiat

prohibet omnino visum. Si autem non op-
 pilat ex toto, aut existit à latere foraminis,
 aut in medio. Si à latere diminutam videt
 & iudicat rem esse. Si vero in medio sit iudi-
 cat rem etiam esse perforatam: quia partem
 quã videre non potest iudicat esse foramen.

Et ex his nota modum curationis catara-
 ctæ confirmatæ: quæ fit per manualem ope-
 rationem, quia nō fit quia ista cataracta pe-
 nitus extrahatur: quia antequam possit ex-
 trahi egredietur totus humor albugineus:
 sed hoc fit: quia acum imponunt perforādo
 corneam longe à pupilla, & profundāt obli-
 quæ corneam, donec sit indirecto pupillæ:
 postea ducūt acum ad locum cataractæ vel
 aquæ condensatæ: & tunc ipsam impellunt
 infra ad locum infimum: & tunc cum suffo-
 catione, & aliis rebus prohibent ipsam rea-
 scendere: & ideo talem actum non vocant
 cataractæ curatiuū: sed vocant abattere id est
 deprimere cataractam. Et sic apparet tibi
 quarta tunica quæ dicitur vuea.

Postea in parte posteriori seu interiori
 oculi est tunica quinta quæ dicitur secundi-
 na: vel quia secunda est a sclerotica: vel quia
 secundinæ assimilata.

Post istas est tunica aranea circundans
 crystal-

crystallinum versus partem anteriorem: cui in parte posteriori continuatur tunica retina: & in medio istarum continetur humor vitreus: & in medio eius est humor crystallinus: rotundus siue figurę sphericę cum quadam planicie in parte anteriori: & hic humor est magis versus partem anteriorem quam humor vitreus in quo locatur: & ideo hic humor vitreus factus est ad crystallinũ locandum: & ad ipsum nutriendum. Et ex his completa est anatomia oculi.

CVRTII.

Videtur Mundinus, in exponenda oculorũ anatomia, diuersus esse ab aliorum sententia: ac præcipue de cornea. Ego verò primum dicam quæ mihi videntur esse ad Galeni mentem. Ipse igitur decimo libro De vsu part. cap. 1. vsque ad octauum declarat vsus oculorum, tres autem esse humores in oculo nemo est qui neget. ex quibus qui crystallinus dicitur, lucidissimus est, quoniam est primum videnti instrumentum, vt inquit Galen. libro eodẽ, cap. 1. tamen si cap. 6. dicere videatur *αεαχωδεν* tunnicam, quæ est statim supra crystallinum, leuior & tersior omnibus speculis, esse primum videnti organum. Quare Auer. secundo libro collect. inquit visum consistere aut in tunica aranea, aut in crystallino humore. Ego verò crediderim vtraque hæc esse vnum instrumentum, in quo fiat visio. quòd autem iste humor sit visus instrumentum, ex anatome, inquit Galen. cognosci potest. videmus

de Anat. c. 10.
li. vidi so.

Arcul. in en
de ophthal. r.
ix. ad Alpa

Tres sunt hu
moris in oculis.

Crystall.

enim eum esse medium omnium: cæterasque partes ita esse distributas, ut huic deseruiant. Præterea nulla oculi pars magis splendet, quàm hæc: est autem iste humor rotundus, ut magis à noxijs rebus abesset. planus etiam ut visa imprimerentur certius in superficie. Ante hunc humorem est albugineus humor, qui maximè assimilatur albugini oui. replètque eum locum, qui est inter crystallinum humorem, & corneam tunicam. Eius autem utilitates sunt, primùm ea, quæ dicta est: deinde ut humectetur tunica, quæ vicia dicitur: ne scilicet durior facta lædat crystallinum humorem. Facit præterea ut cornea extensa sit: ubi enim ea corrugatur, visus læditur: quod accidit senibus, ipsi enim ob humiditatis defectum corrugatur ea tunica, quare visus ipsi minimè est acutus. Est verò pellucidus, ut res ad crystallinum transeant, hinc fit ut visa non eadem nobis appareant, si quando humor iste obscurus fuerit. si enim in eo sint nigri vapores, visa apparent nigra: si rubri, rubra: atque aliter etiã secundum varietatem vasorum, ibi existētium. Hic autē humor, si sit paucus facit ut magis niger esse oculus videatur: quemadmodum secundo libro Artis med. declarat Galenus. Succedit deinceps tunica, quæ ἑξυοδῆς hoc est vicia similis dicitur (vicia vocant nostri) hanc, n. ita nominant, ut ait Galen. decimo De vsu part. cap. 4. assimilantes, opinor, vicia ἑξυι hoc est racemo tum leuitatem, tum externam asperitatem. Perforauit autem natura hæc tunicam ubi pupilla est, ut visa ad crystallinum possent penetrare, facta autem est externè duriuscula ne facilè lædatur, internè autē mollior ne lædat

dat, illam etiam vtilitatem prebet, quod corneam
 per venas nutrit: neque enim cornea nutrimentum
 attrahere de longinquo potest, nec venas in seip-
 sam recipit, vt quæ dura, & densa, & subtilis exi-
 stat. In posteriori parte humor est vitreus *vitreus*
 us, nam cum ex sanguine nutrirî crystallinũ opor-
 teat, nutrirî autem ex ipso fere non mutato sangui-
 ne, adeo multum qualitatibus distate, erat impos-
 sibile, familiariori autem nutrimento ei erat opus.
 est igitur factum à natura idoneum nutrimentum
 humor vitreus: qui quanto crassior & albior est
 sanguine, tantum à crystallino vincitur, & humi-
 ditate & albedine. Postea est tunica que retina di-
 citur, neruosa, vt sensum deferat ad crystallinum:
 per eamque transeat sanguis ad vitreum humorẽ.
 Post hanc est, secundina dicta, ad similitudinem se-
 cundinæ, constat enim ex multis venis, quæ defe-
 rant nutrimentum retinæ & corneæ. Et etiam *οχλα*
ροτις hoc est aspera & dura, quæ à cornea oritur:
 facta ad tuendum oculum. Humores igitur nemini
 dubium est quominus sint hi qui dicti sunt. Albu-
 gineus extrinsecus est, in posteriori parte est vitre-
 us, in medio crystallinus. De tunicis verò magna
 est controuersia, nonnulli enim septem eas esse vo-
 lunt: quidam sex: alij quatuor: sunt etiam qui duas
 tantum esse eas velint. Sciendum est quod ad con-
 stitutionem oculi trãsmittit natura neruos opticos,
 cū verò cerebrum molli & dura meninge operia-
 tur, ab his operiri etiam neruos è cerebro prodeun-
 tes, par est, cum verò progressi sunt sic ex illis po-
 sterior quidẽ tunica retiformis, anterior verò ara-
 neæ similis, hæc tunica continet vitreum & crystal-
 linũ

linum humorem. Deinde è neruo statim progreditur meninx mollis, quæ ob similitudinem secundina dicitur: quæ facit tunicas posterior quidem secundinâ, ante vero vucam. hæc albugineum humorem continet: est que propè corneam ita perforata (vt dictum est) vt possit pupilla apparere. Ex dura autem meninge tunica oritur quæ ante corneam posterior schlirotica dicitur. Ex his manifestum esse opinor tres esse re ipsa distinctas tunicas, quæ, quoniam singulæ duo habent nomina, vnum quidem quo pars anterior, alterum quo posterior nuncupatur, factum est, vt sex esse tunicæ dicerentur. Præter has autem, ex pericranio oritur alia tunica, quæ quibusdam coniunctiua dicitur: hæc musculos continet, quibus oculi mouentur, alligat vero etiam oculum cranio. habet præterea quandam pinguedinem, ex qua albedo apparet. ea tamẽ totum oculum non contegit, eam enim partem, in qua apparet cornea, relinquit. Quoniam vero dictum est diuersas fuisse de harum tunicarum numero scriptorũ sententias, videamus quibus rationibus moti hi quidem septem statuerent tunicas, illi vero sex, alij quatuor, nonnulli etiam duas tantum. Nam qui septem ponebant tunicas, eas ita disponebant, vt prius dictum est. Qui vero sex tunicas defendebant, ἀραχνώδην tunicam id est araneæ similem excludebant. quod facit etiam Gale. eam enim turecæ nomine appellare non dignatur, quoniam difficulter visu percipi possit, nos tamen eam aliquando vidimus. Qui quinque tunicas asseriebant excludebant etiam retiformem, quoniam Galeno teste, tunica nullo modo sit neque colore, neque substan-

stantia. Fuere qui dicerent coniunctiuam non esse tunicam, sed tegmen, & ductum quendam musculorum ad oculos: ideo quatuor tantum esse tunicas voluerunt. Quod si voluerimus tres esse tunicas, dicendum erit corneam & schliroticam esse vnā tantum: itidem vueam, & secundinam vnā esse: sic & retiformē, & araneam: sicut iam diximus. Qui vero duas tantum esse asserabant corneam, & schliroticam sub vna, sub altera vueam & secundinam connumerabant: reliquas vero omnes excludebant. Mundinus autem enumerās tunicas non vult corneam schliroticæ respondere, sed coniunctiuam. Ego existimo corneam schliroticæ respondere, quia ea pars, quæ dicitur Iris omnes habet partes sibi mutuo vnitas & applicatas. Est autem Iris pars ea, quæ est circa orbem oculi, variisq; coloris existit ad iridis cœlestis figuram. Cum vero inquit Mundinus oportuisse foramen vuee esse paruum, quoniam visa ad oculum veniunt in figura pyramidis, cuius basis est res visa, conus autem est oculus, itaque debuit foramen illud esse strictum, quoniam melius conus pyramidis terminatur in rem strictam. ratio hō valet, quoniam si conus pyramidis imprimitur in stricto foramine, quid prohibet quin eo melius in latiori imprimatur? Quare eam causam veram esse dicendum est, quod angustum fuerit, ne spiritus dissipentur. Nunc oculorum ægritudines percurramus. Dilatio pupillæ, inquit Mundinus, fit propter vueæ dilationem. De hac re latius tractat Gale. libro quarto de symptom. causis, capi. 2. vult enim pupillā posse astringi vel propterea quod vuea laxetur, adeo vicius

Et tvt effet sonora: cuius foramē est longum terminatū ad os petrosū in cuius concauitate est spiritus audibilis complantatus, qui est instrumentum auditus.

Et eius foramē vel cauernositates coope- rit pāniculus subtilis contextus ex villis neruorum auditus iam supradictorum.

Ossa autem alia quæ sunt infra basilare, non bene ad sensum apparent nisi ossa illa decoquantur, sed propter peccatum dimittere consueui. Verum est quod de mandibularum ossibus potes videre principium & finem. Incipiunt enim à commissura siue ad orea, quæ est inter craneum & basilare in loco qui est in fine supercilii & frontis: & procedit versus partem posteriorem iuxta os petrosū, & ad auriculā terminatur, aut ad dentes: quorū anatomiam supra dixi.

GVRTII.

Est Aristot. ratio, secundo libro De part. animal. cap. 10. ob quam aures esse debuerint à lateribus, quoniam, inquit, auditur non modo per directum, sed etiam vndique. Verum hæc ratio mihi magis videtur probare quod potuerint aures locari à lateribus: non autem quod non potuerint locari ante. Quare dicendum est positas nō fuisse ante, quia nullus pro his reliquus erat locus. cur vero si guram habeant rotundā, multosque anfractus, cur ue sint cartilaginosa, cur etiam promineāt refer-

tur à Galeno vndecimo libro De vsu part. cap. 12. neque mihi ea hoc loco sunt referenda. neruus vero cis durior est datus quoniam noxijs rebus magis sunt oppositæ, quàm reliqua sensus instrumenta. quid autem sit auditus organum quæritur, nam Mundinus videtur velle esse spiritum existentem in quodam quasi tympano, ex neruis auris facto. eandem videtur habere sententiam Aristoteles secundo libro De part. anim. capi. 10. Galen. tamen octauo De vsu part. capi. 6. & Auer. ipse secundo libro collect. volunt neruum, qui à cerebro ad aures defertur, esse organum auditus: nam aër nō sentit, quod si velit quis p̄ aërem interpretari spiritū, eadem ratione dicendum esset spiritum esse organum visus. cum vero os auris esse non possit organum relinquitur neruus pro audiendi instrumento. Possumus tamen Aristotelem tueri. quod aër illé ambiens sint instrumentum apparans vt neruus ille vocem recipiat.

De anatomia spondilium.

Capite expedito diuide secundum longitudinem totū corpus in duas partes, incipiens à collo vsq; ad caudam.

Et tibi primo occurrit collum factū propter pulmonē & tracheam arteriam in animalibus respirantibus, in quo sunt septem spondiles: & hæ spondiles sunt graciliores & subtiliores alijs: quia ab alijs debent sustentari & portari. delatum autem debet esse leuius deferente; licet, n, sint subtiliores alijs, for-

foramen habent maius: quia nucha est grossior in collo quā in aliqua parte spōdylum: quia ibi est principium eius: et quia sunt graciles hæ spondyles fuerunt duræ & firmiter continuatę vt non accidat dislocatio & lesio ab obuiantibus extrinsecus.

Post istos sunt spondyles costarum qui sunt. 12. sicut sunt costę. 12. septem verę, & quinque mendosę.

Postea sunt spondyles renum quę sunt quinę, & sunt valde grossę & magnę cum sint sicut fundamentum & sustentamentum omnium aliarum & basis.

Postea sunt spondyles alhauis siue alhoius, quę sunt implicatura, quę est à dorso ad caudam: & sunt tres minores prædictis: quia debet cōtinuari cum ossibus siue spondylibus caudę quę sunt parue.

Ultimo sunt spondyles caudę siue alhosos, verum est quod hic debes notare differentias harum spondylum, quę sunt in foraminibus earum per quę transeunt paria nervorum & diuersitates etiam earum in aliis siue additamentis siue sementis vt nominat Auic. Sed hæ diuersitates magis sunt notę in corpore decocto vel pfecte exiccato: et ideo nō cyres; sed forte alias faciam anatomiam

in tali, & scribam quæ ad sensum videbo: vt
 proposui à principio. In quolibet tamen
 spondylo est nucha, quæ est medulla similis
 substantiæ cerebri: nisi quia viscosior est &
 solidior, facta vt ab ipsa tribuatur sensus &
 motus toti corpori à capite inferius. Et quia
 orta est à cerebro diuiso secundum dextrum
 & sinistram: hinc est quod in superficie eius
 apparet filum diuidens eam per medium
 scilicet dextrum & sinistram: tamen non pe-
 netrat hæc diuisio vel separatio secundum
 profundum: quia nucha est orta à parte poste-
 riori cerebri, quæ non est diuisa secundum
 profundum. Et ex hac diuisione siue separa-
 tione nuchæ tibi potest apparere causa quæ
 oppilatio potest contingere in media parte
 nuchæ, et non erit in alia parte: & ideo para-
 lysis potest in vna parte vt dextra v'l sinistra
 contingere & nõ in alia. A nucha autem in
 qualibet spondyli oritur vnum par neruo-
 rum qui vadunt ad dandum sensum & mo-
 tum membris determinatis. Quæ autem
 sunt membra ad quæ perueniunt nervi illi
 non potest bene in tali anatomia videri: sed
 oporteret animal liquefieri in aqua pluuiæ
 li: & hoc nõ spectat ad præsens: & si vis hæc
 membra cognoscere lege in prima sen primi

cañ. summa secunda. cap. de anatomia neruorum ortorum à nuca.

Et quia spondyles sunt. xxx. paria neruorum sunt. xxx. & quia à cauda oritur vnum erunt. xxx. paria, & vnus neruus.

CVRTII.

Dorsum est ex pluribus ossibus coniunctum, in quibus est medulla, quæ dorsalis dicitur. propriè tamen ea pars dorsum dicitur, in qua sunt duodecim costæ. Dorsum autem dedit natura (vt inquit Gal. duodecimo libro De vsu partium, cap. 10.) animalibus velut carinam quãdam corporis. propter dorsum enim recti possumus ambulare. neq; hanc solam habet vtilitatem. Sed etiam intus excavauit omnes spondylos. deinde non ex simplici & continuo osse factum est, sed ex quatuor & viginti, præter os amplum, quod est in fine suppositum, oportuit enim hominem inflecti, rursusque erigi, quod fieri non posset si ex vno tantum osse constaret dorsum. præcipuè vero factum est propter dorsalem medullam, quam ob causam cauum etiam est. diuiditur autè maximè in quatuor partes, cololum, metaphrenum, lumbum, & os vocatum ab aliquibus *ἱερόν*, idest sacrum, à quibusdam vero *πλάτυν* idest amplum, quod vero interpretes dixerint os sacrum est quia fortè non aduerterunt *ἱερόν* græcis non sacrum modo, verum etiam magnum significare. Spondyli igitur secundum Galenum sunt quatuor & viginti, vsque ad os magnum, in quibus inferiora sunt superioribus semper maiora: nisi fortè quispiam malè compositus esset. Quod autem

autem os est infra vigesimum quartum spondyliū compositum est ex quatuor. Auic. tamen diuidit in duo scilicet os Alauis, & Alosos, quorum vnū quodque in tres spondylos diuiditur. facit autē hoc os quendam sinum in quem recipitur matrix, & re-ctum intestinum: atque hæc quibusdam ossis foraminibus alligantur. per quæ etiam foramina anterioris alligatur os pectinis. colli autem spondyli sunt quidē reliquis minores sed magis caui: Ex his plures neruorum oriuntur coniugationes. ac quemadmodum ossa secundum aliquos sunt triginta, totidem erunt etiam neruorum coniugationes, addita alia coniugatione: quæ est inferius. Cerebrum vero & spinalem medullā in ea re conuenire inquit Galenus quod vtraque operiuntur molli & dura meninge: differunt tamen quod cerebrū mouetur, medulla minimè, quare cerebro nō adhæret dura meninx, vt possit moueri: medullæ vero adheret, quoniam eam moueri nil opus fuerat, tum vero ne læderetur, cum homo inflectitur, natura instituit panniculum durum, qui eam velet medullam, est enim in ossibus, quibus moueri contingit, cerebri autem ossa non mouentur. Quod vero medulla hæc diuidatur, inditio est, vt iuquit Auic. quod vna parte læsa, altera seruari potest integra. Quæ de spondylis restant, ex Galeno peti possunt duodecimo, et decimo tertio libro de vsu partium.

De anatomia brachij & manus.

His expeditis excortica brachium & pedē & incipe à brachio & excortica leuiter vt videas venas supradictas quæ veniūt

ad

ad curuaturam brachii: & tunc videbis venam supradictā quæ penetrat per subassellam ad brachium, & procedit per domesticam partem brachii: & in parte inferiori cubiti apparet & vocatur basilica.

Et in superiori parte cubiti est cephalica quæ euacuat à capite, quæ ad brachium venit supra ad furculam orta à venâ ascēdente ad caput: vt supra dixi.

Et in medio istarum est vnus ramus continuatus in curuatura brachii cū ambabus: & hæc vocatur media: quæ media est vel alio nomine vocatur communis. Quælibet tamen harum duarum procedit vltèrius vsq; ad manum: & in syluestri parte manus apparent: & illa quæ est inter auricularem & annularem dicitur sceilen & correspondet basilicæ. Quæ vero est inter pollicem et in dicem dicitur saluatella & flobotomatur loco cephalicæ. Quæ vero est in medio dicitur funis brachii, & retinet locum communis siue mediæ.

Post venas musculos multos notabis & chordas multas magnas et grossas: quarum anatomiam perfectam in tali corpore non labores inuenire, sed in corpore exiccato ad solem per trienium vt alias monstraui: &

numerum eorum perfecte declaravi: & anatomiam talium muscutorum brachii, & manus, & pedum scripsi in lectura, quam feci super primo, secundo, & tertio, & quarto de iuramentis.

Eleua igitur carnositatem totam usque ad ossa: & primo inuenies os quod vocat adiutorium. Verum est tamen quod supra dorsum siue pectus à latere posteriori est spatula habens figuram similem ad modum spatule lignee: quod os latum est inferius: ut pectus & costas non impediatur: strictum vero est superius ut adiutorio confirmetur: & ideo in eius extremo superiori habet aliquam concauitatem superficialem ad modum concauitatis rotunde: in qua ut reuoluatur adiutorium situata est extremitas rotunda adiutorii: cuius caput primum est rotundum locatum in pilside ossis spatule: postea in medio obliquat versus domesticam partem ut plicatio & amplexatio rerum sit possibilior. Extremum aliud habet quasi duas eminentias: quia duobus focilibus debet coniungi: & in medio partium eminentiam habentium habet magis supra quandam concauitatem in quam ingreditur extremitas focalis inferioris: quae facta est ad modum instrumenti hauriendi

hauriendi aquam: vt firmior sit coniunctio & colligantia: & ideo dislocatio raro & difficulter fit in hac iunctura. Et quādo fit raro est quod bene possit restaurari. Et facile inferius est longius superiori: quia conuenientius est quod illud quod sustentat alterum sit longius: & maius eo quod sustentatur. ambo tamen conueniunt: quia sunt grossiora in extremis quam in medio: quia ab extremis debēt oriri ligamenta & iuncture: & in medio debent situari muscoli: & facile superius non procedit directe: sicut inferius: vt sit causa cōplicationis manus & brachii.

Post ista duo focilia est raseta: cuius ossa fuerūt plurificata: vt possit manus in planta eius plicari & contrahi ad continendum res fluidas & currentes: & fuerūt ossa eius octo in duabus aciebus: in qualibet acie quatuor.

Postea sunt ossa pectinis denominata sic à forma & figura pectinis: & sic sunt quatuor quæ correspondent quatuor digitis. nā polici nō respondet aliquod os pectinis: quia plex nō est in eadem acie cum aliis digitis.

Postea sunt digiti quinque in domestica parte quorūcunque videbis carnem vt quādo complicantur ad aliquid capiendum ne ledantur: quæ tangūtur & capiuntur: & etiā

ne digiti inter se confricando ledantur. A lateribus etiam eorū est caro vt inter ipsos complicatos non, accidat vacuitas aliqua. Ex parte vero siluestri non est tanta multitudo carnis: quia digiti non coniunguntur versus partem siluestrem.

Post carnem vero sunt chorde: quarum vna quæq; propria ad proprium venit digitum: & illa quæ per superiorem seu per anteriorem partem venit digiti ingreditur per medium: iuncture tendens inferius: quia equitare eam non potest: vt fit tuta à nociuis: & propter hoc superior magis est profundior inferiori: & longius habet procedere. Item nō equitat eam ne tumor & ineptitudo fiat in digitis: nō autē procedit in aliquo laterū: quia ossi proprio debet coniungi in medio directe superius vel inferius non à latere.

C V R T I I.

Cum in hoc membro plura inueniantur Mundanus tamen venarum, & ossium. dissectionem pertractat, omissis neruis, chordis, musculis, & arterijs. Enumerat igitur sex venas, quæ secari solent, prior est basilica, quæ à quibusdam axillaris, à nonnullis etiam vena interior brachij dicitur. Altera est cephalica, quæ Galeno vocatur humeralis. Ex his fit vena quæ communis dicitur, nigram vocat Auicenna. hæ licet in media brachij curuatura iungantur,

gantur, reliquum tamen earum descendit, ac basilica quidem per interiorem partem brachij, cephalica verò per exteriorem, communis per medium. itaq; sex venę ab Auicē. cōnumerantur per quas potest mīti sanguis: cephalica, basilica, communis, ascellaris, quę est ramus basilica: funis brachij, quę est ramus cephalicę descendētis: & quę ab ipso vocatur sceylen neque vllam nominat saluatellā, vt Mundinus, qui etiam pro fune brachij enumerat eam, quę est inter pollicem, & indicem, Gale. tertio libro De anatom. aggr. & libro De venar. dissectione, & Auic. prima primi, cap. de anatom. venarum, in hoc conueniunt, quòd ex illis duabus venis quę à vena caua veniunt cephalica propè brachij iuncturam in tres ramos diuiditur, quorū vnus profundę carni immittitur: alter procedit vt cū basilica iungatur: ex tertio fit ea, quę funis brachij dicitur. Basilica autem etiam ipsa in plures ramos diuiditur, quorum vnus ad manum vsque demittitur. Quoniam verò dicere viderur Auicē. quòd venę, cum sunt in raseta, ita iunguntur, vt vna tantum vena videri possint: cum venę, quę veniunt inter alios digitos sint potius rami venę communis: Sciendum est quòd vena communis, quę transit ad partes manus viderur iungi cum basilica, quę descendit: vnde etiam ramus ille basilicę, qui per carnem profundum transit, egreditur, iungiturque hīs, & secatur in passionibus hepatis. rami autem qui sunt in manu, rami potius sunt venę cōmunis quam basilicę aut cephalicę. cuius sectio & si in cōmunibus passionibus prodesse deberet: vsu tamen compertum est, quòd venę eius sectio, quę

est inter annularem & medium digitum cōfert affecto splene: modo sanguinem sponte sua mitti patiamur. vt inquit Gale. in libro De sanguinis missione. hac tamen in re illud addebat Auicenna, vt manus in c. lida aqua detineretur, quò melius exiret sanguis. De vena autem quæ est inter indicem & pollicem reminem inueni qui meminere. Galenus quidem libro de sanguinis missione iuxta finem meminir de secunda arteria eius loci. inquit enim, Sane vero quæ mihi extiterit occasio secundæ arterie iam nunc edisseram: monitus per quendam in somnia, quorum duo perspicuo mihi visa sunt accessi ad dextræ manus arteriam inter indicem & pollicem licam, siuisque fluere donec sponte sanguis silteretur (nam ita somnium præceperat) Exfluxit autem non tota libra. Subitò itaque extinctus est illo maxime in locò fixus diurnus dolor, quæ septo transuerso committitur iccur. Videtur tamē sensu percipi, quòd in quibusdam cephalica veniat inter pollicem et indicem: atq; in ijs missio sanguinis per hanc venam prodest in capitis affectionibus. tribus autem modis de mente Galeni contingit variari eius loci venas. quòd plurimum tamen vsu venit est, vt vena communis, quæ efficitur à basilica, & cephalica, sit maior, quandoque igitur contingit tres illas uenas esse inæquales, aliquando vt altera lateat, vel propter eam quod parua sit, vel quod profunda descendat. nonnunquam vnica tantum apparet. Venæ autem, quæ intra brachij curuaturam sunt quandoque omnes absconduntur, non ita tamen quin vna saltem in curuatura ipsa appareat; quare medici iubent, vt si vna non inueniatur

niatur, secetur altera: qui vero ramus communis
 veng est inter indicem & pollicem raro inuenitur
 quod si constaret esse ramum cephalicę eius sec-
 tio prodesset in capitis affectionibus: sed quoniã
 id minimè cõstat, melius fuerit cephalicam ipsam
 secare: in iisdem etiã affectionibus vena ea vti-
 liter secatur, quę est inter medium & annularem
 digitum dextrę manus. Basilica autẽ in ramo ma-
 gno secari non debet vt inquit Galen. tertio libro
 de anatom. aggress. quoniã illi subest arteria, plu-
 rimòsque ait ex ea sectione interisse, etenim ea ar-
 teria satis est magna quare basilicę ramus eo in
 loco est ferendus vbi cū cephalicã iungitur. hoc
 autem fit in ijs passionibus, quę sunt circa collum,
 quod si non apparet, ferendus est ramus, qui in-
 terius per brachium defertur: qui si etiã lateret,
 secandum est comunẽ: aut, si hæc que que non ap-
 pareat, ramum cephalicę, qui cum basilica iungi-
 tur, demum si hic non appareat secare oportet ce-
 phalicam. Verumtamen si tuto posset ex basilicę
 ramo magno mitti sanguis, nil melius. In capitis
 autem passionibus secatur cephalicã: deinde, si hæc
 non appareat, eius ramus, qui venit ad brachium:
 eo autem etiã non apparense secanda est cõmu-
 nis vena, quę si lateat ferendus est alius ramus ce-
 phalicę, qui per brachium descendit. Postremo si
 hic etiam appareat secetur ramus basilicę, qui ce-
 phalicę iungitur. His dictis, nũc ad ossa veniamus.
 Primum autem, quod occurrit est os, quod Mundi-
 no dicitur adiutorium, sunt autẽ duo ossa, lata quę
 à ceruice vtrinque ad scapulas tendunt, nostri Sco-
 pula operta, *ωμιπλατας* gręci nominant. ossis hu-

3 nil mel
 ius q̄ san
 qui. ex
 vena bas
 nihil si
 fieri po

ius latitudo, inquit Mund. hanc habet utilitatem, quod non impedit musculos pectoris. Sed huius etiam alij sunt vsus, cum ut sua cautate recipiat adiutorium, tum ut pectus ab extrinsecis, quæ à posteriori parte inferri possent, tueatur, alia enim auxilia posuit natura parti anteriori, ut oculos, ut manus, atque ea de causa quod non possumus posteriora tutari manibus prudenter natura fecit ut noxijs rebus opponeret tum dorsum cum suis alis, tum scoptula operata. Os autem (ut illuc redeamus) quod adiutorium dicitur Galenus vocat brachiū, veteres interpretes dixerunt vlnam, affigiturque scapulis, et itaque in medio flexum. hoc autem os ad eam extremitatem, quæ est versus cubitum iungitur duobus fociibus dictis. Sunt autem infra cubitum duo ossa quorū inferius πῆχυς, superius κερκίς dicitur. Quidam dixerunt focile inferius, & superius. horum extremitas figurā habet similem χ græce literæ. Quod vero ad eam partem attinet quam vocat rasera κέρπος autem græce dicitur, estque prima pars palme. Galenus quærens causam numeri horum ossium secundo libro De vsu part. capi. 10. ita inquit. Sed propter quid metacarpium quidē ex quatuor carpus autem octo ossibus constat. Videatur autem propter hoc metacarpium constare ex quatuor ossibus, quoniam quinque existentibus digitis numero, magnus quidem in carpo, alij vero in metacarpio articulantur, ossa quidem metacarpij distant, quoniam distantibus ossibus digitorum prælocata sunt. ossa vero metacarpi omnia se mutuo contingunt paulo post declarat qua ratione tribus existentibus ordinibus medijs inier, vlnam & digi-

digitorum diuisionē, primus ex tribus ossibus con-
 ster; alter ex quatuor, tertius ex quinque, quorum
 vnū est magni digiti reliqua metacarpj. De ossi-
 bus autem digitorum & quæ habeant vsum la-
 rissimè pertracta Galen. primo libro de vsu part.
 cap. 12. & deinceps vsque in finem libri. Quod
 vero inquit Mund, carnē esse in anteriori digito-
 rum parte ne ossa ex fricatione aliquod afferāt de-
 trimentū, nō valet, quia ossa se mutuo tangunt nil
 tamē efficiunt. vbi vero ossa cōmittūtur simul nō
 est caro, quoniā vt inquit Galen. motū impediret.

De anatomia cruris & pedis.

VLtimo autem deueniemus ad ossa quę
 sunt fundamenta totius & supportan-
 tia omnia: & sunt ossa inferiora.

Ante tamen quam ad ossa perueniamus
 excoria cutem subtilissime vt inuenias ve-
 nas duas descendentes: quę ramificate sunt
 a trunco vene cylis descendentes: que quan-
 do est in fine spondylium renum ramificat
 in duos ramos: quorum vnus transit: ad ti-
 biam dextram: & alter ad sinistram: quod
 potest videri ad sensum: & eodem modo ra-
 mificatur arteria descendens.

Postea quilibet illorum truncorum ra-
 mificatur in duos magnos ramos: quorum
 vnus directe descēdit per domesticam par-
 tem tibię vsq; ad digitos pedis: & hæc voca-

tur saphena: quæ propter directionem suã
flobothomata euacuat a membris naturali-
bus et genitalibus vt a matrice renibus testi-
culis: & huiusmodi: & apparet supra genu
& infra supra cauculam: & infra in calca-
neo: & apparet in pectine pedis.

Alius ramus obliquatur & ingreditur
iuxta iuncturam scie: & ideo vocatur sciati-
ca: & propter obliquationem quam habet
circa has iuncturas flobothomata magis e-
uacuat in passionibus iuncturarum: & ap-
paret in omnibus predictis locis: in parte ta-
men siluestri.

Postea eleua musculos & chordas & vi-
de ossa. Et primum est os femoris supra q̃
fabricati sunt spondyles dorsi: & per conse-
quens totum corpus. In parte inferiori ha-
bet pixidem quandam: in cuius concavita-
te locata est extremitas rotunda cãne coxe:
quæ vertebrum vocatur. & in medio ambo-
rum in parte interiori est quoddam ligamẽ-
tum quod potest vocari vertebrum: & quã-
do hoc vel primum resilit foras: tunc neces-
se est hominem claudicare: quia crus hoc e-
longatur & firmari non potest: nec totũ po-
test bene supportari: & necesse est vt crus
tabescat: quia uene quæ pertranseunt infe-
rius

rius propter oppressionem & obliquationē quodammodo oppilantur: licet non perfecte & iunctura hæc istorum ossium vocatur scia: vnde dolor eius vocatur sciaticus.

postea videbis os quod nominatur cāna coxæ quod est maius omnibus ossibus que sint in corpore, quia debet esse sustentamentum totius corporis: quod concavitatem habuit magnam, vt esset leue: & vt multā medullam retineret: & quia melius sustentare potest quando non stat perpendiculariter. sed quando secundum extrema plicatū est versus domesticam: & in medio plicatū est & conuexum. hinc est quod non est rectum omnino: sed id est plicatum secundum modum dictum.

Post ipsum in iunctura genu sunt duo fossilia tibiæ versus tamē partem anteriorem in iunctura illa est os quod vocatur patella siue rotula factum ad modum patellæ siue rotullæ vt iunctura sit fortior facta ex ligamentis: ac si per nodum fuissent ligata.

Et facile maius est in domestico & grossius: quia illud habet maius onus corporis sustentare.

Minus autem & subtilius est in parte siluestrinon perueniens ad iuncturam: quia

de magis potest videri in homine exiccato quam recenter anathomizato: sicut alias de claravi ad sensum: quādo legi librum de iuamentis membrorum vnum.

Tamen scias quod corde extendentes digitos pedis oriuntur a musculis qui sunt in tibia in parte siluestri: sed contrahentes digitos oriuntur a musculis: qui sunt in planta pedis nam pars inferior pedis fuit carnosamultum: propterea vt pes magis figeretur & cutis ab osibus & a terra non cōterrere- tur, & ideo in planta pedum rationabiliter musculi contrahentes digitos fuerunt locati: sed musculi extendentes digitos non potuerunt locari in parte superiori, quia pars superior, debet esse excarnata ne aggrauet pedem.

FINIS.

CVRTII

Explicans Mundinus anatomiam cruris primū de venis, deinde de osibus agit atque venam ca- uam cum est in fine spondylorum, diuidi, eiusque ramum vnum ad dextram, alterum ad sinistram partem tendere. ac ille quidem, qui ad dextram venit partem, est in interiori parte: appellaturque, inquit saphena, quæ in affectionibus matricis, & vesicæ, nonnunquam etiam & renū vtiliter in pol- lice, & pedis extrema parte secatur, alter autem ra-
mus

mus ad partem tendit exteriorem diciturque vena
 Sciatica ex eaque mittit sanguis, in affectionibus
 sciæ & iuncturarum. Videtur autem Mūdinus vel
 le has venas in poplitem nō venire, sed ipsum trās-
 gredi. Verūm Galenus, septimo lib. aphor. 49. &
 sexto, aphor. 36. inquit venam vnam venire ad po-
 plitem quæ postea ad pedem dupliciter diuidatur.
 veng igitur pedis veniunt à poplite, itaque de Ga-
 leni mente nil refert hanc, vel illam seces: cum ab
 eodem principio demittantur, ac quamlibet feri-
 as, euatuetur è vena poplitis. Ea de causa cū Hip-
 pocratis codex diceret. **IN PASSIONIBVS**
Vesicæ veng sectio soluit: Secare autem oportet in
 teriorem. Galenus nihil interesse ait exteriore se-
 cetur, an interior, propterea illum Aphorismum
 Hippocratis non esse contendit, sed supposititium
 quendam. Auicenna tamen quarta primi. capi. 20.
 inquit. Et ratio quidem facit, oportere vt sciatica
 & saphena similis existant iuuenti. Sed experi-
 mentum facit, vt operatio sciaticæ plurimum con-
 ueniat dolori sciæ. His dictis ad alteram partem
 veniamus in qua de ossibus agitur. os autem illud
 quod Mund. vocat os femoris, latini nonnulli fe-
 mur appellant, alij nomine femoris significari vo-
 lunt ossa pubis. Quæ autē nos anchas vocamus
 græci ἰσχίον nominant. os vero coxæ quandam ha-
 bet magnā rotunditatem, qua ingreditur concaui-
 tatē ossis femoris oportet autē superiora repetere, nā
 in fine spōdylorū renū quo loco esse os sacrū dixi-
 mus, illud os duo alia ossa habet adnata, ac pars
 anterior os pubis dicitur, superior os ilis, posterior
 os anchæ, quæ vero pars cōcauitatē hēt os pyxidīs
 nomi-

nominatur. quam cavitatem ingreditur caput of-
 fis coxæ, vertebrum dictum. Iam verò os coxæ
 græci μέσος appellant, quidam Galeni interpretes
 dixerunt crus iungitur in genū cum quadam rotu-
 la, quæ ἐπιγονάτις, siue ἐύλη græcè dicitur. Vt au-
 tem pedis vsus cognoscamus optimum fuerit secū-
 dum eam regulam, quā vsq; ab initio retulimus
 operationes ipsius cognoscere. Est igitur pedis toti-
 us (quem græci σκέλος nominant, nos latinum no-
 men non habemus) munus primum vt ambulet,
 quod vt faciat duo potissimum requiruntur, cū ut
 vna tibia firma sit, altera moueatur. ea de causa
 ita compositum esse hoc membrum oportuit, vt
 & firmari & moueri posset. est autem reddenda
 ratio cur natura ceteris animantibus non eandem
 pedis figuram dederit, quam homini. Sanè in ho-
 mine pes non ad ambulandum modò, verum etiā
 apprehendendum est institutus, itaque non eandē
 habuit cum brutis constructionem. equi enim pes,
 ex vngula duriore est factus, quæ pedem tueretur
 quæ res in homine superflua fuisset, cum rationem
 habeat, qua ad pedum tutelam calceos sibi cōpa-
 rare potest. atque equo pes rotundus est ad motus
 velocitatem aptus, homini verò non velox mo-
 tus sed ratione moderatus conuenit. Quoniam ve-
 ro dictum est pedem ad apprehendendum esse fac-
 tum, posset aliquis querere, quare ad eò differat à
 manu. sciendum est quod refert Galen. tertio De
 usu part. cap. 6. quòd partes pedis proportione ref-
 pondent partibus manus: nam id, quod τέσος vo-
 catur, carpo est simile: metacarpio autem πρῶτον,
 id est planum; digitis autem digiti satis sunt similes
 subia

nu est tria, ratio est secundū Gal. quod os inferius pollicis in manu seiunctū est à metacarpio, in pede autem est *πρῶτον*, id est plano, coniunctū. pollex tamen pedis maior fuit, quàm manus, quoniam debuit esse tanquam pondus anterius quod flexionē pedis iuaret, responderētque calcaneo. Nomina verò digitorum pedis eadem sunt, quę & manus, propter ordinis similitudinem. Sunt præterea duo ossa quę nostrates appellāt fociilia: ab Auic. autē dicuntur hoc quidem canna magna, illud cāna minor, Græci hoc *κνήμη*, hoc est tibia, illud *πέρονη* nominant, quam plerique fistulā vocant. Ex vtraque parte sunt duę eminētię quę græci *σφυρα* nos clauiculos aut talos appellamus. hoc loco docet Galenus, secari venam, libro de sanguinis missione, horum omnium quę sit figura vnusquisque perse videre potest.

F I N I S .

EXpeditis his, quæ ad Mundinum pertinent, quædam nusus pertractare de verniculis visum est, quos in cerebro esse diximus, idque muneri illis iniunctum esse à natura, vt meatum claudant, per quem spiritus à secunde at tertium ventriculū deferuntur, non à primo ad secundum. Cognitione autē dignum est, & non minus difficile, quomodo illum faciant motū, atque orificiū claudant. Constat .n. tria esse in nobis motū genera, aut .n. est motus voluntarius, qui fit à musculis, aut motus cordis, & articularum, qui fit ex vitali virtute, aut demū naturalis, quo mouetur stomachus, & intestina, quæ cum ita se habeāt, quis reliquis erit verminum

vermīū horū motus? Autē. dicit, quòd claudendo coxas, aut easdē aperiendo, claudunt, aut aperiunt meatum illum: verūm non dicit quis nam sic iste motus. Galenus inquit, quòd cum producuntur, claudum meatū, cum verò se contrahunt, aperiunt sed neque hac ratione declaratur, quis nā sit motus iste, & ad quē, ex illis tribus referri debeat. Dico igitur, quòd quemadmodum stomachus clauditur pro cibo concoquendo, ita etiam spiritus animalis recipitur imperfectus in primo ventriculo à rete, atque ibi perficitur, deinde ad alios ventriculos transmittitur, ergo si in primo ventriculo perficitur spiritus animalis, necesse est aliquid esse, quod illum ibi contineat, ac claudat viā, quā posset exire antequam perficiatur: quod faciunt isti vermes. dicendum est igitur obedire eos motui naturali. Hoc videtur etiam Galenus sensisse, cum octavo de usu part. in fine reprobat eorum sententiam qui volebant Conarium claudere, inquit .n. Galen. conarium non habere motū ex se ex quibus innuere videtur vermes moueri motu cerebri, & contrahi, & laxari, sicuti ianitor in stomacho, ut motui naturali pareāt. Quòd si voluerimus eū Mundi no dicere eū motum esse voluntarium, dicemus quod, quemadmodū motus stomachi nonnunquam sequitur voluntatem, licet enim quandoque cum quis velit euomere, eodem modo illi vermes & si naturaliter moueantur, tamen aliquem etiā motum habent, qui voluntati pareat nam ad eos aliqui etiam nervi deferuntur.

DEclarauit alias in anatomia videnda esse primum ossa, deinde musculos, tū neruos, venas, & arterias: postremo mēbra interiora. Nos vero secuti consuetudinem ab ijs incepimus, quæ posteriora sunt. ossa vero sola egent inspectione, non sectione. & propterea multa in eis non est difficultas. Musculorum vero dissectio, cum propter multitudinē, variāque eorum ac multiplicem positionem & figurā, tum vero propter desuetudinem fit perdifficilis. ac nisi copiose de ijs differentem Galen. haberemus magis etiam foret difficilis, ne dicam cogitū impossibilis. Vidēdū est autē quid sit musculus, quas res habeat, & quot motus. Auicēna prima primi, cap. de anatom. musculorum & Galen. secundo artis med. cap. 5. & libro de motu musculorū, à quo omnia sumpsit Auicēna Musculus, inquit, est instrumentum voluntarij motus, ad hanc autem rē oportet vt à cerebro motricem vim recipiat. Nam cum venit neruus à cerebro, vel dorsali medulla ad principium musculi diuidit̃ in minimas partes capillares, per substantiam musculi, & procedens musculus iuxta mediū fit carnulentior, ac post medium musculi neruus vnitur, & facit chordam itidē fit de ligamento. Sed neruus fermē totus diuiditur p̃ substantiā musculi, ligamentum autem diuiditur, facitque panniculum, qui musculū regat. Intra musculi substantiam veniunt nerui, et villi ligamentales, & complicantur ad modū retis, deinde in fine musculi ex villis ligamentis, & neruis fit chorda, quæ de mente Galeni, maior est neruis composita enim est ex neruo & ligamen-

ro: atque huiusmodi chorda ossibus implantatur. Musculi igitur substantia constat, carne, neruo, vel
 villis nerueis, ligamentis, & chorda, alligatur au-
 tem musculus ossi ratione ligamenti, & dat motū
 ratione nerui. Venæ vero aut arteriæ non sunt ex
 musculi substantia, sed illæ quidem nutrimentum
 hæ vero naturalem calorē seruant. Nam cum eæ
 partes esse alicuius membri non dicantur, quæ ad
 illius operationem non conueniunt. musculorū au-
 tem omnis actio in motu consistat, cui nil confe-
 runt venæ, aut arteriæ, non est dicendum eas esse
 de musculi substantia. Chorda cōposita est ex ner-
 uo, & ligamento: mouet enim, & ligat musculum.
 Sed queret fortè quispiam, an omnis musculus in
 chordam desinat, & an omnis chorda ossi implan-
 tetur. Inquit Galenus omnem chordam, quæ vere
 chorda sit, mouere, & implātari ossi alicui. Sed di-
 cet rursus aliquis: multos esse musculos qui nullū
 os moueant, vt musculi oculorum, frontis, palpe-
 brarum, musculi vocis, ani, colli vesicæ, testiculo-
 rum, virgæ, qui mouent quidem, sed nullum tamē
 os: Quomodo igitur musculus omnis ossi per chor-
 dam implantatur? dicendum est, vt etiam ait Ga-
 lenus, quosdam musculos dum se ipsi contrahunt,
 mouere id, cui annectuntur, vt musculus ani, colli
 vesicæ, frontis, & ij, qui carnē genarū mouent. isti
 enim in chordas non desinunt. Qui vero aliquod
 membrū mouent vt oculos, & linguam, partim
 habent chordam, partim non habent, nam extre-
 mum musculorum qui oculos mouent implanta-
 tur in cornea, est extrema pars cuiusdam texturæ
 neruosæ, Musculi autem penis, & testiculorum nō

mouent nisi dum se contrahunt. Qui vero aliquos
 mouent, in chordam desinunt, quæ ossi illi implan-
 tatur. Illud vero difficile est videre quo modo mo-
 ueant, uidem⁹. n. uarios mot⁹, et uarios musculos,
 et diuersa ea, quæ mouent. Fuere q̄ dicerēt muscu-
 os sex modis moueri posse. nā cubitus cōtrahit, &
 extendit: tollitur, & deprimitur: flectitur in supinā
 & pronam figurā. Gale. vero sexto De usu part.
 cap. 8. vnusquisque, ait, musculus simplicē, & vni-
 cum habet motum, nam, vt idem ait etiam quinto
 de usu part. cap. 14. quilibet musculus habet vnū
 tantum genus villorū, præter intercostales q̄ obli-
 quos habent, cum reliqui omnes rectos habeant
 musculos. ex qua ratione probat̄ cor nō esse vnū
 musculum, quoniam non vno motu moueatur.
 Verum si dixerimus, vnum musculum vnicū tan-
 tum habere motū, vndique instabunt argumenta.
 Videmus enim linguam moueri ad omnē motum
 oculos vero quinque modis, nā & sursum, & de-
 orsum, & indextrā, & leuā, præterea etiam in or-
 bem moueri. Illud etiā constat sensu quod in br a-
 chio animalis extenuari, cum musculus exterior
 se contrahit, extenduntur digiti. rursus cum idem
 se extendit, digiti laxantur. Idem uidemus in alijs
 paruis musculis fieri, q̄ protractione, & contrac-
 tione mouentur. Quomodo igitur verum esse po-
 test Galeni dictum. quod vnus quisque musculus
 simplicem & vnicum habeat motum? Possumus
 respondere de Galeni mente quod vnus musculus
 vnicum habet motum, qui sit eius musculi opera-
 tio. nam sibrachium contrahitur atque extenditur
 id fit à duobus musculis, quorū interior se ipse cō-

trahens flectit digitos. exterioris autē musculi munus est vt extēdat. itaque apparet vnū musculum pro vnico motu esse institutum. Verum adhuc refertur quæstio, nam si abscindatur musculus interior sequetur nec contrahi amplius nec extendi brachium, quod si seruato interiori secentur hi qui extendunt, brachium nec contrahi itidem neq; extendi poterit. Videtur igitur vnicum musculum causam esse duorum motuum, cum ex vnus sectione duo motus perdantur. Istud tamen non ita se habet. nam vt inquit Galenus, cum duo motus se mutuo consequuntur, necesse est vno ablato, alterum quoq; auferri. non tamen idcirco statim verū est vtrunque motū vnus musculi esse propriū, nā ut brachiū flectatur oportet vt prius tensus fuerit, rursum vt tendatur oportet vt flexum antea fuerit. Itaque manifestū est, quod ea extensio fiat à musculo exteriori ab interiori autē flexio. à quo etiā fit extētio per accidēs, sicut ab interiori fit flexio per accidens, non enim (vt dictum est) potest brachium extendi, quin prius flexus fuisset, neque rursus flecti, quin fuisset antea tensus. Quomodo vero probari possit unum musculum unum tantum habere motū, deinceps dicamus. Si in lingua, aut oculis vnus tantum esset musculus necessarium foret asserere vno musculo plures fieri motus. nunc vero cum videamus & lingue & oculis tot inesse musculos, quot sunt etiam motus, quibus mouentur dicendum restat, aut naturam frustra tot musculos fecisse, si tot motus vnico musculo operari potuisset; aut vnumquenque musculum proprium habet motum. Potest uero moueri musculus alio modo

modo præterquam per dilatationem, & constrictionem, non tamen hic erit proprius motus musculi, vt si manum clarã demittas, hoc enim fit ratione grauitatis vt musculi vnà cum toto brachio demittantur. Illud vero notatu dignum est, quod si fiat abscessus in interiori musculo, brachiũ nunquã tendetur, sed semper flexum remanebit, quoniam abscessus contrahit musculum, et brachium flectitur. Quoniam verò videmus, quod si musculus scindatur medius, contrahent se partes, ad suam originem vna, altera ad finem, quod non in uiuo tantum animali, sed in mortuo etiam vsu euenit, videtur naturalem, non voluntarium musculi motum inesse. Pro cognitione autem motus musculorum optimum fuerit ex Galeni libro primo de motu musculorum petere, quæ ipse sub imagine quadam recenset, quæ ita se habet, coniungere oportet duo ossa ita quod vnũ stet, alterum moueatur, quomodo ostiorum se habent cardines, quare manenti quidem cavitatis, ei vero quod mouetur cavitatis ad sit, præterea sint duæ catenæ, quæ dimissæ ex sua natura redire possint ad suam naturalem dispositionem, atque vna quidem à dextris sit altera vero à sinistris eiusdem ossis, quod moueri debet, vnianturque in eius ossis capite. Pono autem quod ea catena sit in suo naturali situ cum maximè attrahitur, cum vero maxima fiat flexio non sit ad modũ præter naturalem dispositionẽ. Adhærent autem ossi quiescenti hæc catenæ, capitibusque annectuntur ossi mobili, ac cū sit quidam flexio, vna valde flexa est, altera nõ, cum vero sit magna extensio vna est in sua naturali dispo-

positione, altera non item. Quo igitur modo hæc se habent cathæne, eodem & musculi, & qualis est manus dum cathenas illas trahit, talis est voluntaria virtus, quæ trahit musculos. si igitur secetur chorda redibit musculus ad suam naturalem dispositionem. propterea vult Galen. quòd, & in magna flexione, & magna item tensione vterque musculus sit æqualiter preter naturam dispositus atque ita apparet quòd inciso vno musculo alter extenditur, quoniam non poterit opposito modo moueri. Hinc etiam cognoscitur, quare in animali mortuo musculus incisus retrahatur, quoniam scilicet non erat in sua naturali positione. Quare manifestum esse existimo, fieri posse vt ex sui natura musculus se ad suam originem contrahat, & quòd etiam à motrice virtute moueatur. Ex his consequitur eam musculi positionem minus molestam esse, quæ media est, vt de manu, nam si sit maximè flexa, aut tensa, oportet non nihil doloris, aut molestiæ sequi. Ex his autem dictis colligit, quatuor notatu digna Galenus, primùm figuram mediam maximè vtilem esse, extremam malam, quod sub figura media diutius possumus consistere, sub extrema minimum. Hæc vero consequitur etiam quintum, quòd cum diù etiam sub figura media fuerimus, cupimus permutare: nam, vt inquit Galen. parua læsio multiplicata tempore fit maior: sicuti gutta lapidem cauat. vnde fit vt debiles & minus firmi eã nō possint diutius ferre. quemadmodum etiam lapillus collo fortioris appensus absque vlla eius molestia longum tempus erit, idem tamen lapillus si pueri aut infirmioris

collo annectatur, breui molestus erit, idem conringit ob musculos. Sed dicit quispiam, cur ita facti sunt muscoli, vt se ipsi ad suam originem cōtraherent, si debent à natura moueri? Hoc verò, inquit Galenus, conuenienter factum est à natura facillime enim possunt ex voluntate retrahi, cum ipsi etiam naturaliter retrahantur. Sciendum tamen est quòd eam naturalem virtutem exercere non possunt nisi à ligatis soluantur, alioqui se ipsi contrahere nequaquam possunt, nisi à virtute ipsa motrice. Media autem crurum positio, non eadem est, quæ & brachij, quoniam crura ipsa facta sunt vt sint tensa ad sustinendum vniuersum corpus: verumtamen neque admodum tensa ea esse oportet, nam foeminæ non rectè faciunt cō infantibus crura valde extendunt. Quare media crurum positio est, vt nec admodum tensa, neque etiam valde flexa sint, tunc enim desistunt muscoli ab operatione sua. Mandibula quoque inferior extremas habet positiones, cum aut vehementer stringimus dentes, aut vehementer os aperitur aut distorquetur. Media vero eius figura est inter vtraque. Dorsi verò media figura non est recta, quoniam non tantum reflectimus dorsum, quantum inflectimus. ideo media eius positio est cum aliquantulum reflectitur. nam in supinè iacente muscoli nihil operantur. Quamobrem Hippocr. inquit, quod si quis supinus iaceat, atque os mediocriter habeat apertum, inditio est virtutem ei inesse admodum infirmam. Mediam verò carpi positionem rectam esse oportere, quoniam tam in anteriorem partem, quam in posteriorem mouetur.

Musculi quoque qui iuncturam non mouent mediam quandam habent positionē, vt musculi lingue, lingua. n. extremā habet positionē, vt cū exerta nimiū est, & nimium contracta, media autem eius positio est, cū medio quodam se habet modo inter hæc extrema. Cum igitur musculi tunc solū desistant, ab operatione cum in media sint positione, necesse autem sit cum non sint in media, aliquē musculum operari, manifestum est in his qui dormiūt musculos operari. cuius rei signum est quod homo sedens dormire potest, aut etiam in latus iacens, quarum neutram positionem in mortuo inuenies. præterea plurimi sunt qui brachijs extensis nimium, aut nimium flexis dormiunt, & qui manu pecunias, aut lapidem continebunt, qui etiam, inquit Galenus, se dormientem aliquando media nocte deambulasse, neque vero tenere possemus dormiendo inferiorem mandibulam clausam, nisi musculi operarentur. Iam musculus ani, & colli vesicæ, nonne munere suo fungitur etiam cum dormimus? alioqui enim in somno exciderent excrementa, quod ipsi vsu euenire solet, qui paralyin patiuntur. Perperam igitur opinantur, qui credunt animam in somno cessare à voluntario opere. vt illud concedam non extremè operari. Quoniam autem dictum est vnum musculum vnicum motum habere, & quod cum natura musculum ad vnum motū instituit, instituit etiā aliū pro motu opposito, dubitatio est de diaphragmate, & musculo ani, & colli vesicæ, nam si diaphragma dilatat pectus, quis erit musculus astringens, eodem modo de musculo ani, & colli vesicæ, Dicendum est secundum

cundum Galenum, quod musculus aní non eo modo, quo alij seipsum retrahit, sed seipsum astringendo anum astringit, tanquã crumena quedã, neque enim similis est figuræ cum musculo brachij, atq; ideo non eodem mouetur motu, qui si à sua operatione desistat, hoc est non constingat, non opus est alio musculo opposito, qui dilatet, sed musculi ventris & intestina, cum fœces expellunt, laxant meatũ, idem est de musculo colli vesicæ statuendum, nam dum ille nõ astringit, virtus expultrix, & vrina aperit collum vesicę. De diaphragmate vero inquit Galenus, quod non est longus, neque eiusdem positionis, vt alij, sed rotundus & perforatus, atque ideo aliam habet operationem, atq; alium motum, neque enim contrahit se, sed dilatur, & simul dilatat pectus, vnde attractio aeris naturalis fit à solo diaphragmate, expulsio autem à pectore, cum decidit ad naturalem situm. Maxima vero de motu linguę est dubitatio, quam etiam superius tractauimus, atque hoc loco soluendam reliquimus. nam in libro de motu musculorũ Galenus inquit linguam moueri varijs motibus, & quemlibet motũ ab vno musculo fieri est necesse, ex Galen. sexto de vsu part. cap. 8. cum igitur lingua exeritur, qui musculus est qui illam trahat: dictum est superius aliorum sententias, quas falsas esse ostendimus. Itaque restat dicendum naturam in lingua instituisse pro hoc motu vnum musculum, qui motum alijs oppositum habeat, & linguam moueat extrorsum, atque seipsum extendat hoc autem non est incommodum; quoniã & musculi qui costas dilatant se extendũt. His dictis ex-

plicemus deinceps musculos manus, sicuti Galeni ordinem in libris de anatom. aggr. & primo de usu part. antequam autem aggrediar rem, expono prius terminos quosdam, quibus in hoc tractatu usuri sumus, ac primum intelligi volo manum ita locatam esse, ut pollex sit superior, minimus vero digitus inferior. Cum dixerò vlnam, intelligam os superius, id est à cubito usque ad humerum, brachium verò mihi significabit os inferius, quod facile superius vocant, ego radium voco. in manu cum sint cauitas & eminentiæ tanquam colles quidam, cauitatem suo nomine appellabo, eminentiam autem pollicis *ῥένας*, quæ verò est ad paruum digitum, *ὑπὸ ῥένας* dicam, aliorum vero digitorum pecten nominabo. Est autem aduertendum quod apud anatomicos est quæstio vtrum qui musculus quatuor habeat chordas, vnus tantum sit, an quatuor musculi. Galenus ait, quod, si quatuor ille chorde vnū habuerint motū, dicendū est vnū esse musculū. Noluit autē natura musculum peruenire ad manum, ob musculi carnulentiam, qua nō eget manus. at que ideò chorde à musculis ad manum demittuntur, quas, quoniam per locum, vbi non esset caro, transire oportuit, ea de causa tunicam quandam illis superinduxit, quæ totam vestit chordam, è regione autem carpi est tegmen quoddam magnum, quod omnes illas chordas operit, Sex sunt motus digitorum, cum flectuntur, & extenduntur, & cū mouentur in dextrū, & sinistrum, & sursum, & deorsum: ideo in omnibus ijs partibus sunt chordæ, ac eæ quidem quæ motum faciunt deorsum sunt in parte exteriori, atque or

cum habent à musculis brachij exterioribus, qui
 duo sunt, & faciunt motum exteriorem à latere, ac
 que à musculo superiore quatuor oriuntur chor-
 dæ mouentes mediam iuncturam quatuor digito-
 rum: nam in digito magno non est chorda quæ
 primam iuncturam moueat. deinde à musculo in-
 teriori quinque oriuntur chordæ: quarum singulæ
 ad singulos digitos perueniunt atque ita vnusquis-
 que digitus binas hæt chordas, vnâ quidē à maio-
 re musculo, alteram à minore. eæ autem chordæ
 minores sunt quæ ad quatuor tantum digitos fe-
 runtur. nam in magno digito interior chorda mi-
 nor est, exteriores verò sunt maiores. nam vt in-
 quit Gal. cum manum stringimus maximè qua-
 tuor digitis nitimur, atque ideo oportet interiores
 chordas esse fortiores, magnus autē digitus nō mo-
 uetur donec alij prius moti fuerint, tuncque eius
 prima iunctura otiosa permanet: atque neque e-
 git chorda: & quoniam cum magnas res pre-
 hendimus distat potius magnus digitus ab alijs,
 quàm sit proximus ea de causa curauit natura vt
 chorda interior vna tantum esset, eaque minor,
 exterius vero duæ essent, quæ à latere proce-
 dunt ipsius magni digiti, cum ea, quæ interior est
 per medium procedat. habet autem ^{seu} muscu-
 lum, qui pollicem diducit ab alijs, est que hic mus-
 culus maior, qui est inter pollicem & indicem,
 qui iungit pollicem indici. Sunt autem in manus
 parte inferiori septem musculi, duo .n. sunt rectè
 ad carpū, quorum inferior quinque chordas habet,
 superior quatuor. deinde est musculus ppe indicem,
 alius è regione digiti parui, q mouet carpum. Sunt
 præ



præterea alij duo musculi quorum vnus quatuor emitit chordas, alter quinque. supra istos est videre musculum quem lam, qui cum chorda descendit, expanditurque in uola manus, & facit chordam latam, ad dandum sensum manui, & prohibendum ortum pilorum. hic autem, inquit Galenus, si retrahatur mouet manum, & si primo non sit pro motu. quia non est ossibus implantatus, sed cuti: est ergo primum factus pro sensu, & ne oriantur pili in uola manus, atque ut manus sit plicabilis. nam si retrahatur chorda musculi mittentis quinque chordas ad digitos nihil aliud mouebitur præter secundam iuncturam, non enim mouet primam nisi obscure. Sunt autem motus in digitis quatuor, nam eos possumus flectere, extendere, diducere, & iungere. fieri uero nequit ut ex istentibus digitis flexis diduci possint. quod fit cum sunt tensi. Nunc uideamus numerum musculorum. Galenus secundo libro de usu part. cap. 1. Numerus, inquit, omnium brachij, & manus extreme musculorum ad uiginti tres peruenit: septem, n. sunt in manu extrema: alij totidem magni totam internam brachij regionem reliqui nouem totam externam occupauerunt. sequitur autem hoc loco Galen. ueteres qui septem tantum musculos manus nouerunt, qui tamen postea decem aut undecim esse cõpenti fuere, quos recenset in libr. de anatom. aggress. Quod uero ad brachij musculos attinet, inquit Galen. esse septem in interiori parte, in exteriori nouem, in libr. autem de anatom. aggress. in exteriori parte decem recenset. nam diximus in parte interiori vnum esse musculum, qui facit chordam latam, duo autem faciunt alias chordas

das digitorum vniuscuiusque est inferius prope digi-
 gitum minimum, alius propè indicem. Sunt præte-
 rea duo, qui pronam figuram manus efficiunt. In
 exteriori parte manifestè sunt octo muscoli, dein-
 de sunt alijs duo q̄ motū pronum, & supinum faci-
 unt, atque hoc modo decē eos esse apparet. quod
 uero Galenus dixerit eos esse nouem, causa est
 quia vnus est musculus, qui duas mittit cordas,
 vnā ad carpum, alteram ad pollicem, atque ideo
 nunc pro vno nunc pro duobus accipitur. Pote st
 vero carpus flecti interius, exterius, versus pro-
 num, & supinum, et moueri motu medio, atque his
 motibus natura proprios dedit musculos, medium
 tamen musculum, exterius fecit vt magis in pronū
 quam supinum moueret, quia mouetur potius ma-
 nus erga pronum quam supinum. Quod verò nō
 vnum musculum exterius, alterū interius, sed duos
 fecerit natura, ea causa est, quoniam si vnum tan-
 tum fecisset eum in medio situm esse oportuisset,
 atque ita obliquè non posset flectere manum. ne-
 que verò ille motus, si esset musculus in medio, fir-
 mus foret, ac stabilis. præterea nullus erat locus
 in medio, quoniam is erat à reliquis musculis oc-
 cupatus. rectè igitur natura duos musculos interi-
 ac totidem exterius fecit, Musculi autem hanc ha-
 bent positionem, vt qui quatuor digitos extendit,
 sit omnium altissimus. infra quem est, que duos di-
 gitos mouet, quo inferius est qui alios duos digi-
 tos mouet. reliqui omnium sunt infimi. Antiqui
 vero, vt ait, Galenus aciem musculorum exteriorum
 qui sunt septem, occurrunt que statim ablata
 cure, sed interiores musculos pauci veterū cogno-
 uere

uere, quinimo neque Galen. ipse nisi longo post tempore. Musculus autem qui in ea manus parte est, quæ *θεύαε* dicitur, originē hēt à carpo, & cū cōtrahit magnū digitū ab alijs diducit. similiter musculus, qui est ad *πρόθεύαε*, diducit ab alijs paruum digitum. Qui vero est inter pollicem & indicem, cum seipsum contrahit mouet pollicem versus indicem. pollex chordam habet, quę à musculis brachij oritur, quoniam pollice utimur magis cū ab alijs diductus est, quam cum est proximus. Declarat autem Galenus, quod natura in parte digitorum intrinseca posuit carnem, in qua neros disseminauit, qui facti sunt musculi. ex quibus colligere possumus, quòd ad substantiam musculi constituendam satis est, ut adsit caro & neruus. nam multi sunt musculi absque chorda, aut ligamento. Utilitates autem carnis digitorum superius recensuimus. Carnis verò in vniuersum tres, inquit Galenus de Platonis in Timœo auctoritate, sunt utilitates, defendit enim à casu, quia cum res aliqua decidit, si carnulenta est minus læditur. tuetur etiam à frigore, & calore, nam cum caro sic calida et humida, ratione caliditatis tuetur à frigore, quoniam verò humida est sudorem emittit, & humectat. Quæ verò de musculis supersunt dicenda, ea petet studiosus ex Galen.

Nos hæc dixisse sufficiat.

F I N I S.



P A P I A E.

Apud Franciscum Moschenum Ber-
gomensem, Et Ioānem Baptistam
Nigrum, Socios, Civesq; Pa-
pienses. Anno Dñi.
M. D. L.









